

فندول*

(حامض الميفيناميك)

المفعول

فندول هو مستحضر غير ستيرويدي ذو خواص مضادة للالتهاب، مسكنة للألم وخافضة للحرارة.

دواعي الاستعمال

يستعمل فندول كمسكن للألام الخفيفة والمتوسطة بما في ذلك ألم العضلات، ألم الرضات، ألم الأسنان، الصداع، الألم بعد العمليات وبعد الولادة.
الألم المصاحب لالتهاب المفاصل الروماتيزمي (بما في ذلك مرض ستل) والتهاب المفاصل العظمي، الألم عسر الطمث وحالة غزارة الطمث. كذلك يستعمل فندول للصغار كخافض للحرارة.

الجرعة وطريقة الاستعمال

يجب أخذ فندول مع الطعام مع كأس ماء.
الكبار (فندول كبسولات أو فندول دي. إس أقراص):
تعطى ٥٠٠ ملغم ثلاث مرات يومياً.
الأطفال (فندول شراب):

٦ اشهر - ١ سنة:	ملعقة صغيرة (٥ ملليتر)
٢-٤ سنوات:	ملعقتين صغيرتين (١٠ ملليتر)
٥-٨ سنوات:	٣ ملاعق صغيرة (١٥ ملليتر)
٩-١٢ سنة:	٤ ملاعق صغيرة (٢٠ ملليتر)

يمكن تكرار الجرعة حسب الحاجة حتى ٣ جرعات يومياً.

مضادات الاستعمال

- يجب عدم استعمال حامض الميفيناميك في الحالات التالية:
 - فرط الحساسية لحامض الميفيناميك، أو لدى المرضى الذين يتسبب استعمال الاسبرين أو مضادات الالتهاب غير ستيرويدي الأخرى لديهم بظهور أعراض تشنج شعبي، التهاب الأنف التحسسي أو شرى.
 - المرضى المصابين بقرحة معدية أو التهاب في الجهاز الهضمي العلوي أو السفلي.
 - المرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى أو الكبد.

المحاذير

يجب إيقاف استعمال حامض الميفيناميك في حالة ظهور طفح جلدي أو حدوث إسهال.

قد يؤثر حامض الميفيناميك على الوعي الذهني، لذا فإن القدرة على استخدام الأجهزة، مثل قيادة السيارات قد تتأثر، ويظهر ذلك خصوصاً عند الاستعمال المصاحب لشرب الكحول.

الاحتياطات

- لم تثبت بعد سلامة استعمال حامض الميفيناميك خلال الحمل والارضاع.
- عندما يرافق اعطاء حامض الميفيناميك اعطاء أدوية عالية الارتباط بيروتينات البلازما (مثل مضادات التجلط) قد يستدعي هذا تعديل في جرعة هذه الأدوية.
- فيما عدا مرض سننل لا يجوز إستمرار العلاج للأطفال أكثر من ٧ أيام.

التأثيرات الجانبية

إن أكثر الاعراض الجانبية حدوثا لدى استعمال حامض الميفيناميك مرتبطة بالجهاز الهضمي والاسهال أكثرها حدوثا. كذلك يمكن حدوث صداع، نعاس، دوام، عصبية واضطرابات بصرية.

فرط الجرعة

في حالات فرط الجرعة يجب إفراغ المعدة بإجراء غسيل المعدة او أحداث قيء ثم اعطاء فحم مفعل.

الاشكال الصيدلانية

كبسولات

فندول: حامض الميفيناميك ٢٥٠ ملغم/كبسولة

أقراص

فندول دي إس: حامض الميفيناميك ٥٠٠ ملغم/قرص

معلق

فندول: حامض الميفيناميك ٥٠ ملغم/٥ مليلتر