

CLENIL® COMPOSITUM SPRAY (Salbutamol - Béclométhasone Dipropionate)

Aérosol doseur - Association d'un bronchodilatateur et d'un corticostéroïde pour le traitement locale de l'asthme bronchique.

CLENIL COMPOSITUM® SPRAY est une association d'un bronchodilatateur, le salbutamol avec un nouveau corticostéroïde, le béclométhasone dipropionate.

Le salbutamol est caractérisé par une rapide et sûre action antispasmodique bronchique, qui détermine une prompte amélioration de la fonction respiratoire.

L'action de salbutamol est exercée électivement au niveau de la musculature bronchique, sans provoquer des effets cardiovasculaires indésirables. D'autre part le béclométhasone dipropionate contrôle l'hyperactivité bronchique, en réduisant l'œdème et l'hypersecretion et en interdisant progressivement la survenue du bronchospasme.

L'activité du béclométhasone dipropionate est limitée au niveau de l'arbre bronchique sans donner lieu à des effets généraux et donc sans entraîner une freination de l'activité surrénalienne.

Au but d'obtenir un plein succès thérapeutique il est importante que le patient suive attentivement les instructions et apprenne à inhaler correctement le médicament.

INDICATIONS

Asthme bronchique, bronchite asthmatique, bronchite chronique et emphysème avec une composante broncho-spastique.

POSOLOGIE

Adultes: 2 bouffées 4 à 6 fois par jour.

Enfants âgés de moins de 12 ans: 1 à 2 bouffées 2 à 4 fois par jour selon les résultats obtenus.

L'effet d'une bouffée de CLENIL COMPOSITUM® SPRAY demeure pour au moins 4 heures.

Effectuer au maximum deux administrations par fois et ne pas répéter le traitement avant de 4 heures.

EFFETS INDESIRABLES

On n'a pas observé aucun effet indésirable lors de l'utilisation de CLENIL COMPOSITUM® SPRAY aux doses conseillées; seulement dans quelques patients on a observé rauçité de la voix.

Dans quelques malades on a observé la survenue de candidoses limitées à l'oro-pharynx qui cèdent le plus souvent spontanément ou à un traitement approprié avec antimycosiques sans arrêt de la thérapie. A des doses élevées, dans quelques patients, on a observé des effets indésirables transitoires (modeste augmentation de la fréquence cardiaque, légers tremblements musculaires) qui cèdent aux premiers jours de traitement en réduisant, si nécessaire, la dose. Les effets généraux indésirables sont extrêmement improbables à cause des basses doses utilisées, leur survenue, toutefois, peut être favorisée par des traitements prolongés.

MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS

L'emploi, surtout pendant de longues périodes, de produits topiques peut provoquer des effets de sensibilisation et, exceptionnellement, des effets généraux indésirables typiques du médicament. En tout cas il est nécessaire de suspendre le traitement et d'instituer une thérapie appropriée. Le médicament doit être administré avec précaution dans les sujets atteints de cardiopathie ischémique, insuffisance cardiaque, hyperthyroïdisme, hypertension aiguë et dans les malades traités précédemment avec des doses massives d'autres médicaments sympathomimétiques.


En règle générale CLENIL COMPOSITUM® SPRAY ne sera pas prescrit avec des bêta-bloquants comme le propranolol.

Le médicament doit être prescrit avec prudence chez la femme enceinte et seulement en cas d'effective nécessité, sous surveillance médicale.

CONTRE-INDICATIONS

Le béclométhasone dipropionate est contre-indiqué dans les infections virales et tuberculeuses locales, tandis que le salbutamol n'a pas de contre-indications spécifiques. Ne pas utiliser dans les patients hypersensibles au béclométhasone et au salbutamol.

MODE D'EMPLOI



1) Enlever la fermeture de protection.

2) Tenir l'appareil entre le pouce et l'index avec l'embout dans la partie inférieure comme montré dans la figure.

3) Bien agiter sans appuyer.

4) Introduire l'embout dans la bouche et expirer complètement.

5) Inspirer profondément avec la bouche; en même temps appuyer avec l'index une seule fois.

Quand l'inspiration est terminée tenir le souffle tant que possible. Attendre quelques seconds avant de faire une autre inhalation.

Après les inhalations fermer de nouveau l'embout avec la fermeture de protection. L'embout doit être toujours propre.

Nettoyer avec de l'eau tiède après avoir extrait la cartouche.

PRESENTATION

Aérosol doseur assurant au minimum 200 inhalations.

Composition: Béclométhasone - - - 50 mcg
Salbutamol - - - 150 mcg

p. 1 dose



CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.
Via Palermo, 26/A - PARMA - ITALIE