

Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement un médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption cutanée ou une réaction allergique. Il faut immédiatement arrêter le traitement et avvertir votre médecin,
- chez les sujets âgés, en raison de la présence d'eucalyptol et en cas de non respect des doses préconisées : possibilité d'agitation et de confusion,
- exceptionnellement, taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes) pouvant se manifester par des saignements de nez ou des gencives,
- possible irritation rectale en raison de la forme pharmaceutique.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

Précautions particulières de conservation

À conserver à une température inférieure ou égale à 25 °C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Juillet 2010.

TROPHIÈRES® COMPOSÉ Adultes

suppositoire

paracétamol - ténoate de sodium - huile essentielle d'eucalyptus

sanofi aventis

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Composition

- Paracétamol..... 0,45 g
- Ténate de sodium 0,20 g
- Huile essentielle d'eucalyptus..... 0,11 g

Excipients : glycérides hémi-synthétiques solides (type BCM®), pour un suppositoire de 3,00 g.

Forme pharmaceutique et présentation

Suppositoire (Boîte de 8).

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTALGIQUE périphérique

ANTIPYRÉTIQUE

(N : Système nerveux central)

(R : Système respiratoire)

Titulaire et exploitant

sanofi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris – France

Information Patient : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant

UNITHER LIQUID MANUFACTURING
31770 Colomiers – France



DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament contient du paracétamol.
Il est préconisé dans le traitement de la fièvre au cours des maladies bronchiques aiguës bénignes, chez l'adulte.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

Cette spécialité contient de l'eucalyptol (dérivé terpénique) qui peut entraîner, à doses excessives, des accidents à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.
Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées dans cette notice.

Précautions d'emploi

Cette spécialité existe sous forme de dosages plus adaptés pour l'enfant.
En cas de maladie des reins, il est nécessaire de CONSULTER VOTRE MÉDECIN avant de prendre du paracétamol.
En cas de crises d'épilepsie anciennes ou récentes, DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol, d'autres médicaments en contiennent.
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose maximale recommandée
(Cf. chapitre «Posologie»).

2

Grossesse – Allaitement

Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

Allaitement

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

RÉSERVÉ À L'ADULTE.

La posologie usuelle est de :

1 suppositoire à 450 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 4 suppositoires à 450 mg par jour.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS.
- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

Mode et voie d'administration

Voie rectale.

Le choix de la voie rectale n'est déterminé que par la commodité d'administration du médicament.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de fièvre ou de douleur.
Elles doivent être espacées de 4 heures minimum chez l'adulte.

En cas d'insuffisance rénale sévère, les prises seront espacées de 8 heures au minimum.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Durée du traitement

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent, ou en cas de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

3005T1
549
3