

BETAVAL[®]

BETAVAL[®] - N

ACTION:

Bétaval est un produit dont le principe actif est le bétaméthasone 17-valérate, le corticostéroïde fluoré puissant qui possède d'excellentes activités topiques anti-inflammatoires et antiprurigineuses. Bétaval-N a en plus du Bétaméthasone 17-valérate, la néomycine; l'antibiotique qui est recommandé pour le traitement topiques des dermatoses surinfectées.

INDICATIONS:

L'application topique du Bétaval produit une excellente suppression des maladies dermatologique dans lesquelles l'inflammation est une caractéristique prédominante tels que l'eczéma et l'eczéma infantile, la dermatite atopique, la dermatite herpétiforme la dermatite de contact, dermatite du veineux, la dermatite séborrhéique, la neurodermatite, psoriasis et intertrigo. Bétaval-N est indiqué dans les cas d'infections bactériennes spécialement quand la staphylocoque doré est présent ou suspecté.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE:

La forme de crème est utilisée pour les lésions sèches et humides et sous forme de pommade pour les lésions sèches et scameuses. Bétaval ou Bétaval-N doit être appliqué on petites doses, 2 à 3 fois par jour. Dans certaines affections dermatologiques résistantes, Bétaval ou Bétaval-N peut être appliquée sous un bandage occlusif pour obtenir une meilleure pénétration des actifs.

CONTRE-INDICATIONS:

Hypersensibilité au bétaméthasone ou à la néomycine. Comme tout autre corticostéroïde fluoré, bétaméthasone 17-valérate ne doit pas être indiqué dans le cas de: acné rosacé, acné vulgaire, ulcère de la peau, infections virales tels que l'hépes, le zona, la varicelle, le virus de la vaccine et les verrues.

MISE EN GARDE:

Comme pour tous les corticostéroïdes, Il ne faut pas l'appliqué sur ulcère. Comme tout autre corticostéroïde floure une utilisation excessive résulte en une absorption systemique et les effets secondaires.

PRECAUTIONS:

Dans de rares cas de psoriasis, la maladie peut être exacerbée quand le traitement est suspendu tandis que la cause n'est pas éliminée ou traitée. Ne doit pas être applique sur certaines localizations tels que les muqueuses, les pils de flexion, les yeux et les paupières.

EFFETS INDESIRABLES:

Atrophie, hypopigmentation folliculaire, ainsi que des infections secondaires. Des réactions d'hypersensibilité à la néomycine peuvent également apparaître. L'application du Bétaval-N sur des lésions ouvertes ou en doses exagérées peut entraîner l'oxotoxicité et/ou la toxicité rénale suite à l'absorption de la néomycine.

SURDOSAGE:

Il n'y a pas une spécifique antidote. Le traitement est supporteur et symptomatique et consiste de discontinuation de traitement avec les corticostéroïdes topiques, la préparation peut être arrêté graduellement.

PRESENTATION:**Crème***

Betaval	Bétaméthasone (17-valérate) BP 0.1%
Betaval-N	Bétaméthasone (17-valérate) BP 0.1%
	Sulfate de néomycine BP 0.5%

* Par chaque gramme crème

Pommade*

Betaval	Bétaméthasone (17-Valérate) BP 0.1%
Betaval-N	Bétaméthasone (17-Valérate) BP 0.1%
	Sulfate de néomycine BP 0.5%

* Par chaque gramme pommade