

كريم، غسول

مبيد للقمل

التركيب

المادة الفعالة: كروتاميتون

الكريم: كروتاميتون - ١٠٠ ملغم، وبرولين غليكول، سواغ يضاف لعمل مرهم حتى ١ غم.

الغسول: كروتاميتون - ١٠٠ ملغم/مل، وبرولين غليكول، مواد حافظة: ٢ - فينيل إيثانول، حمض السوربيك (٥ - ٢٠٠)، مواد معطرة، شحم الصوف، سواغ يضاف لعمل مستحلب حتى ١ غم.

الخواص/التأثيرات

يوراكس له تأثير مبيد للقمل ويوقف نمو بكتريا المكورات العقدية والسبحية ويسكن الحكمة.

وينفذ يوراكس إلى داخل الجلد بسهولة دون أن يترك أي آثار دهنية أو لمعان. ويفضل استعمال الغسول للمناطق المغطاة بالشعر أو المناطق المكشوفة من الجسم وللبشرة الراضحة.

حرائك الدواء

بعد ٣٠ دقيقة من الاستعمال الموضعي لليوراكس، يمكن كشف وجود الكروتاميتون على سطح الجلد وأيضا في طبقاته الأعمق وفي البلازما. ويكون التركيز ثابتا في البلازما لمدة ٢٤ ساعة تقريبا. ولا يحدث تراكم في البلازما بعد الاستعمال طوال عدة أيام.

وينطلق الكروتاميتون في مجرى الدم بانتظام من الجلد، الذي يعمل كمخزن له، ومن ثم يتم إخراجه بسرعة من الدم.

دواعي وطريقة الاستعمال

لعلاج الجرب وتخفيف الأعراض المصاحبة له (تقيح الجلد والحكّة).

الجرعة وإرشادات الاستعمال

بعد الاستحمام بماء ساخن، يجفف الجلد تماما ويوضع يوراكس عليه وبذلك يخبث على جميع سطح الجسم (ما عدا الوجه وفروة الرأس) حتى تختفي آثار المستحضر من على سطح الجلد. ويجب تكرار الاستعمال، ويفضل مرة واحدة كل يوم في المساء لمدة تتراوح بين ٣ و ٥ أيام تبعا للاستجابة للعلاج، مع إيلاء أهمية خاصة للمواقع المعرضة بشكل خاص للإصابة بالقمل (بين الأصابع، المعصم، الإبط، منطقة الأعضاء التناسلية) وينبغي تغطية المناطق التي يتكون فيها صديد بضمادة مشربة باليوراكس. ويمكن للمريض أن يستحم أثناء فترة العلاج وذلك قبل كل استعمال مباشرة. وبعد استكمال العلاج، ينبغي الاستحمام لتنظيف الجسم ومن ثم يتم تغيير بياضات السرير والملابس الداخلية. وفي صغار الأطفال، لا يستعمل اليوراكس أكثر من مرة واحدة في اليوم.

قيود الاستعمال

نواهي الاستعمال

فرط الحساسية للمادة الفعالة أو المواد الحافظة، أي اللانولين في غسول اليوراكس.

الاحتياطات

ينبغي الحيلولة دون تلامس اليوراكس مع ملتصحة العين. وفي حالة حدوث مثل هذا التلامس عرضاً، يلزم غسل العين بالماء جيداً. ولا يوصى بالعلاج بالكريم في حالات الإصابات الجلدية الملتصحة بشكل حاد والإصابات الجلدية الراضحة أو الجروح الجلدية، وذلك بسبب احتمال الامتصاص الجهازى للدواء.

الحمل والإرضاع الطبيعي

لا تتوفر دراسات محكومة في النساء أو الحيوان. وفي هذه الظروف ينبغي ألا يستعمل المستحضر إلا إذا كانت الفائدة المتوقعة تبرر خطر تأثر الجنين. ويتطلب ذلك بوجه خاص على الاستعمال أثناء الثلاثة شهور الأولى من الحمل. وليس معروفاً ما إذا كانت المادة الفعالة لليوراكس تصل إلى لبن الثدي. ويجب أن تتجنب المرضعات وضع اليوراكس على منطقة الحلمات.

التأثيرات الجانبية

يتحمل الجسم يوراكس بصورة جيدة عموماً. ويحتمل في حالات نادرة حدوث تهيج أو حساسية أرجية تلامسية. وفي هذه الحالات يوقف استعمال المستحضر.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى

لم تسجل أي تفاعلات حتى الآن.

فرط الجرعة

سجلت حالة لزيادة جرعة الكروتاميتون واشتبه في وجود متهيموغلوبين في دم طفل عمره شهرين ونصف بعد استعمال كريم اليوراكس بشكل مفرط.

ملاحظات أخرى

التخزين

لا يستخدم كريم أو غسول اليوراكس بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العبوة <EXP>. الكريم والغسول: يحفظ بعيداً عن تأثير الحرارة (يخزن في درجة حرارة أقل من ٣٠°س). ينبغي حفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

العوات

الكريم: ٢٠ و ٦٠ غم. الغسول: ٥٠ مليلتر.

نوفارتيس كونسومر هيلث ش م
نيون - سويسرا

تاريخ تحديث المعلومات: فبراير/شباط ١٩٩٦

(إن هذا دواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فاطيب والصيدلاني هما الخياران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من لقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
وأحاد الصيدالة العرب