

للاستعمال الخارجي فقط.

الارتفاعجة وتوسيع حدقة العين وجفاف القم واحمرار الوجه واحتباس البول والاصابة بالحصى. وقد يصاب المريض بانخفاض ضغط الدم.

**علاج الجرعة المفرطة**

لا يوجد تریاقي محدد لمضادات الهيستامين، ويجب اجراء المساعدة المعتادة في حالات الحواري، بما في ذلك، في حالة ابتلاع المادة: القضم المشط، ملين مالح للأمعاء، فضلاً عن الإجراءات المعتادة المدعمة للقلب والجهاز التنفسى إذا لزم الأمر. وينبغي عدم استعمال المنشطات؛ وربما تُستخدم الأدوية القابضة للأدوية لعلاج انخفاض ضغط الدم.

**٥. الآثار الجانبية المحتملة**

أكثر الآثار الضارة السُّلْجُونَىَّةَ هي التفاعلات الجلدية الخفيفة والعايرة في منطقة الاستعمال، وفيما يلي الآثار الضارة وفقاً لتصنيف المرض و مدى التكرار على النحو التالي:

- آثار شائعة للغاية (كـ ١٠٪)، آثار شائعة (كـ ١٪ إلى < ١٠٪)، آثار غير شائعة (كـ < ١٪ إلى > ١٪)، آثار نادرة (كـ ١٪ إلى < ١٪)، آثار نادرة جداً (< ٠٠٠٠١٪).

**الأضطرابات الجلدية**

آثار غير شائعة: جفاف البشرة، الإحساس بحرقان في الجلد. التجارب فيما بعد مرحلة التسوق

الأضطرابات الجلدية: رصدت حالات نادرة جداً من الإصابة بالتهاب الجلد الناجم عن الحساسية.

**تفاعلات:**

لم تُجر دراسات خاصة بالتفاعل؛

**٦. كيفية تخزين فنستيل جل**

لا يُخزن في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.  
لا تستعمل المادة بعد انتهاء مدة الصلاحية المذكورة على العبوة الخارجية والشريط الدوائي صالح حتى آخر يوم من شهر تاريخ انتهاء الصلاحية.  
ينطبق هذا التاريخ حتى لو كانت الحرمة مفتوحة.  
يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.



صنف من قبل: جي آس كي كونسيومر هيلث كير إس إيه أر إل نيون سويسرا الشركة المالكة لحق التسويق: جي آس كي كونسيومر هيلث كير شويز أيه جي سويسرا

تاريخ المراجعة في يوليو ٢٠٢١  
GDS Version 1 SmPC ٢٠١١ بوليفيا

العلامة التجارية مملوكة / مرخصة لمجموعة شركات جي آس كي

**إن هذا الدواء**

- الدواء مستحضر يؤثر في صحتك واستهلاكه خلافاً للتوجيهات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبران بالدواء ونفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

**احتفظ بالأدوية بعيداً عن متناول الأطفال**

مجلس وزراء الصحة العرب  
اتحاد الصيادلة العرب

نشرة معلومات للمريض

**فنستيل**

جل ١٠٠%

للاستعمال الخارجي فقط.

يرجى قراءة هذه النشرة بالكامل وبامكان قبل بدء استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

- احرص دائمًا على استخدام هذا الدواء تماماً كما هو موضح في هذه النشرة أو حسب تعليمات الطبيب أو الصيدلي.

- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

- توجه للصيدلي إذا كنت بحاجة إلىزيد من المعلومات أو الشورة.

- في حالة حدوث أي آثار جانبية أخرى للطبيب أو الصيدلي. وذلك يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة.

- يجب التحدث إلى الطبيب إذا لم تحسن صحتك أو ساعت أعراض المرض.

في هذه النشرة:

١. على ما يحتوي فنستيل جل؟

٢. ما هو فنستيل جل وما هي دواعي استعماله؟

٣. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام فنستيل جل؟

٤. كيفية استعمال فنستيل جل

٥. الآثار الجانبية المحتملة

٦. كيفية تخزين فنستيل جل

١. على ما يحتوي فنستيل جل؟

يحتوى جم فنستيل جل على ١ جم مالمات الديميتيدين كمادة فعالة. المواد الإضافية ذات التأثير المعروفة: جيلوكال البروبيلين وكlorid البنزاكتوكينيوم محلول ٥٪ المواد الإضافية الأخرى: كاربومير، هيدروكسيد الصوديوم، إيديتات الدايصونيوم، ماء مقطر.

٢. ما هو فنستيل جل وما هي دواعي استعماله؟

يتمتع فنستيل جل بفاعلية ضد الأضطرابات الجلدية التي يصاحبها الحكة، مثل دغمات الحشرات، وحرق الشمس الموضعية الخفيفة، والحرق السطحية البسيطة، والأمراض الجلدية الموضعية بسبب الحساسية. ويسهل أساس الجل اختراق المادة الفعالة للبشرة، ومن ثم يُشفي المريض سريعاً من الحكة والهياج (بعد بضع دقائق).

٣. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام فنستيل جل؟

٤. يرجى تجنب استخدام فنستيل جل في الحالات التالية:

- الحساسية المفرطة من المادة المفقرة، مالمات الديميتيدين، أو أي من المواد الإضافية المذكورة أعلاه.

- لا يمكن استخدام المنتج كعلاج لحالات الحساسية المعروفة تجاه لدغات الحشرات (الأشكل الدوائية النظمانية متوفرة لهذا الغرض).

ب. التحذيرات والاحتياطات

- يرجى عدم إعطاء المنتج إلى الأطفال الأقل من عامين من دون وصفة طيبة.
- يرجى تجنب وضع الدواء على مساحات كبيرة، لا سيما في الأطفال الرضع والأطفال صغار السن.
- يرجى تجنب طول فترة التعرض المفتوحة التي تخضع للعلاج إلى الشمس.

يحتوى فنستيل جل على:

- جيلوكال البروبيلين الذي قد يسبب تهيجاً موضعياً طفيفاً للجلد.
- كلوريد البنزاكتوكينيوم الذي يسبب هياجاً، وقد يؤدي إلى تفاعلات جلدية.

ج. الحمل والرضاعة الطبيعية

**الحمل**

لم تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات حول مادة مالمات الديميتيدين إمكانية التسبب في التشوه الخلقى، ولم تُشر إلى حدوث آثار ضارة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص الحمل أو نمو الجنين أو مخاطر الولادة أو نمو الجنين بعد الولادة.

وفي أثناء الحمل، ينبغي عدم استخدام دواء فنستيل على مساحات كبيرة من البشرة، لا سيما الأنسجة الماجرواة أو المتهيأة.

**الرضاعة الطبيعية**

تسري احتياطات الحمل ذاتها على الأمهات المرضعات. علاوة على ذلك، ينبغي عدم وضع المنتج على الحلمتين أثناء الرضاعة.

ه. القيادة واستخدام الآلات

لا يوجد مستحضرات فنستيل الموضعية أي تأثير أو ربما يكون لها تأثير لا يذكر في القدرة على القيادة أو استخدام الآلات.

٤. كيفية استعمال فنستيل جل

البالغين والأطفال الأكبر من عامين: توضع طبقة رقيقة من دواء فنستيل ما بين ٢ إلى ٤ مرات في اليوم على المناطق التي تخضع للعلاج، وتُدلك بلطف.

في الأطفال دون سن ٢ سنة، لا يمكن استخدام المنتج إلا بوصفة طبية.

**الجرعة المفرطة**

ربما يؤدي ابتلاع كمية كبيرة من مادة مالمات الديميتيدين الموضعية عن طريق الخطأ إلى ظهور بعض الأعراض التي تتسم بها الجرعة المفرطة مع مضادات الميسياتمن من النوع H، تشنج الجهاز العصبي المركزي يصاحبه دور (مع البالغين في الأساس)، تتباهي الجهاز العصبي المركزي وأثار مضاد المسكارين (لا سيما مع الأطفال)، بما في ذلك الاثارة والترنج والهلاوس والتشنجات التوتيرية