

## معلومات مهمة للمريض

اقرأ جيداً هذه النشرة وستجد جميع المعلومات المهمة الخاصة بالدواء.  
تم وصف هذا الدواء من قبل طبيبك أو بدون وصفة من قبل الصيدلي أو بواسطة الكيميائي المختص بتركيب الأدوية.  
وللحصول على أفضل النتائج المرجوة من هذا الدواء فعليك إتباع التوجيهات الواردة هنا بدقة تامة بخصوص استعماله حسب ما هو مذكور بالنشرة، أو عند اللزوم حسب توجيه طبيبك، أو الصيدلي أو المختص بتركيب الأدوية.  
احتفظ بهذه النشرة للرجوع إليها مرة أخرى عند اللزوم.

# سينيكود®

شراب

أقراص ٥٠ ملجرام

المراهقون من عمر ١٢ سنة: ١٥ ميليلتر ٣ مرات يوميا  
البالغون: ١٥ ميليلتر ٤ مرات يوميا  
استعمل المعيار المدرج الموجود مع العبوة وقم بغسل الكأس بعد الاستعمال وكذلك بعد استعماله من قبل أي شخص آخر.  
الأقراص: ٥٠ ملجرام  
المراهقون من ١٢ سنة: من ١ إلى ٢ قرص يوميا.  
البالغون: ٢ إلى ٣ أقراص يوميا على فترات من ٨ إلى ١٢ ساعة.  
يجب بلع القرص من غير مضغ.

يستحسن تناول الشراب أو الأقراص إذا أمكن قبل تناول الطعام.  
إذا استمر السعال لأكثر من ٧ أيام، يجب استشارة الطبيب.  
فضلاً، عليك مراعاة الجرعة المبنية على النشرة الطبية أو تلك الموصوفة لك من قبل طبيبك.  
إذا اعتقدت أن فعالية العلاج ضعيفة جداً، أو قوية جداً فيجب عليك استشارة طبيبك أو الصيدلي أو الكيميائي المختص.

## ما هي الأعراض الجانبية التي يمكن أن يسببها السنيكود؟

يمكن أن يسبب السنيكود الأعراض الجانبية التالية:  
طفح جلدي في حالات نادرة، الغثيان، أو الإسهال، أو الدوار أو الخمول.  
إذا شعرت بأي عرض جانبي آخر فعليك إخطار طبيبك أو الصيدلي أو الكيميائي المختص.

## ملاحظات إضافية:

يجب حفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.  
شراب: يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠° م.  
أقراص ٥٠ ملجرام: يحفظ من الرطوبة. يخزن في درجة حرارة أقل من ٢٥° م،  
وان تجنبها من الرطوبة.  
لا يجب استعمال الدواء بعد انتهاء فترة صلاحيته المبنية بعد <EXP>.

وعليك سؤال الطبيب عن أي معلومات إضافية حيث أنه، بموجب تخصصه يمتلك معلومات تفصيلية في هذا المجال.

## على ماذا يحتوي سنيكود؟

الشراب: تحتوي ١٠ ميليلتر من الشراب على ١٥ ملجرام سترات البيوتاميريت كمادة فعالة وسكرين، وسوربيتول، وفانيلين كسواغ، وحمض البنزويك (إي ٢١٠) كمادة حافظة بالإضافة إلى السواغات الأخرى.  
الأقراص ٥٠ ملجرام: ملجم: تحتوي الحبة الواحدة على ٥٠ ملجرام سترات البيوتاميريت كمادة فعالة والمولونات ايريتروسين (إي ١٧٢) كسواغ وأوكسيد الحديد (إي ١٧٢) بالإضافة إلى سواغات أخرى.

## أين يمكن الحصول على سنيكود؟ وما هي العيوات المتوفرة؟

في الصيدلية أو عند الكيميائي بدون وصفة.  
الشراب: زجاجات تحتوي ٢٠٠ ميليلتر.  
الأقراص: عبوة ٥٠ ملجرام شريط من ١٠ أقراص.  
نوفارتس كونسويمير هيلث نون سويسرا  
تاريخ تحديث المعلومات: أكتوبر ٢٠٠٦ م

## (إن هذا دواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فاطميين والصيدلاني هما الخياران بالدواء وينبغي وضرره.
- لا تقطع علاج المجددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

اجلس وزراء الصحة العرب

وإتحاد الصيدالة العرب

## ما هو سنيكود وما هي دواعي الاستعمال؟

سنيكود يسكن السعال وحالات تهيجه أثناء نزلات البرد. بالإضافة إلى إمكانية استعماله بموجب وصفة الطبيب لعلاج حالات السعال الحادة ذات المصادر الأخرى.  
يمكن استعمال سنيكود للأطفال من عمر ٣ سنوات في شكل شراب وللأشخاص من عمر ١٢ سنة في شكل أقراص.

## ما هي الأشياء التي يجب وضعها في الحسبان بعيداً عن المعالجة؟

من المعلوم أن التدخين يزيد من حدة السعال. يجب عليك مساندة مفعول سنيكود بالتوقف عن التدخين. ولتحلية مذاق السنيكود تمت إضافة السكرين والسوربيتول إليه، وبذلك يمكن استعماله حتى بواسطة المصابين بداء السكري. وتحتوي الأقراص عبوة ٥٠ ملجرام على ٩٣ ملجرام من اللاكوز ومن هنا فإن استعماله بواسطة المصابين بداء السكري يمكن اعتباره بدون أي خطورة.

## متى يمنع استعمال سنيكود؟

لا يستعمل سنيكود إذا كان المريض مصاباً بالحساسية ضد المادة الفعالة للسنيكود أو ضد أي من سواغات، بالإضافة إلى أنه يجب عدم تناول العلاج لك أو لطفلك إذا كنتم تعانون من المرض الوراثي (النادر) الذي يظهر في تمثيل السكر المعروف بالحساسية المفرطة للفركتوز.  
يحتوي الشراب على السوربيتول كمادة تحلية للشراب وأثناء الهضم يؤدي هذا السكر إلى تكوين الفركتوز.

الأقراص عبوة ٥٠ ملجرام ليست مناسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٢ سنة نتيجة احتوائها على كمية زائدة من المادة الفعالة.  
ويعلم طبيبك أو الصيدلي ما الواجب عمله في تلك الحالات.

## ما هي الاحتياطات الواجب إتباعها أثناء استعمال السنيكود؟

إذا استمر السعال لأكثر من ٧ أيام فمن الضروري الرجوع إلى الطبيب. فإذا كان السعال لديك أو لدى طفلك إفرزياً بمعنى أن يكون مصحوباً بالبلغم، فعليك استشارة طبيبك قبل البدء في تناول السنيكود. إخماد السعال يزيد من تراكم الإفرازات في الشعب الرئوية مما يزيد من خطورة إصابة الجداري التنفسية (مثلاً التهاب الرئوي النيومونيا) ويمكن أيضاً أن يسبب ألماً حاداً في الشعب الرئوية يسمى (البرونكوإسازم) ولذلك يجب التوقف عن استعمال العلاج الذي يسهل إفرازات الشعب الرئوية (البلغم) أثناء استعمال السنيكود.

يجب أخذ الحذر في حالة قيادة السيارات أو تشغيل الآلات عند تناول هذا الدواء. الرجاء إخطار طبيبك أو الصيدلي أو الكيميائي المختص بتركيب الأدوية إذا كنت أنت أو طفلك تعانون من أي مرض آخر أو كانت لديكم حساسية أو تتناولون أي علاج آخر سواء كان ذلك العلاج داخلياً أو خارجياً (حتى لو كان تطبيقياً ذاتياً).

## هل يمكن استعمال السنيكود أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية؟

فقط يمكنك استعمال السنيكود أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية إذا نصح طبيبك بذلك.

## كيفية تناول السنيكود؟

اتبع التوجيهات التالية إلا إذا نصح طبيبك بغير ذلك:

الشراب من عمر ٣ سنوات

الأطفال من عمر ٣ سنوات إلى ٦ سنوات: ٥ ميليلتر ٣ مرات يوميا

من عمر ٦ سنوات إلى ١٢ سنة: ١٠ ميليلتر ٣ مرات يوميا