

نشرة الجبوة: معلومات للمستخدم

إميسيسرو ٢٥٠ مجم أقراص مغلفة

إميسيسرو ٥٠٠ مجم أقراص مغلفة

إميسيسرو ٧٥٠ مجم أقراص مغلفة

سبيرو وفلو كساسين

يُرجى قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.

إنهخطأبعضه النشرة، قد تحتاج لقراءة أمرها مرة أخرى.

• إذا كنت لديك أية أسئلة أخرى، فاسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

• تم وصف هذا الدواء، لأنه فلا تعلمه الآخرين؛ قد يفرض بيهم، حتى إذا كانوا يعلمون من نفس الأعراض التي تعاني أنت منها.

• إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو إذا لاحظت أية آثار جانبية غير المرجوة في هذه النشرة، فيرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

محتويات هذه النشرة :

١- ما هو إميسيسرو ؟ وفيغ يستخدم؟

٢- قبل تناول إميسيسرو .

٣- كيفية تناول إميسيسرو .

يعتبر إميسيسرو من المضادات الحيوية التي تنتمي إلى فئة الفلورو كينولون. المادة الفعالة في سبيروفلوكساسين. يقوم سبيروفلوكساسين بالقضاء على البكتيريا التي تسبب العدوى، ولا يؤثر إلا على سلالات بكتيريا محددة.

الوقاية

• عدوى الجهاز التنفسي. • العدوى المتكررة في الجيوب الأنفية أو الأنف أو التي تستمر لفترات طويلة.

• عدوى الجهاز البولي. • عدوى الجهاز التنفسي في الرجال والنساء.

• عدوى الجهاز الهضمي والعدوى داخل البطن. • عدوى الجلد والأمسامة والوخة.

• عدوى العظام والمفاصل. • للوقاية من العدوى الناتجة عن بكتيريا التشنؤية الشحميّة.

• التعرض لاستنشاق بكتيريا الجمره الخبيثة.

يتم استخدام سبيروفلوكساسين في علاج المرضى الذين يعانون من قلة عدد كريات الدم البيضاء (قلّة العدلات) والمصابين بخمى يشبهه أن يكون مصاباً بمرض تعرضهم لعدوى بكتيرية. إذا كنت تعاني من عدوى شديدة أو عدوى ناتجة عن أكثر من نوع واحد من أنواع البكتيريا، فربما يتم إعطائك علاجاً إضافياً بمضادات حيوية أخرى بالإضافة لإميسيسرو.

الأطفال والمراهقون

• يتم استخدام إميسيسرو في الأطفال والمراهقين، تحت إشراف طبي متخصص، لعلاج العدوى البكتيرية التالية:

• عدوى الرئة والتهابها البوليائية في الأطفال والمراهقين الذين يعانون من ضعف المناعة.

• عدوى الجهاز البولي المصحوبة بمضاعفات، بما في ذلك العدوى التي امتدت إلى الكلتين (التهاب الحويضة والكليّة).

• التعرض لاستنشاق بكتيريا الجمره الخبيثة.

إذا وجد طبيبك أن ذلك ضروري، فيمكن أيضاً استخدام إميسيسرو لعلاج حالات أخرى لعدوى شديدة معينة في الأطفال والمراهقين.

٢ - قبل تناول إميسيسرو

لا تتناول إميسيسرو في الحالات الآتية:

• إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) تجاه المادة الفعالة أو تجاه عقاير كينولون أخرى أو أي من مكونات إميسيسرو الأخرى (انظر قسم ٦).

• إذا كان لديك عتار تيزاندين (نظر قسم ٢ "معلومات إضافية أخرى")

توخ حذراً خاصاً مع إميسيسرو

قبل تناول إميسيسرو

أخبر طبيبك في الحالات الآتية:

• إذا كنت قد عانيت مسبقاً من مشاكل في الكلى حيث قد تحتاج إلى تعديل العلاج الذي تتناوله.

• إذا كنت تعاني من صرع أو حالات عصبية أخرى.

• إذا كان لديك تاريخ مرضي من الإصابة بمشاكل بالأوتار خلال علاج مسبق بمضادات حيوية مثل سبيروفلوكساسين.

• إذا كنت تعاني من مرض ألوهن العضلي (بوليف نوج من أنواع ضعف العضلات).

• إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب يجب توخي الحذر عند استخدام سبيروفلوكساسين، إذا كنت تعاني من إبالة فترة QT منذ الولادة (تتم ملاحظته في رسم القلب ECG)، أو لمدى عاتلك تاريخ مرضي للإصابة بها أو تعاني من عدم توازن مستويات الألاح في الدم (خاصةً انخفاض مستويات البوتاسيوم أو الماغنسيوم في الدم)، أو تعاني من بطء شديد في النظم القلبي (بطء القلب)، أو تعاني من ضعف القلب (هبوط وظائف القلب)، أو إذا كنت تتناول مرضي من الإصابة بزيادة الفوسفات (مشاهدة عضلة القلب) أو كنت تشئي أو من المسنين أو كنت تتناول أدوية أخرى تؤدي إلى تغييرات أيونية في طبيعة في الدم (انظر قسم ٢ "تولاق أدوية أخرى").

للعلاج ببعض أنواع عدوى الجهاز التنفسي، يمكن أن يصف طبيبك مضاداً حيوياً آخرً بالإضافة إلى سبيروفلوكساسين. يُرجى استشارة طبيبك إذا لم يحدث تحسن في الأعراض بعد مرور ٣ أيام من العلاج.

أخبر طبيبك على الفور إذا حدث أي مما يلي أثناء تناول إميسيسرو، وسوف يقرر طبيبك ما إذا كان ينبغي إيقاف العلاج بميسيسرو أو لا.

• **فقدان حساسية شديد ومفاجئ** (تفاعل تألقي، صدمة تأقية، ودمة وعائية). حتى مع تناول الجرعة الأولى قد يكون هناك احتمال ضئيل أن تعاني من تفاعل حساسية شديد مع ظهور الأعراض التالية: ضيق في الصدر، أو شعور بوخة، أو إعياء، أو إضعاف أو إصابتك بوخة عند التحرك.

• **تورخ** في بعض الأحيان **مع تورخم** و**المفاصل والأوتار**، خاصة إذا كنت كبيراً في السن، وقد علاجك أيضاً بالستيروكورتيكوستيرويدات.

• في يحدث التهاب في الأوتار أو التهابات أخرى أثناء أو بعد ٤٨ ساعة من بدء شعور بعد إيقاف العلاج بميسيسرو. قد تظهر ألامى عضلات ألامى أو التهابات تورخ عن تناول إميسيسرو وأرج المنطقه المؤلمة. تجنب ممارسة أي تمرين غير ضروري، حيث قد يزيد ذلك من احتمال حدوث تورخ في الأوتار.

• إذا كنت تعاني من **صرع** أو **حالات عصبية** أخرى مثل الإلتهال الدماغي أو السكتة الدماغية، فقد تعاني من آثار جانبية مرتبطة بالهجز العصبي المركزي. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول إميسيسرو، واتصل بطبيبك على الفور.

• قد تعاني من **فقدان تافسية** عند تناولك إميسيسرو للمرة الأولى. إذا كنت تعاني من **إكتئاب** أو **أذهان**؛ فقد تسوء الحالة أثناء العلاج، وبميسيسرو . في حالات نادرة، يحدث تدهور للكتئاب أو الأذهان ليصبح أفديرة استعجابية أو اكتئابية أو انتحار بالفعال. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول إميسيسرو، واتصل بطبيبك على الفور.

• قد تعاني من أعراض اختلال العصب مثل ألم، حرققة، وخز، وتميل وأو ضعف. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول إميسيسرو واتصل بطبيبك على الفور.

• قد تعاني من **إسهال** أثناء تناولك مضادات حيوية، بما في ذلك إميسيسرو ، أو حتى بعد عدة أسابيع من توقفك عن تناولها. إذا أصبح هذا الإسهال شديداً أو مستمرًا، أو لاحظت أن البراز يحتوي على دم أو مخاط، توقف عن تناول إميسيسرو على الفور، حيث قد يكون ذلك أمراً مهدداً للصحة.

• إذا كنت لا تتناول أية أدوية لإيقاف حركة الأمعاء وإبطائها، واتصل بطبيبك.

• إذا توجب عليك تقديم عيئة **معد** أو **بول** فأخبر الطبيب أو فريق العمل المختصين بذلك لتتوالق إميسيسرو.

• إذا كنت تعاني من **مشاكل بالكلية**، فأخبر الطبيب جيداً عن تاريخك الطبي عند بدء تناول الجرعة المحددة لك.

• إذا كنت تعاني من **مشاكل بالقلب**، فإخبر طبيبك على الفور عن تاريخك الطبي عند بدء تناول الجرعة المحددة لك.

• قد يسيب إميسيسرو انخفاضاً في عدد كريات الدم البيضاء، و**انتمصل** طبيبك على الفور. • قد **تفتضح قوامك اللعوي**. يجب أن تستشير طبيبك على الفور إذا عانيت من أي من الأعراض التالية: • تورخ حاد في العينين، وتدهور الحالة العامة بشكل خطير، أو أي مصحوبة بأعراض عدوى موضعية مثل احقان الحلق/ اللغزوم، ألم في المفاصل أو في البطن، تورخ حاد اختبار دم للتحقق من انخفاض مستويات الختمل في الدم عدد كريات الدم البيضاء (نزعة العدلات). • تورخ حاد في العينين مع تورخ طبيبك عن تناولك لهذا الدواء.

• يجب إبلاغ طبيبك إذا كان من المعروف أنك تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من نقص إنزيم نازعة نازعة هيدروجين الجلوكوز-٦. هوفغاست (G6PD)، حيث قد تعاني من مخاطر للإصابة بقرح الدم عند تناولك سبيروفلوكساسين.

• يجب جلدك أكثر حساسية **لأشعة الشمس** أو **الأشعة فوق البنفسجية** عند تناول إميسيسرو. تجنب التعرض لأشعة الشمس القوية، أو الأشعة فوق البنفسجية مباشرةً مع تناولك المشمشية (إسرة تسكير البشرة).

تناول أدوية أخرى

يرجاه إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما فيها الأدوية التي حصلت عليها بدون وصفة طبية.

لا تتناول إميسيسرو مع عقار تيزاندين، حيث قد يسبب ذلك آثاراً جانبيةً مثل انخفاض ضغط الدم والنعاس (انظر قسم ٢: "لا تتناول إميسيسرو"). تُصرف الأدوية التالية بتدليها مع إميسيسرو في الجسم. من الممكن أن يؤثر تناول المترام لأميسيسرو مع هذه الأدوية على التأثير العلاجي لهذه الأدوية كذلك قد يزيد من احتمالية حدوث آثار جانبية.

أخبر طبيبك إذا كنت تتناول:

• مناهضات فيتامين ج (مثل: عقار وفارقين) أو مضادات تجلط أخرى تؤخذ عن طريق الفم (زيادة سيولة الدم).

• عقار بروبيبيسيد (الذي يُستخدم لعلاج القرص).

• عقار بروتوكاسات (الذي يُستخدم لعلاج بعض أنواع السرطان والصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي).

• عقار فلويفين (الذي يُستخدم لعلاج مشاكل التنفس).

• عقار تيزاندين (الذي يُستخدم لعلاج فرط التوتر العضلي المصاحب لمرض تصلب المتعد).

• عقار ألترازين (مضاد للذهان).

• عقار روفينيدول (الذي يُستخدم لعلاج مرض باركنسون). • عقار ليفيندين.

• عقار كيميولبتين (يستخدم لعلاج ضربات القلب غير الطبيعية) • عقار ميثوكوراميد (الذي يُستخدم لعلاج التهاب العيُان والته).

• عقار سيكلوسبورين (الذي يُستخدم لعلاج حالات الجلد والتهاب المفاصل الروماتويدي وفي زراعة الأعضاء).

• عقار جليسينيكلاميد (الذي يُستخدم لعلاج مرض السنتري).

• أدوية أخرى يمكنها تغيير النظم القلبي: أدوية تنتمي إلى فئة مضادات اضطرابات النظم القلبي (مثل عقار كينيدين، وعقار هيدروكينيدين، وعقار سيديريبيد، وعقار أميودارون، وعقار سوتالول، وعقار فوفيتيليد، وعقار إيوفيتيليد)، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، وبعض مضادات اللمبيوت، (عقار إيميدازول، وعقار الكوراميدازول)، وعقار مضادات الالتهاب.

• قد يزيد إميسيسرو من مستويات الأدوية التالية في الدم:

• عقار بنتوكسيلين (الذي يُستخدم لعلاج اضطرابات الدورة الشهرية). • مادة الكافيين.

• عقار ديلوكسيلين (الذي يُستخدم لعلاج الاكتئاب أو التلغ المعسبي الناتج عن مرض السنتري أو سلس البول).

• عقار ليفيدوكاين (الذي يستخدم لعلاج حالات القلب أو لتخدير).

• عقار سيلينديفيل (الذي يستخدم على سبيل المثال لعلاج حالات الاكتئاب).

تقلل بعض الأدوية من تأثير إميسيسرو. أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أو ترغب في تناول:

• مضادات حموضة. • عقار زامبييرazol. • مثببات غذائية تحتوي على معادن. • عقار سوكرا فلات.

• الوبوليرات (الرابعة للنفوسات (مثل عقار سيفلامين).

• أدوية أو مكملات غذائية تحتوي على كالسيوم أو ماغنسيوم أو ألومنيوم أو حديد على سبيل المثال أقراص تيدانولزين (عقار مضاد للقرص) • عقار سيكلوسبورين (يستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشري HIV) .

إذا كان تناول هذه المتصحات ضروريًا، فتناول إميسرو قبل تناولها بحوالي ساعتين أو بعد تناولها بفترة لا تقل عن أربع ساعات.

ما إذا كنت تتناول إميسيسرو أثناء الحمل، فلا تكل أو تُثرب أي من منتجاتها (مثل اللبن أو الزبادي) أو مشروبات بها كالسيوم مضاف عند تناول الأقرص؛ لأنها قد تؤثر على امتصاص المادة الفعالة.

الحمل والرضاعة الطبيعية

يفضل تجنب استخدام إميسيسرو خلال الحمل. أخري طبيبك إذا كنت تودين الحمل.

لا تتناول إميسيسرو خلال الرضاعة الطبيعية حيث قد يمر سبيروفلوكساسين إلى لبن الثدي وقد يضر طفلك.

القيادة واستخدام الآلات

قد يقلل إميسيسرو من بظلك. قد تحدث بعض الآثار الجانبية المعسية، لذا، تأكد من كيفية تأثير إميسيسرو عليك قبل قيادة مركبة أو تشغيل آلة. تحدث إلى طبيبك إذا كنت غير متأكد.

٣ - كيفية تناول إميسيسرو

تناول أقراص إميسيسرو دائما كما أخبرك طبيبك بالضبط. يجب أن تراجع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا. تتوالق أقراص إميسيسرو مع الوجبات، ويجب تناول الأقرص دائما مع الكثير من الماء. حيث يمنع ذلك تكون بلورات مسخرة في البول (بيلة البورات) . بإمكانك أن تتناول الأقرص في أوقات تناول الوجبات أو فيما بينهم. إن يؤثر إن كالسيوم تتناولته كجزء من وجبة بشكل خطير على عملية الامتصاص. ومع ذلك، لا تتناول أقراص سبيروفلوكساسين مع منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي، أو عصير الفاكهة المتوالق (مثل عصير البرتقال المغري بالإضافة للكالسيوم) . أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، لأن جرعتك قد تحتاج إلى تعديل. ستعتمد جرعتك على نوع وشد العدوى التي تعاني منها، وعلى سنك ووزنك وظروف الكلى لديك. سيؤم طبيبك بإختيار أفضل جرعة بالنسبة لك.

اليومون

تكون الجرعة المعتادة بين بين ١٠٠٠ - ٧٥٠ مجم مرتين يوميًا . في عدوى الجهاز التنفسي تكون الجرعة المعتادة ٥٠٠ - ٧٥٠ مجم مرتين يوميًا . في عدوى المثانة والتهني ، تكون الجرعة المعتادة ٥٠٠ - ٧٥٠ مجم مرتين يوميًا .

في مرض السيلان ، تكون الجرعة المعتادة ٢٥٠ - ٥٠٠ مجم كجرعة مفردة في عدوى الجهاز الهضمي ، تكون الجرعة المعتادة ٥٠٠ مجم مرتين يوميًا . في العدوى داخل البطن ، وعدوى الجلد والأمسامة الرخوة ، وعدوى العظام والمفاصل ، وفي المرضين الذين يعانون من قلّة خلايا العدلات (أحد أنواع خلايا الدم البيضاء) ، تكون الجرعة المعتادة ٥٠٠ - ٧٥٠ مجم مرتين يوميًا . وفي العدوى الناتجة عن بكتيريا التشنؤية الشحميّة (بكتيريا تسبب التهاب السحايا) تكون الجرعة المعتادة ٥٠٠ مجم كجرعة مفردة. وعند التعرض للجمرة الخبيثة (أنتراكس) عن طريق الاستنشاق ، تكون الجرعة المعتادة ٥٠٠ مجم مرتين يوميًا.

المرضى من كبار السن

سيؤم طبيبك بتحديد الجرعة التي سيعطيكها لك بتحديد الجرعة التي سيعطيكها لك . قد تكون الجرعة أقل من الجرعة المعتادة للبالمغين وقفا لشدة العدوى التي تعاني منها وظروف الكلى لديك.

مشاكل بالكلية / الكبد

سيؤم طبيبك بتحديد الجرعة التي سيعطيكها لك بتحديد الجرعة التي سيعطيكها لك . قد تكون الجرعة أقل من الجرعة المعتادة للبالمغين وقفا لتسبيل كربي (كبد دموي) ، أو إذا كنت تحتاج للتسبيل المستمر المتقطع (CAPD) .

الأطفال والمراهقون

يتم استخدام إميسيسرو في الأطفال والمراهقين، تحت إشراف طبي متخصص، لعلاج العدوى البكتيرية التالية:

• عدوى الجهاز التنفسي. • العدوى المتكررة في الجيوب الأنفية أو الأنف أو التي تستمر لفترات طويلة.

• عدوى الجهاز البولي. • عدوى الجهاز التنفسي في الرجال والنساء.

• عدوى الجهاز الهضمي والعدوى داخل البطن. • عدوى الجلد والأمسامة والوخة.

• عدوى العظام والمفاصل. • للوقاية من العدوى الناتجة عن بكتيريا التشنؤية الشحميّة.

• التعرض لاستنشاق بكتيريا الجمره الخبيثة.

يتم استخدام سبيروفلوكساسين في علاج المرضى الذين يعانون من قلة عدد كريات الدم البيضاء (قلّة العدلات) والمصابين بخمى يشبهه أن يكون مصاباً بمرض تعرضهم لعدوى بكتيرية. إذا كنت تعاني من عدوى شديدة أو عدوى ناتجة عن أكثر من نوع واحد من أنواع البكتيريا، فربما يتم إعطائك علاجاً إضافياً بمضادات حيوية أخرى بالإضافة لإميسيسرو.

• **فقدان حساسية شديد ومفاجئ** (تفاعل تألقي، صدمة تأقية، ودمة وعائية). حتى مع تناول الجرعة الأولى قد يكون هناك احتمال ضئيل أن تعاني من تفاعل حساسية شديد مع ظهور الأعراض التالية: ضيق في الصدر، أو شعور بوخة، أو إعياء، أو إضعاف أو إصابتك بوخة عند التحرك.

• **تورخ** في بعض الأحيان **مع تورخم** و**المفاصل والأوتار**، خاصة إذا كنت كبيراً في السن، وقد علاجك أيضاً بالستيروكورتيكوستيرويدات.

• في يحدث التهاب في الأوتار أو التهابات أخرى أثناء أو بعد ٤٨ ساعة من بدء شعور بعد إيقاف العلاج بميسيسرو. قد تظهر ألامى عضلات ألامى أو التهابات تورخ عن تناول إميسيسرو وأرج المنطقه المؤلمة. تجنب ممارسة أي تمرين غير ضروري، حيث قد يزيد ذلك من احتمال حدوث تورخ في الأوتار.

• إذا كنت تعاني من **صرع** أو **حالات عصبية** أخرى مثل الإلتهال الدماغي أو السكتة الدماغية، فقد تعاني من آثار جانبية مرتبطة بالهجز العصبي المركزي. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول إميسيسرو، واتصل بطبيبك على الفور.

• قد تعاني من **فقدان تافسية** عند تناولك إميسيسرو للمرة الأولى. إذا كنت تعاني من **إكتئاب** أو **أذهان**؛ فقد تسوء الحالة أثناء العلاج، وبميسيسرو . في حالات نادرة، يحدث تدهور للكتئاب أو الأذهان ليصبح أفديرة استعجابية أو اكتئابية أو انتحار بالفعال. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول إميسيسرو، واتصل بطبيبك على الفور.

• قد تعاني من أعراض اختلال العصب مثل ألم، حرققة، وخز، وتميل وأو ضعف. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول إميسيسرو واتصل بطبيبك على الفور.

• قد تعاني من **إسهال** أثناء تناولك مضادات حيوية، بما في ذلك إميسيسرو ، أو حتى بعد عدة أسابيع من توقفك عن تناولها. إذا أصبح هذا الإسهال شديداً أو مستمرًا، أو لاحظت أن البراز يحتوي على دم أو مخاط، توقف عن تناول إميسيسرو على الفور، حيث قد يكون ذلك أمراً مهدداً للصحة.

• إذا كنت لا تتناول أية أدوية لإيقاف حركة الأمعاء وإبطائها، واتصل بطبيبك.

• إذا توجب عليك تقديم عيئة **معد** أو **بول** فأخبر الطبيب أو فريق العمل المختصين بذلك لتتوالق إميسيسرو.

• إذا كنت تعاني من **مشاكل بالكلية**، فأخبر الطبيب جيداً عن تاريخك الطبي عند بدء تناول الجرعة المحددة لك.

• إذا كنت تعاني من **مشاكل بالقلب**، فإخبر طبيبك على الفور عن تاريخك الطبي عند بدء تناول الجرعة المحددة لك.

• قد يسيب إميسيسرو انخفاضاً في عدد كريات الدم البيضاء، و**انتمصل** طبيبك على الفور. • قد **تفتضح قوامك اللعوي**. يجب أن تستشير طبيبك على الفور إذا عانيت من أي من الأعراض التالية: • تورخ حاد في العينين، وتدهور الحالة العامة بشكل خطير، أو أي مصحوبة بأعراض عدوى موضعية مثل احقان الحلق/ اللغزوم، ألم في المفاصل أو في البطن، تورخ حاد اختبار دم للتحقق من انخفاض مستويات الختمل في الدم عدد كريات الدم البيضاء (نزعة العدلات). • تورخ حاد في العينين مع تورخ طبيبك عن تناولك لهذا الدواء.

• يجب إبلاغ طبيبك إذا كان من المعروف أنك تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من نقص إنزيم نازعة نازعة هيدروجين الجلوكوز-٦. هوفغاست (G6PD)، حيث قد تعاني من مخاطر للإصابة بقرح الدم عند تناولك سبيروفلوكساسين.

• يجب جلدك أكثر حساسية **لأشعة الشمس** أو **الأشعة فوق البنفسجية** عند تناول إميسيسرو. تجنب التعرض لأشعة الشمس القوية، أو الأشعة فوق البنفسجية مباشرةً مع تناولك المشمشية (إسرة تسكير البشرة).

تناول أدوية أخرى

يرجاه إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما فيها الأدوية التي حصلت عليها بدون وصفة طبية.

لا تتناول إميسيسرو مع عقار تيزاندين، حيث قد يسبب ذلك آثاراً جانبيةً مثل انخفاض ضغط الدم والنعاس (انظر قسم ٢: "لا تتناول إميسيسرو"). تُصرف الأدوية التالية بتدليها مع إميسيسرو في الجسم. من الممكن أن يؤدي الوفة في حالات نادرة جدًا) (انظر قسم ٢:

• تورخ حاد في العينين، وتدهور الحالة العامة بشكل خطير، أو أي مصحوبة بأعراض عدوى موضعية مثل احقان الحلق/ اللغزوم، ألم في المفاصل أو في البطن، تورخ حاد اختبار دم للتحقق من انخفاض مستويات الختمل في الدم عدد كريات الدم البيضاء (نزعة العدلات). • تورخ حاد في العينين مع تورخ طبيبك عن تناولك لهذا الدواء.

• في يحدث التهاب في الأوتار أو التهابات أخرى أثناء أو بعد ٤٨ ساعة من بدء شعور بعد إيقاف العلاج بميسيسرو. قد تظهر ألامى عضلات ألامى أو التهابات تورخ عن تناول إميسيسرو وأرج المنطقه المؤلمة. تجنب ممارسة أي تمرين غير ضروري، حيث قد يزيد ذلك من احتمال حدوث تورخ في الأوتار.

• إذا كنت تعاني من **صرع** أو **حالات عصبية** أخرى مثل الإلتهال الدماغي أو السكتة الدماغية، فقد تعاني من آثار جانبية مرتبطة بالهجز العصبي المركزي. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول إميسيسرو، واتصل بطبيبك على الفور.

• قد تعاني من **فقدان تافسية** عند تناولك إميسيسرو للمرة الأولى. إذا كنت تعاني من **إكتئاب** أو **أذهان**؛ فقد تسوء الحالة أثناء العلاج، وبميسيسرو . في حالات نادرة، يحدث تدهور للكتئاب أو الأذهان ليصبح أفديرة استعجابية أو اكتئابية أو انتحار بالفعال. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول إميسيسرو، واتصل بطبيبك على الفور.

• قد تعاني من أعراض اختلال العصب مثل ألم، حرققة، وخز، وتميل وأو ضعف. إذا حدث هذا الأمر في، توقف عن تناول إميسيسرو واتصل بطبيبك على الفور.

• قد تعاني من **إسهال** أثناء تناولك مضادات حيوية، بما في ذلك إميسيسرو ، أو حتى بعد عدة أسابيع من توقفك عن تناولها. إذا أصبح هذا الإسهال شديداً أو مستمرًا، أو لاحظت أن البراز يحتوي على دم أو مخاط، توقف عن تناول إميسيسرو على الفور، حيث قد يكون ذلك أمراً مهدداً للصحة.

• إذا كنت لا تتناول أية أدوية لإيقاف حركة الأمعاء وإبطائها، واتصل بطبيبك.

• إذا توجب عليك تقديم عيئة **معد** أو **بول** فأخبر الطبيب أو فريق العمل المختصين بذلك لتتوالق إميسيسرو.

• إذا كنت تعاني من **مشاكل بالكلية**، فأخبر الطبيب جيداً عن تاريخك الطبي عند بدء تناول الجرعة المحددة لك.

• إذا كنت تعاني من **مشاكل بالقلب**، فإخبر طبيبك على الفور عن تاريخك الطبي عند بدء تناول الجرعة المحددة لك.

• قد يسيب إميسيسرو انخفاضاً في عدد كريات الدم البيضاء، و**انتمصل** طبيبك على الفور. • قد **تفتضح قوامك اللعوي**. يجب أن تستشير طبيبك على الفور إذا عانيت من أي من الأعراض التالية: • تورخ حاد في العينين، وتدهور الحالة العامة بشكل خطير، أو أي مصحوبة بأعراض عدوى موضعية مثل احقان الحلق/ اللغزوم، ألم في المفاصل أو في البطن، تورخ حاد اختبار دم للتحقق من انخفاض مستويات الختمل في الدم عدد كريات الدم البيضاء (نزعة العدلات). • تورخ حاد في العينين مع تورخ طبيبك عن تناولك لهذا الدواء.

• يجب إبلاغ طبيبك إذا كان من المعروف أنك تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من نقص إنزيم نازعة نازعة هيدروجين الجلوكوز-٦. هوفغاست (G6PD)، حيث قد تعاني من مخاطر للإصابة بقرح الدم عند تناولك سبيروفلوكساسين.

• يجب جلدك أكثر حساسية **لأشعة الشمس** أو **الأشعة فوق البنفسجية** عند تناول إميسيسرو. تجنب التعرض لأشعة الشمس القوية، أو الأشعة فوق البنفسجية مباشرةً مع تناولك المشمشية (إسرة تسكير البشرة).

تناول أدوية أخرى

يرجاه إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما فيها الأدوية التي حصلت عليها بدون وصفة طبية.

لا تتناول إميسيسرو مع عقار تيزاندين، حيث قد يسبب ذلك آثاراً جانبيةً مثل انخفاض ضغط الدم والنعاس (انظر قسم ٢: "لا تتناول إميسيسرو"). تُصرف الأدوية التالية بتدليها مع إميسيسرو في الجسم. من الممكن أن يؤدي الوفة في حالات نادرة جدًا) (انظر قسم ٢:

• تورخ حاد في العينين، وتدهور الحالة العامة بشكل خطير، أو أي مصحوبة بأعراض عدوى موضعية مثل احقان الحلق/ اللغزوم، ألم في المفاصل أو في البطن، تورخ حاد اختبار دم للتحقق من انخفاض مستويات الختمل في الدم عدد كريات الدم البيضاء (نزعة العدلات). • تورخ حاد في العينين مع تورخ طبيبك عن تناولك لهذا الدواء.

• في يحدث التهاب في الأوتار أو التهابات أخرى أثناء أو بعد ٤٨ ساعة من بدء شعور بعد إيقاف العلاج بميسيسرو. قد تظهر ألامى عضلات ألامى أو التهابات تورخ عن تناول إميسيسرو وأرج المنطقه المؤلمة. تجنب ممارسة أي تمرين غير ضروري، حيث قد يزيد ذلك من احتمال حدوث تورخ في الأوتار.

• إذا كنت تعاني من **صرع** أو **حالات عصبية** أخرى مثل الإلتهال الدماغي أو السكتة الدماغية، فقد تعاني من آثار جانبية مرتبطة بالهجز العصبي المركزي. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول إميسيسرو، واتصل بطبيبك على الفور.

• قد تعاني من **فقدان تافسية** عند تناولك إميسيسرو للمرة الأولى. إذا كنت تعاني من **إكتئاب** أو **أذهان**؛ فقد تسوء الحالة أثناء العلاج، وبميسيسرو . في حالات نادرة، يحدث تدهور للكتئاب أو الأذهان ليصبح أفديرة استعجابية أو اكتئابية أو انتحار بالفعال. إذا حدث ذلك، توقف عن تناول إميسيسرو، واتصل بطبيبك على الفور.

• قد تعاني من أعراض اختلال العصب مثل ألم، حرققة، وخز، وتميل وأو ضعف. إذا حدث هذا الأمر في، توقف عن تناول إميسيسرو واتصل بطبيبك على الفور.

• قد تعاني من **إسهال** أثناء تناولك مضادات حيوية، بما في ذلك إميسيسرو ، أو حتى بعد عدة أسابيع من توقفك عن تناولها. إذا أصبح هذا الإسهال شديداً أو مستمرًا، أو لاحظت أن البراز يحتوي على دم أو مخاط، توقف عن تناول إميسيسرو على الفور، حيث قد يكون ذلك أمراً مهدداً للصحة.

• إذا كنت لا تتناول أية أدوية لإيقاف حركة الأمعاء وإبطائها، واتصل بطبيبك.

• إذا توجب عليك تقديم عيئة **معد** أو **بول** فأخبر الطبيب أو فريق العمل المختصين بذلك لتتوالق إميسيسرو.

• إذا كنت تعاني من **مشاكل بالكلية**، فأخبر الطبيب جيداً عن تاريخك الطبي عند بدء تناول الجرعة المحددة لك.

• إذا كنت تعاني من **مشاكل بالقلب**، فإخبر طبيبك على الفور عن تاريخك الطبي عند بدء تناول الجرعة المحددة لك.

• قد يسيب إميسيسرو انخفاضاً في عدد كريات الدم البيضاء، و**انتمصل** طبيبك على الفور. • قد **تفتضح قوامك اللعوي**. يجب أن تستشير طبيبك على الفور إذا عانيت من أي من الأعراض التالية: • تورخ حاد في العينين، وتدهور الحالة العامة بشكل خطير، أو أي مصحوبة بأعراض عدوى موضعية مثل