

- قارورة من 100 مل متوفرة في علبة من 1 و 5 و 20.
 - يمكن أن لا تكون كل العبوات سوقية في بلدكم.
 - أضطرابات في السمع (طنين في الأذن) أو في الرؤية (رؤية غير واضحة).
 - ضربات قلب سريعة غير اعتيادية (ترسخ القلب) أو ضغط شريانى منخفض (نقص ضغط الدم).
 - ضعف عضلى، هذا الأمر هام لأن الشخص المصابة بالوهن العضلى (مرض نادر في الجهاز العصبي).
 - بعد بضعة أيام من المعالجة بال محلول للتسرب، قد يقدر طبيبكمواصلة الفترة الباقية من معلاجتك بالتحول إلى أقراص هذا الدواء.
 - إذا كان لديك أستلهة أخرى تتعلق باستعمال هذا الدواء، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الممرض (ة) أو الصيدلاني.

4. التأثيرات غير المرغوبة

- هذا النشرة لا تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بدو في حال كان لديك أستئصال أو شك حول أي شيء، اطلب من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني.

تاریخ آخر مراجعة لهذه النشرة هو يوليو/تموز 2012.

■ حمى:

 - تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها تشمل:
 - انخفاض عدد الكريات الحمراء (فقر دم): قد يؤدي ذلك إلى شحوب البشرة أو إلى اضطرارها بسبب تلف الكريات الحمراء؛ انخفاض تعداد جميع عناصر الخلايا الدموية (قلة الكريات الشاملة).
 - حمى، احتقان الرأس وإحساس عام يتوارد مستمر. قد يكون ذلك نتيجة انخفاض عدد الكريات البيضاء (ندرة الجيوبات).
 - خالفة ديدان: الذهاب (صورة شهادة)

مثل كافة الأدوية، يمكن هذا الدواء أن يسبب تأثيرات غير مرغوب فيها، ولكن ذلك لا ينطبق على الجميع. هذه التأثيرات هي بشكل عام خفيفة أو معتدلة وغالباً ما تختفي بعد وقت قصير.

أوقف العلاج بواسطة تأفينيك وأعلم فوراً الطبيب أو الممرض (ه).

إذا لاحظت أحد التأثيرات التالية:

 - نادراً جداً (يمكن أن تصبب لغاية شخص واحد من أصل 10 000)
 - ليك تفاعلاً تحسسيًّا، الأعراض قد تشمل: الفقع الجلدي، صعوبات

هذا الدواء

- حضر يوثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك
 - اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص
 - تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
 - طبيب والصيدلي هما الخبران في الدواء وفي نفعه وضرره.
 - قطع العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
 - تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
 - تنترك الأدوية في متناول الأطفال.
 - مجلس وزراء الصحة العربي واتحاد الصيادلة العرب.

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

**Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists**

- اضطرابات في السمع (طنين في الأذن أو في الرؤية) (روية غير واضحة).

■ ضربات قلب سريعة غير اعتيادية (تسريع القلب) أو ضغط شري

■ منخفض (نقص ضغط الدم).

■ ضعف عضلي. هذا الأمر هام للأشخاص المصابين بالدواء.

■ العضلي (مرض نادر في الجهاز العصبي).

■ تغير في وظيفة الكلى وعجز كلوي عرضي قد يكون نتيجة تفا

تحسسي للكلية يسمى التهاب الكلية الخلالي.

■ حمى.

■ تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها تشمل:

■ انخفاض عدد الكريات الحمراء (فقر الدم): قد يؤدي ذلك إلى شح

البشرة أو إلى اصفرارها بسبب تلف الكريات الحمراء؛ انخفاض

تعداد جميع عناصر الخلايا الدموية (قلة الكريات الشاملة).

■ حمى، احتقان الحلق وإحساس عام بتعودك مستمر. قد يكون نز

نتيجة انخفاض عدد الكريات البيضاء (ندرة المحببات).

■ خلل في دوران الدم (صدمة شبه تامة).

■ ارتفاع مستوى السكر في الدم (فرط سكر الدم) أو انخفاض ش

السكر في الدم مما قد يؤدي إلى غيبوبة (غيبوبة نقص سكر الدا

هذا الأمر هام للأشخاص المصابين بداء السكري.

■ تغيرات في حاسة الشم، فقد حاسة الشم أو حاسة الذوق.

■ صعوبة في التحرك وفي المشي (عسر الحركة، اضطرابات خا

الهرمية).

■ فقدان عابر للوعي (اغماء).

■ فقدان عابر للبصر.

■ انخفاض أو فقدان السمع.

■ تسرب غير طبيعي لنظم القلب، نظم قلب غير منتظم مهدد للحياة

فيه توقف القلب، وتغيير في نظم القلب (تدعى "إطالة الفاصلة A"

تلاحظ في التخطيط الكهربائي للقلب، أي تسجيل كهربائية القلب).

■ اضطرابات تنفسية أو تنفس مع صفير (تشنج قصبي).

■ تفاعلات تحسسية رئوية.

■ التهاب البنكرياس.

■ التهاب الكبد.

■ حساسية زائدة للبشرة ضد الشمس والأشعة فوق البنفسج

(تحسس ضوئي).

■ التهاب الأوعية الدموية التي تنقل الدم في الجسم نتيجة تفا

تحسسي (التهاب وعائي).

■ التهاب الأنسجة داخل القم (التهاب القم).

■ تضخم العضلات، تلف ضل، انحلال، الخلاصة المختلطة).

بعد بضعة أيام من المعالجة بالمحظول للتسربيب، قد يقرر طبيبك مواصلة

الفترة الباقية من معالجتك بالتحول إلى أقراص هذا الدواء.

إذا كان لديك أستيلة أخرى تتعلق باستعمال هذا الدواء، اطلب المزيد

من المعلومات من طبيبك أو الممرض(ة) أو الصيدلاني.

4. التأثيرات غير المرغوبة المحتملة

مثل كافة الأدوية، يمكن أن يتسبب تأثيرات غير مرغوب

فيها، ولكن ذلك لا ينطبق على الجميع. هذه التأثيرات هي بشكل عام

خفيفة أو معتدلة وغالباً ما تختفي بعد وقت قصير

أوقف العلاج بواسطة تافانيك وأعلم فوراً طبيبك أو الممرض(ة)

إذا لاحظت أحد التأثيرات التالية:

نادرة جداً (يمكن أن تصبح لغاية شخص واحد من أصل 10 000)

■ لديك تفاعلات تحسسية. الأعراض قد تشمل: الطفح الجلدي، صعوبات

في البلع أو في التنفس، انتفاخ الشفتين أو الوجه أو الحلق أو اللسان.

أوقف العلاج بواسطة تافانيك وأعلم فوراً طبيبك أو الممرض(ة) إذا

لاحظت أحد التأثيرات الشديدة التالية - قد تكون بحاجة لمعالجة

طبية طارئة:

نادرة (يمكن أن تصبح لغاية شخص واحد من أصل 1 000)

■ إسهال مائي قد يحتوي على الدم، مع الاختلال أن يكون مصحوباً

بتشنجات في المعدة وبحرارة مرتفعة. يمكن أن تكون هذه أعراض

علة معوية وخثية.

■ وجع والتهاب الأوتار أو الأربطة المفصلية مع إمكانية تمزقها. وتر

العرقوب هو الأكثر عرضة للإصابة.

■ نوبات صرع (اختلالات).

نادرة جداً (يمكن أن تصبح لغاية شخص واحد من أصل 10 000)

■ حروق، تندمل، أوجاع أو خدر يمكن أن تكون هذه أعراض لمرض

يدعى "الاعتلال العصبي".

غيرها:

■ طفح جلدي شديد قد يشمل ظهور فقاعات أو تقرش الجلد حول

الشفتين والعينين والفم والأذن والأعضاء التناسلية.

■ فقدان الشهية، اصغراف البدل والعينين، بول غامق اللون، حكة أو

معدة حساسة (بطلن). قد تشير هذه الأعراض إلى اضطرابات في

الكبد ويشكل خاص إلى عجز كبدى قد يكون مميتا.

إذا شعرت بارتفاع في درجة الحرارة أو ماء، مشكلة بصحة خلا

5. كيف يحفظ تفاصيلك محلها للتبسيط

- **نفاذ علاجات ضد مفعاد الماء** عند موقع التسرب.
 - **التهاب الوريد.**
 - **قليلة الشيوخ** (يمكن أن تصبب لغاية شخص واحد من أصل 100).
 - **تعديلات في عدد الجراثيم أو الفطريات الأخرى**، عدوى بفطريات تدعى المبيضة، مما قد يستلزم معالجتها.
 - **تعديلات في عدد كريات الدم البيضاء** تلاحظ في نتائج بعض تحاليل الدم (قلة الكريات البيض، كثرة الليموزينيات).
 - **إحساس بالإجهاد** (القلق)، إحساس بالتلخيف، إحساس بالعصبية، إحساس بالعناس، ارتتجاف، إحساس بدوران الرأس (الدوار).
 - **لها ثاث** (عسر تنفس).
 - **تفير** في مذاق الأطعمة، فقدان الشهية، عسر الهضم، ألم في منطقة المعدة، انتفاخ (تطليل البطن) أو إمساك.
 - **حکاك** مع فطح جلدي، حكة شديدة أو شرى، تعرق مفرط.
 - **آلام مفصلية أو آلام عضلية.**
 - **نタئحة غير معتادة لتحاليل الدم** قد تكون: ناتحة عن اضطرابات هذه التباينات تسمى بـ **نحوانية البنية**.

٦. محظوظ، العينة ومعلومات أخرى

- على ماذا يحتوي تافانيك محلول للتسريب المادة الفعالة هي ليقوفلوكاسين: تافانيك محلول للتسريب متى على شكلين: 250 ملг في قارورة زجاجية من 50 مل و 500 ملг على قارورة زجاجية من 100 مл. كل ملليلتر واحد من محلول للتسريب يحتوى على 5 ملг من ليقوفلوكاسين.
 - المكونات الأخرى هي: كلوريد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم، حامض الهيدروكلوريك وماء المستحضر للحقن.
 - نادرة (يمكن أن تصيب لغاية شخص واحد من أصل 1 000 تكون أورام دموية وزنف بسبب انخفاض تعداد صفائح الدم (قلة الصفائح)).
 - انخفاض عدد الكريات البيضاء (قلة العدلات).
 - استجابة مناعية مبالغ فيها (حساسية مفرطة).
 - انخفاض مستوى السكر في الدم (نقص سكر الدم). وهذا أمر هام للأشخاص المصابين بداء السكري.
 - رؤية أو سماع أشياء لا وجود لها (هلوسات، بارانويا). تغير في

- مظهر تافانيك محلول للتسرب ومحتوى العبوة الخارجية
- تافانيك محلول للتسرب هو محلول صافريلين أصفر مخف خال من الجزيئات، معيناً في تارورة زجاجية.
- قارورة من 50 ملل متوفقة في علية من 1 و5.
- إحساس بالاكتئاب، اضطرابات عقلية، هياج، أحلام غير طبيعية أو كوابيس.
- إحساس بتنميل في اليدين وفي الرجلين (تشوش الحس).
- أو الإقام على الانتخار.

■ في حال كنت ترضعين أو تنوء

- | ٣. كيف يستعمل تافانيك محلول للتسريب | تحذيرات واحتياطات | ٥ ملء / مل
محلول للتسريب
إيفوفلوكساسين |
|--|---|--|
| تافينيك محلول للتسريب يحتوي على الصوديوم هذا الدواء يحتوي على 181 ملг من الصوديوم في كا 250 ملг. يجب أخذها بالاعتبار لدى المرضى الذين يخضعون لتنبيب من الصوديوم. | راجع طبيبك أو المعرض(ة) أو الصيدلاني قبل اعطاءك هذا الدواء إذا كان عمرك 60 سنة أو ما فوقه.
كنت تستعمل ستيروريدات القشرة وتسعى أيضاً ستيروريدات (راجع بند "الأدوية الأخرى وتابانيك").
سبق لك التعرض لنوبة صرع (اختلالات).
سبق وأصبت باتفاق في الدماغ نتيجة سكتة دماغية أو إصابة أخرى في الدماغ.
كان لديك اضطرابات في الكلى.
كنت تعاني من متلازمة "نقص أنزيم نازة هيدروجين الفلوكوز-6-فسفات". قد تكون أكثر عرضة لاضطرابات وخيمة في الدم عند استعمالك هذا الدواء.
كان لديك سوابق اضطرابات عقلية.
كنت قد سقطت مؤخراً أو مشكلة في القلب، بحسب توجهك، الحذر مع | اقرأ بتمعن كامل هذه النشرة قبل استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.
احتفظ بهذه النشرة، قد تكون بحاجة لإعادة قراءتها.
إن كان لديك أسئلة أخرى، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو المعرض(ة) أو الصيدلاني.
في حال شعرت بأي تأثيرات غير مرغوب فيها، أعلم طبيبك أو المعرض(ة) أو الصيدلاني بذلك. يشمل ذلك أي تأثير آخر غير |
| قيادة العربات واستعمال الآلات يمكن أن تتعرض للتأثيرات غير مرغوبة بعد استعمال هذا الدواء بالدورة أو النعاس أو بوران الرأس (الدواي) أو الرؤبة. بعض هذه التأثيرات يمكن أن تؤثر على قدرتك في سرعتك في التفاعل. في حال حدوث ذلك، يجب عدم القيام بأعمال تستلزم تركيزاً عالياً. | راجع طبيبك أو المعرض(ة) أو الصيدلاني قبل اعطاءك هذا الدواء إذا كنت تستعمل ستيروريدات القشرة وتسعى أيضاً ستيروريدات (راجع بند "الأدوية الأخرى وتابانيك").
كنت تستعمل ستيروريدات القشرة وتسعى أيضاً ستيروريدات (راجع بند "الأدوية الأخرى وتابانيك").
سبق لك التعرض لنوبة صرع (اختلالات).
سبق وأصبت باتفاق في الدماغ نتيجة سكتة دماغية أو إصابة أخرى في الدماغ.
كان لديك اضطرابات في الكلى.
كنت تعاني من متلازمة "نقص أنزيم نازة هيدروجين الفلوكوز-6-فسفات". قد تكون أكثر عرضة لاضطرابات وخيمة في الدم عند استعمالك هذا الدواء.
كان لديك سوابق اضطرابات عقلية.
كنت قد سقطت مؤخراً أو مشكلة في القلب، بحسب توجهك، الحذر مع | اقرأ بتمعن كامل هذه النشرة قبل استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.
احتفظ بهذه النشرة، قد تكون بحاجة لإعادة قراءتها.
إن كان لديك أسئلة أخرى، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو المعرض(ة) أو الصيدلاني.
في حال شعرت بأي تأثيرات غير مرغوب فيها، أعلم طبيبك أو المعرض(ة) أو الصيدلاني بذلك. يشمل ذلك أي تأثير آخر غير |

3. كيف يستعمل تافانيك محلول

- كف يعطي تافانيك محلول للتسرب
■ تافانيك محلول للتسرب دواء يستعمل فقط في المستشفى
■ سوف يعطي لك من قبل طبيب أو ممرض (هـ) عن طريق الوريد على مدى مدة محددة (تسمى هذه الطريقة التسرير)
■ المدة المحددة للتسريب لتافانيك 250 ملخ محلول للتسـ
■ تكون 30 دقيقة أو أكثر
■ المدة المحددة للتسريب لتافانيك 500 ملخ محلول للتسـ
■ تكون 60 دقيقة أو أكثر
■ يجب مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الشرايين لدى لأن تسرع غير معتمد في ضربات القلب وانخفاض
الشريان هي تأثيرات غير مرغوبية محتملة قد تتم ملاـ
التسرب لمضاد حيوى مثالي، يجب إيقاف التسريب فـ
انخفاض ملمس لضفتكم أثناء التسرـ

■ كنت قد سبق وتعرضت لمشاكل في القلب: يجب توخي الحذر مع استعمال هذا النوع من الدواء إذا كانت فاصلة QT مطولة لديك عند الولادة أو لدى فرد من عائلتك (تلاحظ في التخطيط الكهربائي للقلب ECG)، أي تسجيل كهربائية القلب، أو كان لديك اختلال في توازن أملاح الدم (بالأشخاص مستويات منخفضة من البوتاسيوم أو المغنيسيوم في الدم)، أو كان لديك نظام قلبي بطيء جداً (السمى "بطء القلب")، أو كان لديك ضعف في القلب (قصور في القلب)، أو سبق وأصبت بتنبؤة قلبية (احتشاء عضلة القلب)، أو كنت امرأة أو شخصاً مسنًا أو كنت تتناول أدوية أخرى يمكن أن تؤدي إلى شذوذات في التخطيط الكهربائي للقلب ECG (راجع بند "الأدوية الأخرى وتافانيك").

■ كنت مصاباً بداء السكري.

■ سبق وتعرضت لأمراض في الكبد.
■ في حال لم تكن متأنكاً إذا كانت أدوء، هذه الحالات تنطبق عليك،

■ على ماذا تحتوى هذه النشرة:
1. ما هو تافانيك محلول للتسرب وفي أية حالة يستعمل
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال تافانيك محلول للتسـ
3. كف يستعمل تافانيك محلول للتسـ
4. التأثيرات غير المرغوبة المحتلة
5. كيف يحفظ تافانيك محلول للتسـ
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

■ مرغوب فيه لم يتم ذكره في هذه النشرة.

الغة الدوائية العلاجية
اسم هذا الدواء هو **تافانيك** محلول للتسرير. تافانيك محلول للتسرير
راجع طبيبك أو الممرض(ة) أو الصيدلاني قبل استعمالك هذا

- إن كنت لا تعرف بالتحديد لماذا يعطى لك تأهيلتك أو
أسئلة تتعلق بيكمية تأهيلك المعطاة لك، أسأل طبيبك أو
الصيدلاني.
■ كمية تأهيلك التي يجب إعطائها لك سوف يقررها طبـ
■ حجم الجرعة تعتمد على نوع ومكان الدعوى في جسمـ
■ نسبة الماءة-ستة-عاشر-رشـة الماءـ

الأدوية الأخرى وتأهيلـ
عليك بإبلاغ طبيبك أو الصيدلاني في حال كنت تستعمل أقـ
استعملت مؤخراً أو تنوـي استعمال دوـاء آخرـ لأن تأهـيلـك يمكن أنـ
يؤثـر على كـيفـة عمل الأدوـية الأخرىـ كذلك يمكن لـبعـض الأدوـية أنـ
تؤثـر على كـيفـة عمل تأهـيلـكـ

يحتوي على مادة فعـالة تسمـى ليغـوفـوكـاسـينـ وتـنـتمـيـ إلىـ مـجمـوعـةـ
الأدوـيةـ المعـروـفةـ باـسـمـ المـضـادـاتـ الـحـوـرـيـةـ ليـغـوفـوكـاسـينـ مضـارـ
حيـوـيـ منـ زـمـرـةـ الـكـيـنـولـونـاتـ التـيـ تـبـيـدـ الجـرـاثـيمـ المـسـبـبـةـ للـإـصـابـاتـ
الـخـمـجـةـ فـيـ الجـسـمـ.

بشكل خاص، أعلم طبيبك في حال كنت تستعمل أحد الأدوية

- **البالغين والأشخاص المسنون**
 - **الالتهاب الرئوي:** 500 ملغ مرة أو مرتين في اليوم.
 - **اخراج المساك البولية، بما في ذلك الكلي والمثانة:** 0 واحدة في اليوم.
 - **التهاب البروستات:** 500 ملغ مرة واحدة في اليوم.
 - **خمج الجلد والأنسجة تحت الجلد، بما في ذلك العضلات** مرة أو مرتين في اليوم.

التالية، لأن ذلك يمكن أن يزيد من احتمال ظهور تأثيرات غير مرغوبة عند مشاركتها مع تناولك:

 - **الستيرويدات القشرية وتشمل أيضًا ستريوينيدات – المستعملة لمعالجة الالتهاب، إنك أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب وأو يمتزق الورت.**
 - **وارفارين – المستعمل لتيسيل الدم، قد تصبح أكثر عرضة للنزف. قد يحتاج طببك إجراء بشكل منتظم فحوصات دم لكى يتحقق من نوعية خثرة الدم لديك.**

فيما يلي، أنت مطالع على الأدوية التي قد تؤدي إلى تآكل أحد

دعاي الاستعمال العلاجية
نافذة محال التسويق: إن استعمال في مواجهة الخوف الناجم
للاصابة بنوبة صرع (اختلالات) في حال مشاركته مع تأكيد
بوقيلين - المسعول في الاصطربات النفسية، إن آخر

- الأطفال والراهقين للأطفال والأدواء للأطفال أو للمرأة.
 - يجب عدم إعطاء هذا الدواء للأطفال أو للمرأة.
 - يجب حماية بشرتك من ضوء الشمس
 - تجنب تعرضك لأشعة الشمس المباشرة أثناء فترة المساء
 - هذا الدواء وخلال اليومين التاليين لا ينافس الدواء، لأن...
 - تصبح أكثر حساسية للشمس مما يمكن أن يؤدي إلى حر...
 - أو فقاعات هامة في حال لم تتقيد بالاحتياطات التالية
 - تأكيد من استعمالك كريم للشمس بموضع وقاية مرتفع.
 - ضع دائماً قبعة والسيّاحاً تغطي ذراعيك وساقيك.
 - تجنب حمامات الشمس.
 - إذا أعطيت أكثر مما يجب من تناوله محلول للتسرير مثل...
 - مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (الإماس)- المستعمل ضد الألم والالتهاب مثل الأسيتون، الإيبوبروفين، الغفيرون، الكتيوبوبروفن الإنديوميتاسين. إنك أكثر عرضة للإصابة بنوبة صرع (اختلالات) في حال مشاركتهم مع تأمينك.
 - سيلكوسبيورين- المستعمل بعد زرع الأعضاء. ذلك قد يزيد من مخاطر تعرضك للتآثرات غير المرغوبة للسلكوسبيورين.
 - الأدوية التي لها تأثير معروف على نظم القلب. هذه الأدوية تشمل علاجات مستعملة في اضطرابات نظم القلب (مضادات الانلaxن مثل الكينيندين، الديبوروكينيندين، الستوتالول، الدوفيتايد، الابوتيليد أو الأبيودارون)، أو في الاكتناب (مضادات الاكتناب ثلاثية الحلقات مثل الأميتروديلين والإيمبرامين)، أو في اضطرابات النفاسانية (مضادات الذهان)، أو في الأحماض الجرثومية (المضادات الجيوية من زمرة المكرويليدات مثل...
 - تجنب مسح شعرك يمنى من الشمس في سبب الحكة التي يسببها.
 - الرئتين، لدى الأشخاص المصابين بالتهاب رئوي.
 - المسالك البولية، من ضمنها الكليتين والمثانة.
 - البروستات، المصادبة بخمج لمدة طويلة.
 - الجلد وطبقات تحت الجلد، بما في ذلك العضلات والتي تسمى أحياناً "نسيجاً ليناً".
 - في بعض الحالات الخاصة، يمكن استعمال تأفاينيك محلول للتسرير للتقليل من مخاطر الإصابة بمرض رئوي يُسمى الجمرة الخبيثة أو من خطر تفاقم المرض بعد التعرض للجرثومة المسيبة للجمدة الخبيثة.

موضع الاستعمال
لا تستعمل هذا الدواء وابله طبيك اذا:
بروبينديسي - المستعمل لمعالجة داء التقرّس، والسيميتو
الايريدوميسين، الايزتريوميسين والكلاروتريوميسين.

- الصحية وتحققان من الدواء الذي يعطي لك. لا تترأسة في حال كنت لا تعرف لماذا يعطي لك تأثيرك. في حال كنت تعاني من إعطاء جرعة مفرطة من تأثيرك يمكن أن يؤدي إلى ظهور التالية: نوبة صرع (اختلالات)، الإحساس بتشوش عقلي، فقد في الوعي، ارتجاف واضطرابات قلبية - مما يؤدي إلى اضطرابات في الكلى، قد يتضرر طبيبك إلى انفاس الجرعة.

الختيرات البولية للكشف عن المواد الأفيونية

لدى المرضى الذين يعالجون بواسطة تأثيرك، يمكن أن تعيط تحاليل الكيتوكونازول كافية للكشف عن الأدواء الكيتوكونازول.

كان لديك حساسية لليقيوبلوكاسيين أو لغيرها من الكيتوكونازول مثل موسيقلوكاسيين، سيروبولوكاسيين أو أوفولوكاسيين أو لإحدى المكونات الأخرى لهذا الدواء (مذكورة في البند 6). أعراض التفاعل التحسسي تشمل: اللعغ الجلاجي، المصعوبة في البلع أو في التنفس، تورم الشفتين أو الوجه أو الحلق أو اللسان.

كذلك قد تسبب ماندرين، والمساء.

- حتى لا ينبع وعيهم من مفهوم المعرفة.
- سبق لك الشكوى من إصابة في الوتر مثل التهاب الوتر من جراء الالتواء والإصابة بخراج حاد، ومن ثمة الكثرة نشأت المقاومة

- | | | |
|--|--|---|
| <p>لدى طبيب أو الممرض(ة) تعليمات تتعلق باليوتيوب.
إعطائك هذا الدواء من بعيد الاحتمال أن لا يتم إعطاء
الوصفة. غير أنه إذا كنت تظن بأن هناك جرعة قد نسيت
أو الممرض(ة).</p> <p>في حال اوقتفت أخذ تافانيك محلول للتسرير
سوف يستمر طبيب أو الممرض(ة) بإعطاءك تافانيك حتى
حالتك. في حال الإيقاف المبكر للعلاج، يمكن أن ينقاوم من
أن تكتسب البكتيريا مقاومة للدواء.</p> | <p>لخص سماح بواسطة تافانيك.</p> <p>اختبار الكشف عن داء السل
يمكن أن يعطي هذا الدواء نتائج "سلبية كاذبة" في بعض الفحوصات
المخبرية للبحث عن البكتيريا المسببة لداء السل.</p> <p>الحمل والإرضاع
لا تتناولى هذا الدواء.</p> <p>في حال كنت حاملاً أو احتمال أن تصبحي حاملاً أو تظنين بأنك حامل.</p> | <p> يجب عدم استعمال هذا الدواء في حال تنطيط عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه. في حالة الشك، راجع طبيبك أو الممرض(ة) أو الصيدلاني قبل أخذ تافانيك.</p> <p>■ كنت طفلًا أو مراهقًا في مرحلة النمو
■ كنت حاملاً أو توقعي الحمل أو تظنين بأنك حامل.
■ كنت تتعرضين.</p> |
|--|--|---|