

أفلا® ٢٠ ملغ، أقراص مُغلفة

ليفلونوميد

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بدقة قبل أخذ هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرأتها مجدداً.

- إذا كان لديك أسئلة أخرى، اطرحها على الطبيب أو الصيدلي أو الممرض/ة.

- لقد وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تُعطِه لأحد آخر لأنه قد يؤذيه حتى ولو كانت أعراض مرضه مماثلة لأعراض مرضك.

- إذا شعرت بتأثير جانبي، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي أو الممرض/ة وهذا ينطبق أيضاً على كل تأثير جانبي غير مذكور في هذه النشرة. الرجاء مراجعة القسم ٤.

ماذا تحتوي هذه النشرة:

١. ما هو أفالا وما هي دواعي استعماله

٢. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ أفالا

٣. كيف يؤخذ أفالا

٤. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة

٥. كيف يحفظ أفالا

٦. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

١. ما هو أفالا وما هي دواعي استعماله

ينتمي أفالا إلى مجموعة من الأدوية تسمى الأدوية المضادة للروماتيزم، ويحتوى على المادة الفاعلة ليفلونوميد.

يُستعمل أفالا لدى البالغين لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي النشط أو التهاب المفاصل الصدفي النشط.

تتضمن أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي التهاب المفاصل وتورّمها وصعوبة التเคลّل والآلام. وتتضمن الأعراض الأخرى التي تصيب الجسم كله فقدان الشهية والحمى وفقدان الحيوية وفقدان الدم (نقص الكريات الحمراء). تتضمن أعراض التهاب المفاصل الصدفي النشط التهاب المفاصل وتورّمها وصعوبة التเคลّل والآلام وبقعًا حمراء على الجلد وتقرّب الجلد (آفات جلدية).

٢. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ أفالا**موانع الاستعمال:**

لا تأخذ أفالا مطلقاً

- إذا أصبت في السابق بارتكاس تحسسي ضد الليفلونوميد (ب خاصة ارتكاس جلدي خطير، غالباً ما يترافق مع حمى أو ألم في المفاصل أو يقع جلدية حمراء أو بثور مثل متلازمة ستيفنز جونسون) أو ضد أحد المركبات الأخرى في هذا الدواء (المركبات مذكورة في القسم ٦)، أو إذا كنت تعاني من حساسية ضد مادة تيريفلوفونوميد (المُستعملة في علاج التصلب اللويحي)،

- إذا كنت تعاني من مشكلة في الكبد،

- إذا كنت تعاني من قصور كلوبي مُعتدل الحدة إلى حاد،

- إذا كنت تعاني من انخفاض حاد في بروتينات الدم (نقص بروتينات الدم)،

- إذا كنت تعاني من مرض يُضعف دفاعاتك المناعية (مثلاً متلازمة نقص المناعة المُكتسبة/ السيدا)،

- إذا كنت تعاني من شذوذ في نخاع العظم، أو إذا كان لديك عدد قليل من كريات الدم الحمراء أو البيضاء أو عدد منخفض من صفيحات الدم،

- إذا كنت مصاباً بعدو خظير،

- إذا كنت حاملاً أو كنت تعندين نفسك حاملاً أو إذا كنت ترضعين.

احتياطات الاستعمال؛ تحذيرات خاصة**تحذيرات واحتياطات**

تحدد إلى الطبيب أو الصيدلي أو الممرض/ة قبل أخذ أفالا.

- إذا عانيت من التهاب رئوي (مرض الرئة الخلالي)،

- إذا سبق لك أن أصبت بالسل أو إذا كنت على صلة بشخص أصيب

بالسل. يمكن أن يُجري طبيبك فحوصات ليري إذا كنت مصاباً بالسل، إذا كنت رجلاً يرغب في أن يكون لديه طفل. بما أنه لا يمكن استثناء إمكانية انتقال أفالا إلى السائل المنوي، يجب استعمال وسيلة حمل موثوق بها أثناء العلاج بأفالا. يتبع على الرجال الذي يرغبون في أن يكون لديهم طفل الاتصال بطبيفهم الذي يمكن أن ينصحهم بإيقاف أفالا ويأخذ بعض الأدوية لإزالة أفالا من جسمهم بطريقة سريعة وكافية. وبعد ذلك يجب إجراء فحص دم بُغنية تأكيد إزالة أفالا بما يكفي، ويجب بعد ذلك الانتظار ٣ أشهر على الأقل قبل محاولة الإنجاب.

- إذا كان من المقرر أن تُجرى فحص دم مُحدد (على مستوى الكالسيوم)، قد تظهر مستويات الكالسيوم منخفضة بشكل خاطئ.

يمكن أن يُسبِّب أفالا أحياناً مشاكل في الدم أو الكبد أو الرئتين أو اضطرابات على مستوى أعضاء الذراعين أو الساقين. كما يمكن أن يُسبِّب ارتكاسات تحسُّسية خطيرة (بما فيها متلازمة فرط الحساسية الدوائية [DRESS]) أو أن يزيد خطر الإصابة بحالة عدوى خطيرة. للمزيد من المعلومات، الرجاء قراءة القسم ٤ (ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة).

تظهر متلازمة فرط الحساسية الدوائية بشكل أساسى عبر أعراض تشبه أعراض الرُّكَم وعبر طفح على الوجه ومن ثم طفح مُعمم مع ارتفاع الحرارة وزيادة إنزيمات الكبد ونوع من الخلايا الدموية (الحمضات) في فحوصات الدم، وتؤدي إلى الْجُدُد الليمفاوية.

سوف يُجري لك طبيبك فحوصات دم على فترات منتظمة قبل العلاج بأفالا وخلاله بغرض مراقبة خلايا الدم لديك وكبدك. سوف يُراقب طبيبك أيضاً ضغط الدم لديك بشكل منتظم لأن أفالا يمكن أن يُسبِّب ارتفاع ضغط الدم.

إذا كنت تعاني من إسهال مُزمن غير مُبرر، أعلم طبيبك. يمكن أن يُجري طبيبك فحوصات إضافية ليقوم بتشخيص تغريق.

الأطفال والمراهقون

لا يُنصح باستعمال أفالا لدى الأطفال والمراهقين دون عمر الثامنة عشرة.

أدوية أخرى وأفالا

أعلم طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ حالياً أو أخذت مؤخراً أو قد تكون تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي تحصل عليها بدون وصفة طبية.

هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تأخذ:

- أدوية أخرى تُوصف عادةً لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي مثل الأدوية المضادة للملاريا (مثلاً كلوروكين وهيدروسيكلوروكين)، أملاح الذهب عن طريق الحقن داخل العضل أو عن طريق الفم، د- بنيسيلامين، أزاتيوبيرين ومثبّطات مناعة أخرى (الميثوتريكسات مثلاً) لأن استعمالها بالتزامن غير مرغوب فيه.

- الوارفارين وأدوية أخرى فموية تُستخدم لتسييل الدم، لأنه يجب إجراء مراقبة للحد من خطر التأثيرات الجانبية لهذا الدواء،

- التيريفلوفونيد الذي يُوصف لعلاج التصلب اللويحي،

- أدوية الريبااغلينيد، البيوغليتازون، الناتياغلينيد أو الروزيغليتازون التي تُوصف لداء السكري،

- أدوية الدونوروبيسين، الدوكسوروبيسين، الباكليتاكسيل، أو التوبوتican لمعالجة السرطان،

- الدولوكسيتين لمعالجة الاكتئاب أو سلس البول أو المرض الكلوي لدى مريض السكري،

- الألوبيزترون للتحكم بالإسهال الحاد،

- التيوفينين لمعالجة الربو،

- التيرازيندين وهو مرخ عضلي،

- دواء لمنع الحمل عن طريق الفم (يحتوي على الإيثينيل إستراديول أو الليفونورجسترين)،

- أدوية السيفالاكور، البنزيلينيزيلين (بنزيلين ج)، السيروفلوكساسين لمعالجة حالات العدوى،

- الإنديوميتاسين والكيتوروفين لمعالجة الألم أو الالتهاب،

- الفوروسنيد لمعالجة المرض القلبي (المدر للبول)،

- الزيدوفودين الذي يُوصف في حالة عدوى فيروس نقص المناعة البشرية،

- أدوية الروزوفاستاتين، السيمفاستاتين، الأتورفاستاتين، البرافاستاتين لمعالجة فرط كوليسترون الدم (ارتفاع الكوليسترون)،

- السولفالازين لمعالجة داء الأمعاء الالتهابي أو التهاب المفاصل الروماتويدي،

إذا أخذت كمية مفرطة من أقرا
إذا أخذت كمية من أقرا أكثر من الكمية التي عليك أخذها، اتصل
بطبيبك المعالج أو طبيب آخر. وإذا كان ذلك ممكناً، أحضر أقراصك
أو قارورتك معك لتربيها للطبيب.

- الكوليستيرامين (المُسَعَّمُ لِتَخْفِيْضِ مُسْتَوَيَّاتِ الْكُولِيسْتِرُولِ الْمُرْتَقَعِ) أَوْ
الْفَحْمُ الْمُفْعَلُ لِأَنَّهُمَا يُخْفِضُانْ كَمِيَّةَ اَفَارِاَتِيَّةِ الَّتِي يَمْتَصُّهَا الْجَسْمُ.

إذا كنت تأخذ مضاداً للالتهاب غير ستريودي و/أو ستيرويديات قشرية،
ممكنكمواصلةأخذها بعد البدء بأخذ أفارا.

إذا نسيت أخذ أقارب

إذا نسيتأخذ جرعة، خذها حالما تندّرك - إلا إذا كان سجين وقت الجرعة التالية. لا تأخذ جرعة مُضاعفة للتعويض عن الجرعة التي نسيت أخذها.

إذا كان لديك أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلي أو من الممرض/ة.

٤. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة

مثـل الأدوـيـة كلـها، يـمـكـن أن يـسـبـب هـذـا الدـوـاء تـأـثـيرـات غـيـر مـرـغـوبـ بـهـا لاـ
تـصـيبـ المـرـضـيـ كـلـهـمـ.

ممكن أخذ أفراً مع الطعام أو بدونه.

لا ينصح بشرب الكحول في خلال العلاج بأقراة؛ فاستهلاك الكحول في لوقت نفسه مع أخذ أقراة يمكن أن يضر بالكبد.

الحمل والإرضاع

لا تأخذني أفالاً إذا كنت حاملاً أو إذا كنت تعقين نفسك حاماً. فإذا كنت حاملاً أو إذا أصبحت حاملاً في خلال مدة العلاج بأفالاً، يزداد خطر نجاح طفل يعني من عيوب خلقية خطيرة. وبالتالي لا ينبغي للنساء في من الإنجاب اللواتي لا يستعملن وسيلة من حمل موثوق بها آخر أفالاً.

إذا كنتِ تتويني الحمل بعد إيقاف العلاج بأقرا، من المهم أن تعلمي طيبك لأنّه من الضروري التأكّد من عدم وجود أيّ أثر لأقرا في جسمك قبل حاولة الحمل. بعد إيقاف العلاج بأقرا، يجب أن تنتظري سنتين. يمكن ففض هذه المُهلة لبضعة أسابيع عبر أخذ بعض الأدوية التي شرّع إزالة قارا من الجسم.

ي جميع الحالات، يجب أن يؤكّد فحص دم أنه تمت إزالة أفالا بصورة كافية من جسمك ويجب عليك أن تنتظري شهراً واحداً على الأقل قبل الحمل.

لمزيد من المعلومات حول الفحوصات المخبرية، اتصلي بطبيبك.
إذا كنت تعاندين نفسك حاملاً في خلال العلاج بأقرا أو في خلال السنطين
اللتين تليان ييقاف العلاج، يجب أن تُعلم طبيبك على الفور لإجراء
اختبار حمل. إذا أك الاختبار أتك حامل، يمكن أن يقترح طبيبك علاجاً
سمسح بإزالة أقرا بسرعة وبطريقة كافية من جسمك. يمكن أن يحد هذا
العلاج من الخطر المحدّد، بطيفك.

لا تأخذى أقراها إذا كنت ترضعين، لأن الليفلازونomid ينتقل إلى حليب الأم.

نهاية السمات واستعمال الآلة

يمكن أن يُسبِّب أفلار الدوار الذي يمكن أن يحدَّ من قدرتك على التركيز والاستجابة. لا تقدِّم سيارات ولا تستعمل آلات إذا كنت تشعر أن قدرتك على التركيز والاستجابة ضعيفة.

حتوى، أثراً على، اللاقى

إذا ألمك طيبك أنك تُعاني من عدم تحمل بعض أنواع السكر، اتصل به يا، أخذ هذا الدواء.

٣. كف نُهُذ أَقْارِبًا

حرص دائماً على أخذ هذا الدواء عبر التقييد بتعليمات طبيبك أو الصيدلي
اماً، تحقق من الطهي أو الصيدلي في حال الشك.

يبلغ الجُرعة الأولى من أقراصاً واحداً من ١٠٠ ملغم، مرة في اليوم، في خلال الأيام الثلاثة الأولى. وبعد ذلك، يحتاج معظم المرضى إلى ما يلي:
لاتهاب المفاصل الروماتويدي: ١٠ أو ٢٠ ملغم من أقراصاً في اليوم، حسب حدة المرض.

التهاب المفاصل الصدفي النشط: ٢٠ ملغ من أفالا في اليوم.

بلع الأقراص كاملة مع كوب من الماء.
يمكن أن يمزح ؛ أسايبع أو أكثر قبل أن تبدأ بالشعور بتحسن في حالتك.
يمكن أن يستمر بعض المرضي بالشعور بتحسن حتى بعد ؛ إلى ٦ أشهر
من العلاج.

جـب عـلـك أـخـذ أـقـارـا عـادـة لـمـدـة طـوـلـة.

٦ . محتويات العلبة ومعلومات أخرى

ماذا يحتوي أقراط ٢٠ ملغ، أقراص مغلفة

- المادة الفاعلة هي ليفلونوميد. يحتوي كل قرص على ٢٠ ملغ من الليفلونوميد.

- المركبات الأخرى هي: نشا الذرة، بوفيدون، كروسوبوفيدون، سيليكا غروانية لامائة، ستيرات المغنيزيوم، لاكتوز أحادي التبيه، هبروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم (أي ١٧١)، ماكروغول ٨٠٠٠، تاك، أكسيد الحديد الأصفر.

ما هو أقراط ٢٠ ملغ، أقراص مغلفة وما هو محتوى العلبة الخارجية

أقراص أقراط المغلفة ٢٠ ملغ لونها مصفر إلى أملأ، مثلاً الشكل، مطبوع على جهة منها: ZB0

تتوافر علب من ١٠ و ٣٠ قرص.
قد لا تكون الأحجام كلها مسوقة في بلدك.

حامل رخصة التسويق:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Germany

المصنع:

Sanofi Winthrop Industrie
56, Route de Choisy au Bac
F-60205 Compiègne Cedex
France

التاريخ الأخير الذي تمت فيه مراجعة هذه النشرة: يوليو ٢٠١٧

التاريخ الذي تمت موافقة وزارة الصحة المصرية على هذه النشرة: ١٤-١-٢٠١٩

التأثيرات الجانبية القليلة الشيوع (يمكن أن تصيب حتى شخص واحد من

أصل ١٠٠):

- انخفاض عدد كريات الدم الحمراء (فقر دم) وانخفاض عدد الصفيحات

الدموئية (قلة الصفيحات)،

- انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم،

- قلق،

- تغيرات في حالة الدوق،

- شرى،

- ترقيق الورت،

- ارتفاع الدهون في الدم (الكوليسترون، ثلاثي الغليسريد)،

- انخفاض نسبة الفوسفات في الدم.

التأثيرات الجانبية النادرة (يمكن أن تصيب حتى شخص واحد من أصل

١٠٠٠):

- ارتفاع عدد خلايا دموئية شمعي الحمضيات، انخفاض معتدل لعدد الكريات البيضاء (نقص الكريات البيضاء) وانخفاض عدد كل خلايا الدم (قلة الكريات الشاملة)،

- ارتفاع كبير في ضغط الدم،

- التهاب الرئتين (إصابة رئوية خلالية)،

- يمكن أن تظهر فحوصات الدم زيادة في المعالم الكبدية يمكن أن تتطور لتصبح حالات خطيرة مثل التهاب الكبد واليرقان،

- حالات عدوى خطيرة مثل تسمم الدم يمكن أن تسبب الوفاة،

- ارتفاع بعض الإنزيمات في الدم (نازعة الالكتات).

التأثيرات الجانبية النادرة جداً (يمكن أن تصيب حتى شخص واحد من أصل

١٠٠٠٠):

- انخفاض كبير في عدد الكريات البيضاء (ثمرة المحببات)،

- ارتكاسات تحسسيّة حادة يمكن أن تكون خطيرة،

- التهاب الأوعية الصغيرة (التهاب وعائي؛ بما في ذلك التهاب الأوعية الدمويّة الناخر)،

- التهاب البنكرياس،

- إصابة كبدية خطيرة مثل القصور الكبدي أو تلف الخلايا الكبدية، يمكن أن تسبّب الوفاة،

- ارتكاسات جلديّة حادة يمكن أن تسبّب الوفاة أحياناً (متلازمة ستيفنز - جونسون، تشر جلدي تسمّي، حمامي مشكلة).

يمكن أيضاً حصول تأثيرات جانبية أخرى ذات معدّلات حصول غير محددة مثل القصور الكلوي وانخفاض معدّل حمض البوريك في الدم وفترض الضغط

الرئوي والغُرم الدُّكَري (يزول بعد إيقاف العلاج بهذا الدواء) والذاب الجلدي (يتميز بطفح/احمرار في المناطق الجلدية المعرضة للضوء) والصدفية

(الجديدة أو نقاق الصدفية القديمة) ومتلازمة فرت الحساسية الدوائية.

الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية:

إذا أصبت بأي تأثير جانبي، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

وينطبق هذا أيضاً على أي تأثير جانبي غير مذكور في هذه النشرة.

بالإبلاغ عن التأثيرات الجانبية، تساهم في تزويد المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

٥ . كيف يحفظ أقراط

يحفظ هذا الدواء بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.

لا تستعمل هذا الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدون على العلبة.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

يُحفظ في حرارة لا تتجاوز ٢٥ درجة مئوية في مكان جاف.

يُحفظ في غلنته الأصلية.

القارورة: ثحطط القارورة وهي مغلقة بإحكام.

لا ينبغي التخلص من الأدوية عبر المياه المبتلة أو مع النفايات المنزلية.

أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، فمن

شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

