

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

## Carbosylane gélule

### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Charbon activé.....140 mg

Siméticone..... 45 mg

Excipients: Oléate de sorbitan et polysorbate 80.

Pour une gélule bleue ou rouge.

Enveloppe de la gélule bleue: Gélatine, indigotine (E132), dioxyde de titane (E171).

Enveloppe de la gélule rouge: Gélatine, érythrosine (E127), dioxyde de titane (E171), indigotine (E132).

Enrobage gastro-résistant de la gélule rouge: Acétate phthalate de cellulose, phthalate de diéthyle.

### FORME PHARMACEUTIQUE

Gélule ; boîtes de : 48 (soit 24 doses), 96 (soit 48 doses).

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIPLATULENT / ADSORBANT INTESTINAL

### NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires GRIMBERG - 19, rue Poliveau - 75005 PARIS - FRANCE

### NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Laboratoires GRIMBERG

Z.A. des Boutries - 5 Rue Vermont - 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE - FRANCE

### DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT?

#### (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans dans le traitement symptomatique des états dyspeptiques (digestion difficile) et du météorisme (ballonnement intestinal).

### ATTENTION

#### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

#### (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants de Carbosylane,
- chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

Ce médicament pouvant diminuer l'absorption d'autres médicaments, ceux-ci doivent être administrés à distance de lui.  
**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

## **GROSSESSE - ALLAITEMENT**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Ce médicament peut être prescrit pendant l'allaitement.

**D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.**

## **COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT**

### **POSOLOGIE**

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Ce médicament se présente sous forme d'une gélule bleue gastrosoluble (dont les principes actifs sont libérés dans l'estomac) et d'une gélule rouge gastro-résistante (dont les principes actifs sont libérés dans l'intestin) à prendre simultanément. La posologie habituelle est de 3 doses (1dose = 1gélule rouge + 1gélule bleue) par jour.

### **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

Voie orale.

### **FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE**

Ce médicament doit être pris de préférence au moment des repas.

### **DUREE DU TRAITEMENT**

La durée du traitement varie en fonction de la symptomatologie.

### **EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**

#### **(EFFETS INDESIRABLES)**

**COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINDER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS:**

- une coloration foncée des selles peut apparaître,
- des cas de réactions allergiques (urticaire, réaction allergique généralisée) ont été rapportés suite à l'administration de Carbosylane, gélule.

**SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.**

### **CONSERVATION**

**NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR**

### **PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION**

Pas de précautions particulières de conservation.

### **MISE EN GARDE EN CAS DE SIGNES VISIBLES DE DETERIORATION**

**DATE DE REVISION DE LA NOTICE** Juin 2007