



كلاريتين ١ ملجم / مل شراب

لوراتادين

في حالة تناول جرعة زائدة عن الجرعة التي تحتاج إليها من كلاريتين ، ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي على الفور.

في حالة نسيان جرعة كلاريتين
في حالة نسيان جرعة من كلاريتين، ينبغي تناولها حال تذكرها على الفور. ثم تابع جدول الجرعات المعتاد الخاص بك. لا تتناول جرعة مزدوجة لتعويض الجرعة الفائتة.
في حالة التوقف عن تناول كلاريتين
إذا كان لديك أية أسئلة أخرى بشأن استخدام هذا الدواء، فينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

رجى قراءة هذه النشرة بأكملها بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.
يرجى الاحتفاظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى
• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فينبغي أن تسأل الطبيب أو الصيدلي.
• هذا الدواء موصوف لك على وجه الخصوص، لا تعطه للآخرين، قد يضر هذا الدواء الآخرين حتى لو كانوا يعانون من أعراض مثل التي تعاني منها.
• إذا ساءت أي من الآثار الجانبية، أو إذا لاحظت حدوث أي آثار جانبية غير المذكورة في هذه النشرة، فيرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة :

١. ماهو كلاريتين؟ وما دواعي استخدامه؟
٢. قبل تناول كلاريتين.
٣. كيفية تناول كلاريتين.
٤. الآثار الجانبية الممكنة.
٥. كيفية تخزين الدواء كلاريتين.
٦. معلومات إضافية.

١. ماهو كلاريتين؟ وما دواعي استخدامه؟

ينتمي كلاريتين إلى فئة من الأدوية تسمى مضادات الهيستامين. تساعد مضادات الهيستامين على الحد من أعراض الحساسية عن طريق منع تأثيرات مادة تسمى الهيستامين ينتجها الجسم.
يخفف كلاريتين الأعراض المرتبطة بالتهاب الأنف التحسسي (مثل حمى القش). مثل العطس وسيلان الأنف أو حكة الأنف والحرقان أو الحكة في العينين.
ويمكن أيضا استخدام كلاريتين للمساعدة في تخفيف أعراض الشرى (طفح جلدي مصحوب بحكة شديدة في الجلد مع تورمات).
يخفف كلاريتين هذه الأعراض طوال اليوم مما يتيح لك أداء الأنشطة اليومية المعتادة والنوم.

٢. قبل تناول كلاريتين

موانع استخدام كلاريتين

إذا كنت تعاني من فرط الحساسية تجاه مادة لوراتادين أو أي من المكونات الأخرى في هذا الدواء
تخاذ العناية الخاصة مع كلاريتين
ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول كلاريتين، إذا كنت تعاني من مرض في الكبد.

استخدام أدوية أخرى:

أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول حالياً – أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تحصل عليها دون وصفة طبية.

فحوصات مخبرية:

يجب التوقف عن تناول كلاريتين قبل إجراء اختبار الحساسية بيومين، وذلك لأن هذا الدواء قد يؤثر على نتائج الاختبار.
تناول كلاريتين مع الطعام والشراب.
يمكن تناول كلاريتين مع الطعام أو بدون الطعام.
لم يود كلاريتين إلى زيادة تأثيرات المشروبات الكحولية.

الحمل والرضاعة الطبيعية:

في حالة الحمل يوصى بعدم استخدام كلاريتين.
في حالة الرضاعة الطبيعية، يوصى بعدم استخدام كلاريتين. يتم إفراز لوراتادين في لبن الثدي.

يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء.

قيادة المركبات واستخدام الآلات:

في حالة استخدام الجرعة الموصى بها من كلاريتين، لن تشعر بالنعاس أو ضعف التركيز عن حالتك العادية. ورغم ذلك، في حالات نادرة، قد يشعر بعض المرضى بالدوار مما قد يؤثر على قدرتهم على القيادة أو استخدام الآلات.

معلومات مهمة عن بعض المكونات في كلاريتين:
يحتوي مشروب كلاريتين على سكروز. إذا كان الطبيب قد أخبرك أنك لا تتحمل بعض أنواع السكر فاتصل بالطبيب قبل تناول هذا الدواء

٣. كيفية تناول كلاريتين

يؤخذ كلاريتين حسب إرشادات الطبيب دائماً ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة عدم التأكد من كيفية الاستخدام

البالغون والأطفال في عمر ١٢ سنة فما فوق :

يؤخذ مقدار ملعقة شاي (١٠ مل) من الشراب مرة واحدة يومياً مع الطعام أو بدونه، لا تحتاج إلى الماء أو أي سائل آخر لابتلاع الشراب.

الأطفال في عمر سنتين حتى ١٢ سنة يُعطون الجرعة حسب وزنهم:

وزن الجسم الزائد عن ٣٠ كجم:

يؤخذ مقدار ملعقة شاي (١٠ مل) من الشراب مرة واحدة يومياً مع الطعام أو بدونه، لا تحتاج إلى الماء أو أي سائل آخر لابتلاع الشراب.

وزن الجسم ٣٠ كجم أو أقل:

يؤخذ مقدار ملعقة شاي (٥ مل) من الشراب مرة واحدة يومياً مع الطعام أو بدونه، لا تحتاج إلى الماء أو أي سائل آخر لابتلاع الشراب.

مرضى حالات الكبد الخطيرة :

البالغون والأطفال الذين يزيد وزنهم عن ٣٠ كجم:

يؤخذ مقدار ملعقة شاي (١٠ مل) من الشراب مرة واحدة كل يومين مع الطعام أو بدونه، لا تحتاج إلى الماء أو أي سائل آخر لابتلاع الشراب.

البالغون والأطفال الذين وزنهم ٣٠ كجم أو أقل:

يؤخذ مقدار ملعقة شاي (٥ مل) من الشراب مرة واحدة كل يومين مع الطعام أو بدونه، لا تحتاج إلى الماء أو أي سائل آخر لابتلاع الشراب.

كلاريتين ليس مناسباً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

في حالة تناول جرعة زائدة من كلاريتين

ينبغي تناول كلاريتين حسب إرشادات الطبيب تماماً. ليس من المتوقع أن تسبب الجرعة الزائدة العرضية أي مشكلات خطيرة.
بم الإبلاغ عن أعراض مثل النعاس وزيادة نبض القلب والصداع في حالات تناول جرعة زائدة من كلاريتين.

٤. الآثار الجانبية الممكنة

مثل كل الأدوية ممكن أن يسبب كلاريتين آثار جانبية وإن كانت لا تحدث في جميع الأشخاص الذين يستخدمونه.
الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً في الأطفال في عمر سنتين إلى ١٢ سنة هي الصداع والحساسية والتعب، الآثار الجانبية شائعة في البالغين والمراهقين هي النعاس والصداع وزيادة الشهية والأرق.
منذ إدخال كلاريتين إلى السوق، تم الإبلاغ عن حالات نادرة جداً من الحساسية الخطيرة، والدوخة، وعدم انتظام معدل ضربات القلب أو زيادته، والغثيان (الشعور بالغثية في التقيؤ). وجفاف الفم، والشعور بثقل في المعدة ومشاكل في الكبد، وفقدان الشعر، والطفح الجلدي والتعب، وليس من الممكن تحديد مدى تكرار هذه الآثار.
إذا زادت خطورة أي من هذه الآثار الجانبية. أو إذا لاحظت حدوث أي آثار جانبية غير المذكورة في هذه النشرة فيرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

٥. كيفية تخزين كلاريتين

يجب حفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظرهم.
لا يخزن في درجة حرارة فوق ٣٠ درجة مئوية.
لا يجب تجميده. تحفظ الزجاجة في العبوة الكرتونية الخارجية لحماية الدواء من الضوء. لا يؤخذ الدواء كلاريتين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المكتوب على العبوة الكرتون بعد الأحراف [EXP]. يشير تاريخ الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر المكتوب. يجب استخدام شراب كلاريتين في غضون شهر واحد من فتح الزجاجة.
لا تستخدم كلاريتين إذا لاحظت أي تغيرات في شكل الشراب.
ينبغي عدم التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لا تحتاج إليها. ستساعد هذه التدابير على حماية البيئة.

٦. معلومات إضافية

محتويات كلاريتين

- المادة الفعالة هي لوراتادين ١ ملجم/مل

- المكونات الأخرى هي بروبيلين جليكول (E١٥٢٠)، جليسرول (E٤٢٢)، حامض الستريك اللاماني، بنزوات الصوديوم (E٢١١)، سكروز، نكهة خوخ اصطناعية وماء منقى.

أشكال كلاريتين ومحتويات العبوة

شراب كلاريتين عبارة عن سائل صاف ما بين عديم اللون إلى لون مائل إلى الأصفر الباهت في عبوات زجاجية لونها عنبري تحتوي على ٦٠ مل، ٧٠ مل، ١٠٠ مل، أو ١٢٠ مل وبها غطاء من البولي بروبيلين مقاوم لاستخدام الأطفال. توجد ملعقة بلاستيكية لمعايرة الجرعة حجم ٥ مل مرفقة في العبوة.
قد لا يتم تسويق العبوات بكل الأحجام.

الشركة المالكة لحق التسويق

باير كونسويمير كير.ج.،

بازل - سويسرا

رقم تفويض التسويق:

١٥٩٨٣٥

يتم التصنيع وإصدار التشغيلة من قبل شيرينج - بلو لابو إن. في. اندستريبارك ٣٠، بي - ٢٢٢٠ هانست - أوب - دين - بيرج - بلجيكا. اتصل بالطبيب أو الصيدلي للحصول على أي معلومات حول هذا الدواء.

تخضع المنتجات الدوائية للوصفات الطبية.

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في سبتمبر ٢٠١١

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضره
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة طبيبك
- لا تترك الدواء في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء العرب
 واتحاد الصيدالة العرب