

هايبيوتيرز[®] بلاس / هايبيوتيرز[®] بلاس SDU قطرة للعين

التركيب

المواد الفعالة

بوفيدون K25، كلوريد صوديوم، لاكلتات صوديوم، كلوريد بوتاسيوم، كلوريد كالسيوم، كلوريد ماغنسيوم

السواغ

هايبيوتيرز بلاس

٠.٠٥ مجم كلوريد بنزالكونيوم في كل مليلتر، سواغ ناقلة

هايبيوتيرز SDU

سواغ ناقلة

الشكل الصيدلاني وكمية المادة الفعالة في كل وحدة

هايبيوتيرز بلاس. هايبيوتيرز بلاس SDU

قطرة للعين: ٥٠ مجم بوفيدون في كل مليلتر

دواعي الاستعمال / الاستخدامات الممكنة

هايبيوتيرز بلاس

علاج أعراض متلازمة جفاف العين

هايبيوتيرز بلاس SDU

علاج أعراض متلازمة جفاف العين، تزيق العدسات اللاصقة الصلبة (القابلة للانثناء) والليننة (الأيفة للماء).

الجرعة وطريقة الاستعمال

قطرة العين هايبيوتيرز بلاس / هايبيوتيرز بلاس SDU، مُصممة للاستخدام في البالغين. لم تُجر بعد دراسات على استعمالها وأمانها في الأطفال.

هايبيوتيرز بلاس / هايبيوتيرز بلاس SDU

علاج أعراض متلازمة جفاف العين: يتم تقطير نقطة واحدة في العين عند اللزوم. يكفي عادةً تقطير نقطة واحدة أربع مرات يومياً.

هايبيوتيرز بلاس SDU

لتزيق العدسات اللاصقة، يتم تقطير نقطة واحدة عند اللزوم إما في كيس الملتحمة، أو على العدسة اللاصقة. SDU واحدة (وحدة ذات جرعة واحدة) لتزيق كلتا العدستين. جفاف العين يحتاج غالباً إلى علاج ممتد. هذا العلاج الممتد يجب مراقبته بصفة دورية.

موانع الاستعمال

الحساسية المفرطة لمكونات هايبيوتيرز بلاس / هايبيوتيرز بلاس SDU.

التحذيرات والاحتياطات

تعليمات للأشخاص الذين يرتدون عدسات لاصقة: الوحدات ذات الجرعة المتعددة من هايبيوتيرز لا ينبغي استعمال هذا المستحضر مع العدسات اللاصقة اللينة (الأيفة للماء) (نظراً لإمكانية تغير لون العدسات اللاصقة بالامتصاص).

التأثرات

في حالة استعمال دواء آخر للعين، يجب أن يوضع قبل هايبيوتيرز بمدة ٥-١٠ دقائق على الأقل.

الحمل والإرضاع

لم تُجر دراسات على السمية التناسلية في الحيوانات، ولم تُجر دراسات منضبطة في النساء الحوامل. لذلك يجب توخي الحذر عند استعمال هايبيوتيرز بلاس / هايبيوتيرز بلاس SDU أثناء الحمل. لا توجد بيانات بشأن تعرض حديثي الولادة لهايبيوتيرز بلاس / هايبيوتيرز بلاس SDU، ولذلك لا ينبغي استعمال المستحضر في النساء المرضعات.

الآثار على القدرة على القيادة وتشغيل الآلات

إذا حدثت غشاوة في الإبصار بعد تقطير هايبيوتيرز، يجب أن يمتنع المرضى عن القيادة أو تشغيل الآلات.

الآثار المناوئة

اضطرابات في العين

قد يحدث لفترة قصيرة إحساس حارق خفيف وإحساس باللزوجة عقب التقطير مباشرة. في حالات نادرة، قد يحدث أيضاً تهيج أو تفاعلات حساسية مفرطة تجاه أحد المكونات. قد تحدث لفترة قصيرة غشاوة في الإبصار.

تجاوز الجرعة

لم يتم الإبلاغ عن أي حالات لتجاوز الجرعة.

الخواص والآثار

الكود ATC: S01XA20

آلية المفعول

يحتوي هايبيوتيرز على بوفيدون، وهو بوليمر تخليقي، قابل للذوبان في الماء، ذو سلسلة متفادنة في الطول، وهو يحتوي أيضاً على إلكتروليات الصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، والكالسيوم، بكميات مماثلة لتلك الموجودة في السائل الدمعي. يتم ترطيب سطح القرنية بصفة خاصة بواسطة الميوسين الذي تنتجه الملتحمة. هذا الميوسين يحدث له امتصاص على سطح القرنية، حيث يكون طبقة أليفة للماء. في المرضى الذين لديهم متلازمة جفاف العين، يتمزق الغشاء الدمعي قبل الأوان أثناء فترات عدم الطرف بالعينين، عادةً بسبب عدم كفاية إفراز الدموع أو عدم كفاية إنتاج الميوسين. هذا قد يؤدي إلى أعراض ذاتية شديدة، يتيح هايبيوتيرز التعويض الجزئي لعيوب الغشاء الدمعي بفضل الغشاء الواقي الذي يكونه بوفيدون.

الحرائك الدوائية

الامتصاص

لم تُجر أبحاث على الحرائك الدوائية لهايبيوتيرز بلاس وهايبيوتيرز بلاس SDU سواء في الإنسان أو في الحيوان. لا يُرجح أن ينفذ بوفيدون K25 عبر القرنية بسبب ارتفاع وزنه الجزيئي.

البيانات قبل الأكلينيكية

الجزآن التي أُضيف إلى طعامها ٥ أو ١٠٪ PVP K25 (بوفيدون) لمدة سنتين، لم تحدث لديها آثار سمية. لا توجد بيانات متاحة عن القدرة على التفتير أو المسخ.

معلومات أخرى

اللاتوافقات

قد تؤدي التركيزات العالية من الملح، مثل سلفات الصوديوم على البارد أو كلوريد الصوديوم على الدافئ، إلى ترسيب بوفيدون.

العمر الرفي

عند تخزين العبوة غير المفتوحة، يمكن استخدام قطرة العين هايبيوتيرز بلاس حتى تاريخ انتهاء الصلاحية (= EXP) المطبوع على العبوة وعلى الزجاجات أو SDU.

احتياطات خاصة بالتخزين

انظر العلبة الخارجية

تعليمات خاصة بالاستعمال والتداول

هايبيوتيرز بلاس (في زجاجات)

أغلق الزجاجات ذات القطارة فوراً بعد الاستعمال. لا تلمس طرف القطارة. بعد فتح الزجاجات، لا تستعمل القطرة لأكثر من شهر واحد.

هايبيوتيرز بلاس SDU

استخدم الوحدة ذات الجرعة الواحدة بعد فتحها مباشرة لأن هذه الصيغة لا تحتوي على مواد حافظة. لأسباب ميكروبيولوجية، لا ينبغي استعمال أي قطرة عين متبقية في الوحدة ذات الجرعة الواحدة المفتوحة بعد تقطيرها. تخلف من الوحدات ذات الجرعة الواحدة المفتوحة بعد استعمالها.

أحجام العبوات

أحجام العبوات مختصة بالبلد.

آخر مراجعة للمعلومات

نوفمبر ٢٠٠٥

تاريخ الموافقة (على النص)

١٥ يونيو ٢٠٠٦

الصانع

انظر العلبة الخارجية.

(٢) = علامة تجارية مسجلة

نوفارتس فارما، شركة مساهمة، بازل، سويسرا

هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يُعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب، وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وينقعه وضرره.
- لا تقطع من تلقاء نفسك مدة العلاج المحددة لك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

تُحفظ الأدوية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيداللة العرب.

23277500