

Tonicalcium®

Solution buvable en ampoule

Adultes : ampoules autocassables de 10 ml

Enfants : ampoules autocassables de 5 ml

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

COMPOSITION Amp. de 10 ml Amp. de 5 ml

Ascorbate de calcium 500 mg 250 mg

Ascorbate de DL-lysine 500 mg 250 mg

Excipients : gallate de propyle, parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), sorbitol, solution de saccharose, glycérol, extrait de framboise-groseille, eau purifiée q.s.p. une ampoule. Teneur en acide ascorbique (vitamine C) : 362 mg par ampoule de 5 ml et 724 mg par ampoule de 10 ml. Degré alcoolique : 3,3°.

FORME PHARMACEUTIQUE : Solution buvable en ampoule. Boîte de 20 ampoules de 5 ml (Enfants) ou de 10 ml (Adultes).

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

À VISÉE ANTI-ASTHÉNIQUE (A : Appareil digestif et métabolisme)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

68, rue Marjoin

92300 LEVALLOIS-PERRET - FRANCE

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte (amp. de 10 ml) ou de l'enfant de plus de 6 ans (amp. de 5 ml).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament **NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ** dans les cas suivants :

- antécédents d'allergie à l'un des constituants de la solution, notamment le parahydroxybenzoate de méthyle ou de propyle;
- taux anormalement élevé en calcium dans le sang ou dans les urines;
- dépôt de calcium dans les tissus;
- calculs rénaux [en raison de la présence de calcium et également lors de l'utilisation de fortes doses de vitamine C (supérieures à 1 g)].

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce médicament peut entraîner une insomnie, il ne doit pas être pris après 16 heures.

Tenir compte de la présence de calcium : 25,6 mg par ampoule de 5 ml ou 51,2 mg par ampoule de 10 ml.

En cas de régime hypoglycémique ou de diabète, tenir compte dans la ration journalière de la quantité de saccharose (sucre) : 1,75 g par ampoule de 5 ml ou 3,5 g par ampoule de 10 ml.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER AVIS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Saccharose, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216).

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE

Ampoule de 10 ml : RÉSERVÉ À L'ADULTE.

2 ampoules par jour.

Ampoule de 5 ml : RÉSERVÉ À L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

2 ampoules par jour.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS.

- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Agiter les ampoules avant usage. À prendre diluées dans un peu d'eau.

Ouverture de l'ampoule autocassable : tenir l'ampoule verticalement et casser la pointe supérieure. Retourner l'ampoule au dessus d'un verre en la tenant obliquement afin que l'autre pointe ne soit pas au-dessus du verre. Casser cette pointe de la même façon pour permettre au liquide de s'écouler.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

En raison de la présence de vitamine C, éviter la prise après 16 heures.

DURÉE DU TRAITEMENT

Ne pas utiliser plus de 4 semaines.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAÎNER, CHEZ CERTAINES PERSONNES, DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

Des doses élevées de vitamine C (supérieures à 1 g) favorisent chez certains sujets l'apparition de calculs rénaux et peuvent accroître l'hémolyse (destruction des globules rouges) chez les sujets déficients en G6PD.

SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

Un léger dépôt peut apparaître dans les ampoules ainsi qu'une faible surpression au moment de l'ouverture. Ceci ne constitue pas un signe d'altération du médicament et ne diminue en aucune façon son activité.

Agiter avant usage.

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir à l'abri de la chaleur.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Septembre 2004.