

# Xailin Fresh



Carmellose 0,5 % p/v  
Collyre sans conservateur  
Unidoses

## FR Mode d'emploi

Il est important de lire attentivement la présente notice avant d'utiliser Xailin Fresh collyre. Les informations fournies présentent les points importants du produit. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Qu'est-ce que Xailin Fresh ?

Xailin Fresh est un collyre à base de carmellose sodique 0,5 % p/v présenté en boîte de 30 ou 5 unidoses de 0,4 ml (échantillon), sans conservateur, stériles jusqu'à leur ouverture.

### Composition :

Xailin Fresh collyre contient de la carmellose sodique 0,5 % p/v, du chlorure de sodium, du chlorure de calcium dihydraté, du chlorure de potassium, du chlorure de magnésium hexahydraté, de la solution de lactate de sodium, de l'hydroxyde de sodium, de l'acide chlorhydrique et de l'eau pour injection.

### Quand utiliser Xailin Fresh ?

Quand vos yeux deviennent rouge et douloureux, commencent à démanger, que vous avez une sensation de corps étrangers ou de brûlure, vous avez alors probablement développé une sensation de sécheresse oculaire, qui doit être soulagée avec Xailin Fresh en récipient unidoses sans agent de conservation. La carmellose, l'ingrédient lubrifiant, soulage les symptômes de sensation de sécheresse oculaire grâce à son action apaisante. Xailin Fresh peut également être utilisé comme solution hydratante pour lentilles de contact.

### Comment utiliser Xailin Fresh ?

1. Détacher l'unidoses à utiliser
2. Pour ouvrir l'unidoses, tourner et tirer sur le capuchon pour le retirer
3. Pencher la tête en arrière et regarder vers le haut
4. Tirer doucement la paupière inférieure de l'œil vers le bas, instiller une goutte de Xailin Fresh dans l'espace qui se trouve entre l'œil et la paupière, puis cligner des yeux plusieurs fois pour diffuser les gouttes uniformément sur toute la surface de l'œil
5. Répéter l'opération pour l'autre œil si l'utilisation de Xailin Fresh a été prescrite pour les deux yeux
6. Jeter l'unidoses immédiatement après utilisation

### Mode d'administration




Détacher une seule unidoses



Tourner et tirer sur le capuchon



Presser légèrement l'unidoses pour instiller une goutte



Jeter après utilisation

### Posologie


La posologie habituelle est de 1 goutte à instiller 2 à 4 fois par jour au besoin ou suivant la posologie indiquée par votre médecin. Vous pouvez également appliquer 1 à 2 gouttes directement sur vos lentilles de contact avant application. Il se peut que votre médecin vous conseille d'utiliser ce produit d'une manière différente.

Suivez ses instructions quant à la manière et au moment d'utiliser ce produit et lisez l'étiquette. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez l'enfant.

### Précautions et avertissements :

- Ce produit est exclusivement réservé à un usage ophtalmique externe.  
Ne pas avaler
- Ne pas utiliser une dose qui aurait été endommagée
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des ingrédients
- Demander conseil à un médecin ou pharmacien en cas de grossesse ou d'allaitement
- En cas de doutes concernant l'utilisation de Xailin Fresh, demander l'avis d'un médecin ou pharmacien
- En cas de persistance des symptômes, consulter un médecin ou pharmacien
- Ne pas toucher l'œil ou toute surface avec l'extrémité de l'unidoses
- Jeter l'unidoses immédiatement après usage. Ne partager Xailin Fresh collyre
- Attendre au moins 30 minutes avant l'administration de tout autre médicament ophtalmique
- La vision peut être floue après l'instillation de Xailin Fresh collyre
- Attendre que la vision normale soit rétablie avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants
- Conserver entre +1 °C et +25 °C
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage ou imprimée sur l'étiquette
- Jeter l'unidoses utilisée conformément à la réglementation locale d'élimination des déchets

**nicox**  Distribué par Nicox Pharma, CS10313, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, France - nicoxpharma@nicox.com

 Medicom Healthcare Ltd., 235 Hunts Pond Road, Fareham, Hampshire, PO14 4PJ, Royaume-Uni



Conserver entre +1°C et +25°C



Ne pas réutiliser



Tenir à l'abri de la lumière



Attention : voir le mode d'emploi



Stérilisé avec des techniques aseptisées



Consulter le mode d'emploi

Xailin est une marque de Nicox  
Dernière révision de la notice : octobre 2013

 0120

CAE/08012/PI/EU/02