

فلنكسن 2,5% جل كيتوبروفن

فئة الإستواء - مستحضر غير إسترويدي مقاوم للإلتهابات، للإستعمال الموضعي.
دواعي الإستعمال - علاج موضعي لآلام العضل وتمزق العضل والكدمات والإنتفاخ وإنبخاع المفصل والتهاب الصرة والتهاب الوتر والتهاب غمد الوتر والتهاب الوريد والتهاب الوريد الخثاري السطحي والتهاب الأوعية اللمفية
تضاد الإستعمال - ينبغي عدم إستعمال هذا المستحضر في حال وجود حساسية سابقة تاريخية من الكيتوبروفن وحمض التيايروفنيك والفينوفيريت ومرشحات الأشعة فوق بنفسجية الشمسية والطور. توقف فوراً عن إستعمال فلنكسن جل في حال تفاعل الجلد، بما في ذلك التفاعلات التي تظهر بعد إستعمال المتزامن لمستحضرات تحتوي على اوكتوكريولين (اوكتوكريولين هو مادة سواغ موجودة في أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل أو في مستحضرات التنظيف الشخصية مثل الشامبو وغسول بعد الحلاقة والجل المستعمل في الدش والحمام ومجونات الجلد وحمرة الشفاه والمعجونات المقاومة للشيوخة ومنتجات التنظيف وسبراي الشعر المستعمل لتجنب الكووس الضوئي للشعر). ينبغي عدم تعريض المنطقة التي تخضع للعلاج لأشعة الشمس أو أشعة المشمسة فوق بنفسجية، خلال مرحلة العلاج وإسبوعين إثنين بعد الإنتهاء منه.
الاحتراست في الإستعمال - من المستحسن الامتناع عن دهن المناطق المجاورة للجروح وإصابات الجلد بمستحضر فلنكسن 2,5% جل.
التفاعلات - أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت قد تناولت حديثاً أية أدوية أخرى، بما في ذلك تلك التي لا تحتاج لوصفة الطبيب.
لم يتم التحقق من وجود أية تفاعلات بين فلنكسن 2,5% جل مع أدوية أخرى. ومع ذلك من المناسب رصد المريض الخاضع للعلاج بواسطة عوامل الكومارينك.
تحذير خاص



تعريض المنطقة التي تخضع للعلاج بالفلنكسن جل لأشعة الشمس (حتى وإن كان السحاب يغطي السماء) أو لأشعة المشمسة فوق بنفسجية من شأنه أن ينتج تفاعلات على مستوى الجلد (تحسس ضوئي). لذلك لا بد من:
- حماية المنطقة التي تخضع للعلاج من أشعة الشمس بالملابس خلال العلاج وفي الإسبوعين الإثنين التاليين، من أجل تفادي أي تحسس ضوئي.
- غسل الأيدي بعناية بعد كل إستعمال لمستحضر فلنكسن جل.

ينبغي عدم إستعمال الضمادات المطبقة (مثل الأثرطة والشاش ومواد اخر التي من شأنها زيادة قدرة الجلد على الإمتصاص). أوقف العلاج فوراً ما أن يظهر أي تفاعل على الجلد بعد إستعمال فلنكسن جل.

معلومات هامة حول بعض مواد السواغ - يحتوي المستحضر على باراهيدروكسيبينزوات الذي من شأنه أن ينتج حساسية من النوع المتأخر بشكل عام.

الحمل والرضاعة - من باب الحذر من المستحسن عدم إستعمال هذا المستحضر خلال الحمل، ما لم يرى الطبيب أو الصيدلي أن ذلك ضرورياً. إستشر الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال أي مستحضر طبي.

الأثر على المهارة في قيادة السيارة أو إستعمال الماكينات - لا توجد معلومات حول أثر إستعمال هذا المستحضر على المهارة في قيادة السيارة أو إستعمال الماكينات.

الجرعات وكيفية وأوقات الإستعمال - أدهن الجلد مرة واحدة أو مرتين إثنين في اليوم بالجل (5/3 سم أو أكثر بحسب المنطقة المعنية) وذلك بلطف الجلد لتسهيل إمتصاص المستحضر. أغسل يديك بعناية ولمدة طويلة بعد إستعمال الدواء.

الجرعة المفرطة - في حال إبتلاع جرعة مفرطة من فلنكسن 2,5% جل بشكل عرضي أخبر فوراً الطبيب أو توجه إلى أقرب مستشفى. ونظراً لمستوى البلازما المنخفض الموجود في كيتوبروفن المستعمل على الجلد يمكننا الجزم بعدم وجود ظاهرة الجرعة المفرطة. في حال الريبة من إستعمال فلنكسن 2,5% جل من المستحسن مراجعة الطبيب أو الصيدلي.

الأثار الجانبية - مثله مثل كافة الأدوية بإمكان فلنكسن جل أن يحدث بعد الأثار الجانبية غير المرغوبة، ولكن ليس عند جميع الأشخاص. مثل الأدوية الأخرى التي تُستعمل على الجلد بإمكان هذا الدواء أن يحدث آثار جانبية غير مرغوبة على الجلد. بالإمكان الحد من هذه الأثار بشكل ملحوظ عن طريق عدم تعريض المنطقة المصابة لأشعة الشمس، بما في ذلك المشمسات، خلال المعالجة وفي الإسبوعين التاليين. إن الإستعمال الموضعي للمستحضرات، خاصة إذا دام طويلاً، من شأنه إحداث تحسس أو تهيج موضعي. في حال حدث ذلك ينبغي التوقف عن إستعمال الدواء والبدء بعلاج مناسب.

أمراض الجلد ونسج تحت الجلد - حمامي، حرقه، حكاك، إتهاب الجلد، أكزيما تماسية، تحسس ضوئي، شرّي، تحسس الجلد، تفاعلات حادة على مستوى الجلد في حال التعرض للشمس. نادرة هي الحالات التي تظهر فيها ردات فعل أخطر مما ذكرناه أعلاه، مثل القاعي والأكزيما النفاطية التي قد تتجاوز منطقة العلاج أو تصبح شاملة.

أمراض الكلى والأمراض البولية - تم الإخبار عن حالات معزولة سببت ببعض الخلل في الكلى. من شأن احترام ومراعاة الإرشادات التي تشمل عليها هذه الورقية أن يحد من ظهور آثار جانبية غير مرغوبة. في حال ساعات إهدى هذه الأثار الجانبية أو في حال لاحظتم ظهور آثار جانبية غير واردة هنا في هذه الورقية الرجاء إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عنها.

التركيبية - كل 100 ملغرام تحتوي على 2,5 غرام من مادة كيتوبروفن الفاعلة.
مواد السواغ: كحول (96% إيتانول)، غليسيرول، كاربوكسيبوليميثيلين، دياتانولامين، ميثيل بي هيدروكسيبنزوات، بروبول بي هيدروكسيبنزوات، ماء مكرر.

الشكل الصيدلاني والمحتوى: 2,5% من الجل داخل النوب من 50 غرام للإستعمال الموضعي.

المسوق والمصنع

إيطلفرماكو ش.م. - ميلانو (إيطاليا)، 330 شارع فولفيو تستي
آخر مراجعة أجرتها "الوكالة الإيطالية للأدوية" في شهر أبريل 2011م