

لاميزيل

بخاخ ١٪

الرجاء قراءة النشرة كاملة قبل بدء استخدام الدواء لإحتوائها على معلومات مهمة لك.

استخدم هذا الدواء دائماً كما ورد في هذه النشرة أو كما وصفه لك الطبيب أو الصيدلي.

- احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها ثانية.
- أسأل الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو نصائح إضافية.
- إذا ظهرت عليك أي أعراض جانبية، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي، ذلك يتضمن الأعراض الجانبية الواردة والغير واردة في هذه النشرة.
- يجب التحدث إلى الطبيب إذا كنت لا تشعر بأي تحسن أو تشعر بسوء حالتك.

تحتوي هذه النشرة على:

١. ما الذي يحتويه بخاخ لاميزيل
٢. ما هو بخاخ لاميزيل وما هي استخداماته
٣. ما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام بخاخ لاميزيل
٤. كيف تستخدم بخاخ لاميزيل
٥. الآثار الجانبية المحتملة

٦. الجرعة الزائدة

نتيجة لانخفاض إمتصاص التريبتينافين في الدم، فإن الجرعات الزائدة مستبعدة. إذا تم ابتلاع عبوة واحدة من بخاخ لاميزيل ٣٠ مل عن طريق الخطأ فإنهم يحتون على ٣٠٠ مجم من هيدروكلوريد التريبتينافين مما يعادل قرص من لاميزيل ٢٥٠ مجم (الجرعة الاعتيادية للبالغين).

إذا تم ابتلاع كمية أكبر من بخاخ لاميزيل بالخطأ، فإن الأعراض الجانبية المتوقعة هي نفسها الخاصة بالجرعة الزائدة.

الجرعة الزائدة في اقراص لاميزيل: تشمل الصداع، الغثيان، آلام البطن، الدوار. لاحظ أن المحتوى الكحولي في بخاخ لاميزيل ١٨,٨٧٪ (V/V) في حالة الابتلاع عن طريق الخطأ.

٧. كيفية تخزين بخاخ لاميزيل

علاج الجرعات الزائدة:

في حالة الابتلاع عن طريق الخطأ، يتم استخدام الفحم المنشط للحد من الأعراض الجانبية مع معالجة الأعراض الجانبية إن لزم.

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي فوراً، إذا ابتلعت هذا الدواء عن طريق الخطأ.

٨. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

البخاخ: متوفر على شكل ٣٠ مل و ١٥ مل

الشركة الصانعة والمالكة لحق التسويق:

تم تصنيعه بواسطة:

ديفارم هانتيج - فرنسا لصالح جي أس كي كونسيومر هيلث كير شويز آيه جي، سويسرا

تمت المراجعة في يوليو ٢٠١٩

تم التحديث وفقاً للإصدار يونيو ٢٠١٤

هذا دواء

- الدواء هو مستحضر يؤثر على صحتك وإستخدامه بعكس التوجيهات قد يكون خطير.
- اتبع توجيهات الطبيب، وطريقة الإستخدام وتوجيهات الصيدلي الذي قام ببيع الدواء لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخياران البدأء، سواء فوائده أو مخاطره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك دون الرجوع إلى الطبيب.
- لا تعيد إستخدم نفس الوصفة دون الرجوع إلى الطبيب.
- إحتفظ بالأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

إتحاد الصيدالة العرب

العلامة التجارية مملوكة/مرخصة لمجموعة شركات جي أس كي.

٩. كيف تستخدم بخاخ لاميزيل

للاستعمال الخارجي فقط

لاستخدام على الجلد:

غسل وتجفيف المناطق المصابة جيداً قبل استخدام بخاخ لاميزيل.

البالغين:

- يُستخدم بخاخ لاميزيل مرة واحدة في اليوم.
- عند استخدام بخاخ لاميزيل، قم بتطريب المنطقة المصابة والمناطق المحيطة.

فترات العلاج الشائعة:

(القدم الرياضي): مرة يومياً لمدة أسبوع

تبدأ إختفاء الأعراض عادة بعد أيام قليلة.

الاستخدام غير المنتظم أو وقف الاستخدام المبكر قد يسبب ظهور المرض من جديد.

إذا لم يحدث أي تحسن بعد أسبوع يجب استشارة الطبيب.

الأطفال:

- لا يوصى باستخدام بخاخ لاميزيل للأطفال أقل من عمر ٢ سنة، لعدم وجود بيانات متعلقة بالفعالية والسلامة.
- لم تتأكد سلامة وفعالية الدواء على الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة.
- نظراً للبيانات السريرية المحدودة، لا يوصى باستخدام بخاخ لاميزيل للأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً.

كبار السن:

- لا توجد أي دلائل على أن كبار السن بحاجة إلى جرعات خاصة. ولا توجد دلائل لظهور آثار جانبية لا تظهر عند المرضى الأصغر سناً

١٠. الآثار الجانبية المحتملة

قد يسبب بخاخ لاميزيل بعض الأعراض الجانبية مثل كل الأدوية لكنها لا تحدث لدى جميع المرضى.

معظم الناس يستخدمون من استخدام بخاخ لاميزيل. تُعرّف البيانات كما يلي:

شائع جداً (<1/١٠٠)، شائع (<1/١٠ > 1/١٠٠٠)، عرضي (<1/١٠٠٠ > 1/١٠٠٠٠)،