

بانسورال

ساليسلات الكولين - سيتالكونيوم كلوريد

التركيب: ساليسلات الكولين ٨,٧ جم، سيتالكونيوم كلوريد ٠,١ جم، سواغ عطري كمية كافية ل ١٠٠ جم (كحول ٩٦٪، حجم/حجم، جليسول، هيدروكسي إيثيل سليولوز، زيت اليانسون النجمي، محلول طيبي من هيدروكسيد الصوديوم في ٣٢٪ مياه نقية). كمية الكحول: ٣٧٪. جل للغشاء المخاطي للفم: انبوبة تحتوي على ١٥ جم.

التصنيف الدوائي: يُستعمل كعلاج موضعي لأمراض الفم.

اسم وعتوان الترخيص التسويقي في فرنسا: بيير فابر للدوية - ٤٥ ساحة ابل جانس - ٩٢١٠٠ بولونيا - فرنسا
المصنع: بيير فابر للإنتاج شارع اليبسه - جيان - فرنسا
دواعي الاستعمال: يُستخدم في المدى القصير لتخفيف الآلام الناتجة عن التهاب وتقرح الغشاء المخاطي للفم.

الاحتياطات ونواهي الاستعمال:

يجب عدم استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- إذا كانت هناك سوابق للحساسية من الساليسلات (الأسبرين).
- وللأطفال الأقل من ١٨ سنوات

في حالة الشك يجب استشارة طبيب الأسنان.

احتياطات خاصة: يُستخدم هذا الدواء للبالغين فقط.

يجب استشارة طبيب الأسنان في حالة عدم التحسن خلال بضعة أيام. التهاب اللثة نتيجة لأطقم الأسنان الصناعية قد يتطلب تعديلها، وفي هذه الحالة يعتبر بانسورال علاجاً مؤقتاً.
ملاحظة: يحتوي هذا المنتج على ٣٩ غراماً من الكحول في ٩٦٪ لكل ١٠٠ غرام.
احتياطات الاستعمال: في حالة الشك، يجب استشارة طبيب الأسنان.

التفاعلات الدوائية وغيرها: لتجنب حدوث تفاعلات دوائية يجب دائماً استشارة طبيب الأسنان قبل تناول اي دواء.
النساء الحوامل والمرضعات: بشكل عام، يجب على النساء الحوامل والمرضعات إبلاغ طبيب الأسنان أو طبيب الفم بحالتهم قبل استخدام أي دواء.

سواغ لها آثار معروفة: الكحول

الجرعات وطريقة الاستعمال: يُستخدم هذا الدواء للبالغين وللأطفال الموضعي على اللثة حيث يجب غسل الأسنان جيداً وتجفيفها قبل استعمال الدواء وذلك من ١-٤ مرات في اليوم. بالنسبة لأطقم الأسنان الصناعية الدائمة: ضع قليل من بانسورال جل على المنطقة المصابة، ويكون على مستوى الضرس أو القواطع.
بالنسبة لأطقم الأسنان المؤقتة: ضع الجل على جزء طقم الأسنان الملامس للمنطقة المصابة. وبمجرد وجوده بالفم ينتشر الجل بانتظام بفعل الحرارة والحركة أثناء المضغ.

الآثار غير المرغوبة: كونه مستحضر فعال، فقد يكون له بعض الآثار الجانبية بدرجات مختلفة لدى بعض المرضى مثل: • الحساسية للأدوية التي تحتوي على الساليسلات.

• احتمال حدوث التهاب نتيجة وجود الكحول.

لا تتردد في استشارة طبيب الأسنان وإخباره بحدوث أعراض جانبية أخرى غير التي تم ذكرها بالنشرة الداخلية.
التخزين: يجب ألا يتعدى التاريخ المدون على الغلاف الخارجي للعبوة. يُحفظ في درجة حرارة لا تتخطى ال ٢٥ درجة مئوية.