

DOGMATIL® 200 mg

أقراص قابلة للقطع

دوغماتيل® 200 ملغ

سولبيرايد

الرجاء قراءة هذه النشرة كاملة، قبل تناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى أو شكوك، إسأل الطبيب أو الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.
- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطه أبداً إلى شخص آخر حتى إذا كانت عوارضه مماثلة لعوارضك لأنه قد يؤذي.
- في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبية أو في حال لاحظت تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة :

1. ما هو دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع وما هي دواعي استعماله
2. قبل أن تتناول دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع
3. كيف يجب تناول دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع
4. التأثيرات الجانبية المحتملة
5. طريقة حفظ دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع
6. معلومات إضافية

1. ما هو دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع وما هي دواعي استعماله

مضاد للذهان مهدئ؛ عصبي

بنزاميد

يُستعمل هذا الدواء لعلاج بعض أشكال الاضطرابات السلوكية لدى البالغين.

2. قبل أن تتناول دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع

إذا قال لك الطبيب إنك تعاني من عدم تحمل بعض أنواع السكر، اتصل به قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع في الحالات التالية :

- فرط الحساسية ضد السولبيرايد أو ضد أحد المركبات الأخرى في الدواء،
 - ورم مشحون متعلق بالبرولاكتين، مثلاً ورم الغدة النخامية أو سرطان الثدي،
 - ورم القواتم (حالة تصيب لب الكظر وتسبب ارتفاعاً في ضغط الدم)،
 - بالتزامن مع أدوية الدوبامين غير المستعملة كأدوية مضادة لداء باركنسون: كابرغولين وكيناغوليد (دواءان يُستعملان لاضطرابات الإرضاع) (راجع فقرة «تناول أدوية أخرى»).
- إذا كان لديك أي شك، من الضروري أن تستشير الطبيب أو الصيدلي.

إعتمد عناية خاصة مع دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع

تحذيرات خاصة

في حال الإصابة بحمي غير مبررة أو بشحوب أو بتعرق كثيف، من الضروري الاتصال بالطبيب أو بمركز طوارئ طبي على الفور.

بغية كشف أي اضطرابات قلبية محتملة، قد يطلب منك الطبيب إجراء مخطط كهربية القلب لأن هذا الدواء يمكن أن يسبب اضطرابات في النظم القلبي (راجع الفقرة 4 "التأثيرات الجانبية المحتملة").

يجب استعمال هذا الدواء بحذر لدى المرضى الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بسكتة دماغية.

يجب استعمال هذا الدواء بحذر لدى المرضى المسنين المصابين بالعتة.

يجب استعمال هذا الدواء بحذر إذا أصبت أنت أو أحد أفراد عائلتك في السابق بجلطات دموية بما أن تناول مضادات الالتهاب يربط بتشكّل جلطات دموية.

لا يُنصح بتناول هذا الدواء مع مشروبات أو أدوية تحتوي على الكحول ومع الليفيدوبا وأدوية الدوبامين المضادة لداء باركنسون ومضادات الطفيليات التي يمكن أن تسبب التواء أطراف البطنين بسبب كثرة خفقانها (اضطرابات خطيرة في نظم القلب) والميثادون ومهدئات عصبية أخرى وأدوية يمكن أن تسبب التواء أطراف البطنين بسبب كثرة خفقانها (راجع فقرة "تناول أدوية أخرى").

يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز. لا يجدر بك تناول هذا الدواء إذا كنت تعاني من عدم تحمل الغالاكتوز أو من نقص لاب لاكتاز أو من تناذر سوء امتصاص الغلوكوز والغالاكتوز (أمراض وراثية نادرة).

في حال الشك من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

محاذير الاستعمال

يجب عليك أن تعلم طبيبك إذا كنت مصاباً بأي من الحالات التالية لكي يكيّف الجرعة و/أو مراقبة العلاج:

- مرض في القلب،
- داء باركنسون،
- قصور كلوي،
- إصابات سابقة بنوبات صرع (منذ وقت بعيد أو حديثاً) أو صرع،
- داء السكري أو عوامل خطر الإصابة بداء السكري.

في حال الشك، لا تتردد باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

تناول أدوية أخرى

لا ينبغي تناول هذا الدواء مع الكابرجوسين أو الكينايغوليد (دواءان يُستعملان لاضطرابات الإرضاع) (راجع فقرة "لا تتناول دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع في الحالات التالية").

يجب تفادي استعمال هذا الدواء مع المواد التالية:

- بعض أدوية علاج داء باركنسون.
 - بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب التواء أطراف البطنين بسبب كثرة خفقانها (اضطرابات خطيرة في نظم القلب).
 - المشروبات أو الأدوية التي تحتوي على الكحول.
- الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول حالياً أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى بما فيها تلك التي حصلت عليها بدون وصفة طبية.

الحمل

يجب عدم استعمال هذا الدواء في خلال فترة الحمل إلا بناء على نصيحة الطبيب. إذا اكتشفت أنك حامل اتصلي بالطبيب لكي يقرر ما إذا كان من الضروري متابعة العلاج. استشري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

الإرضاع

لا يُوصى بالإرضاع في خلال مدة العلاج بهذا الدواء. استشري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

القيادة واستعمال الآلات

يجب عليك أن تعرف أن هذا الدواء قد يسبب النعاس لا سيما إذا كنت تقود سيارة أو تستعمل آلات.

معلومات مهمّة حول بعض مكونات دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع اللاكتوز.

3. كيف يجب تناول دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع

ما هو عدد أقراص دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع التي يجب تناولها

للاستعمال لدى البالغين فقط.

مقدار الجرعة متغيّر ويجب أن يُحدّد حسب كلّ حالة فردية. في مطلق الأحوال، تقيّد بدقة بوصفة الطبيب.

كيف يجب تناول دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع عن طريق الفم

ما هي مدة العلاج بدوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع تقيّد بوصفة الطبيب.

إذا تناولت كمية من دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع أكبر من التي عليك تناولها إذا تناولت جرعة مفرطة من هذا الدواء، أعلم الطبيب أو مركز طوارئ طبياً على الفور بسبب خطر التعرّض لاضطرابات قلبية خطيرة.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل الأدوية كلّها، يمكن أن دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع يسبب تأثيرات جانبية لا تصيب المرضى كلّهم.

- غياب الدورة الشهرية، تضخّم الثديين، إفراز غير طبيعي للحليب من الحلمة،
- عنة، فتور جنسي،
- زيادة وزن،
- نعاس،
- رجفة، تيبس و/أو حركات غير طبيعية تتضمّن حركات الوجه (واللسان)،
- دوّار عند الوقوف بعد الاستلقاء أو الجلوس،
- اضطرابات في نظم القلب قد تؤدي إلى الوفاة (راجع فقرة « تحذيرات خاصة ») نوبات صرع،
- طفح،
- زيادة في انزيمات الكبد،

- يمكن أن تمرّ جلطات دموية وريدية لا سيما في الساقين (تتضمّن العوارض تورماً وألماً واحمراراً في الساقين) عبر الأوعية الدموية لتصل إلى الرئتين مسببةً ألماً في الصدر وصعوبات في التنفّس. إذا تعرّضت لأحد هذه العوارض إذهب إلى الطبيب على الفور.

- تناثر المهديّ العصبي الخبيث ويمكن أن يهدّد الحياة: حمى غير مبرّرة، تعرّق، شحوب، تغيير في ضغط الدم أو نظم القلب، ضعف في الوعي، تيبس عضلي، أعلم الطبيب أو مركز طوارئ طبياً على الفور في حال ظهر أحد هذه العوارض (راجع فقرة « تحذيرات خاصة »).

لا تتردد باستشارة الطبيب أو الصيدلي وبالإبلاغ عن أي تأثيرات غير مرغوب بها ومزعجة، لا سيما التأثيرات غير المذكورة في هذه النشرة.

5. طريقة حفظ دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع

إحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظّهم. لا تأخذ دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدوّن على العلبة.

إحفظ الدواء في حرارة لا تتعدى 30 درجة مئوية.
لا ينبغي رمي الأدوية في المياه المبتذلة أو مع النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة، فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع

المادة الفاعلة هي:

200 ملغ

قاعدة للسولبيديل

لقرص واحد قابل للقطع.

المكوّنات الأخرى هي: نشا البطاطس، لاکتوز، ميثيلسلولوز، سيليكات مميّهة، طلق، ستيرات
المعتنيزيوم.

كيف يأتي دوغماتيل 200 ملغ، أقراص قابلة للقطع ومحتويات العلبة
الخارجية

أقراص قابلة للقطع (علبة من 12)

حامل رخصة التسويق والشركة المشغلة

sanofi-aventis France - 1-13, boulevard Romain Rolland - 75014
Paris – France

المصنّع

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE – 6, boulevard de l'Europe –
21800 Quetigny - France

تاريخ الموافقة الأخيرة على هذه النشرة تشرين الثاني 2009

ان هذا الدواء

مستحضر يوتر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات
الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و في نفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الادوية في متناول الاطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيدلة العرب.