

اقرأ كامل هذه النشرة بعناية قبل استعمال هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كان لديك أسئلة أخرى أو شك مما استشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.
- لقد وصفت هذا الدواء لك شخصياً، لا تعمله لأي شخص آخر حتى ولو كان لديه أعراض مماثلة لأنه قد يوفذه.
- في حال تقام أحد التأثيرات الجانبية أو إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أعلم الطبيب أو الصيدلي.

لا ينبغي التوقف عن استعمال هذا الدواء توقفاً مفاجئاً، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور ظاهرة النظام التي تتميز بظهور أعراض مثل الأرق والغثان والتقيؤ ويمكن أيضاً ظهور حركات غير طبيعية وإعادة ظهور الاضطرابات التنمائية.

أخذ أو استعمال أدوية أخرى

لا ينبغي عليك أبداً أخذ هذا الدواء مع الكاربوجولين والكينالوجويد (دواءان يُستعملان في اضطرابات الإرعاش) والسيتاموبرام والإينكيتابولورام (دواءان يُستعملان لعلاج القلق أو الاكتئاب) والنيوميريدون (دواء يُستعمل لعلاج الغثان والتقيؤ) والهيدروكورتيزون (دواء يُستعمل لعلاج القلق أو الشرى).

يجب عليك تقادي أخذ هذا الدواء مع:

- بعض الأدوية المستخدمة في علاج داء باركنسون (أمانتادين، أوموفرين، بروموكريبتين، انتاكابون، ليزويد، برغوليد، بريويديل، براميكسول،
- رازاجلين، روينيرول، وريفونتين، فلوكلانين، توكافون،
- الفيفورديا،
- أوكسيتبات صوديوم (دواء يُستعمل لعلاج الصداع)،
- بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب اضطرابات خفيفة في النظم القلبي (التواء أطراف البطينين بسبب كثرة خفقانها) مثل:
- أدوية مستعملة لعلاج عدم انتظام ضربات القلب (مضادات الانظمية من الفئة Ia مثل فيو كينيدين وبيدروكينيدين وديزويراميد ومضادات الانظمية من الفئة III مثل فيو دارون ودونيدارون وسوتالول ودوفيتيليد وليوفيتيليد)،
- بعض الأدوية المضادة للاضطرابات النفسية (كلوروبرومازين، سيامامزين، ديريوريدول، فلونيكسول، فلوفازين، هالوبريدول، ليفومبرومازين، ميوميد، بيبيامبرون، فلوفازين، سوليفيريد، سوتوبريد، ثيابريد، زوكلوينتيكسول)،
- بعض مضادات الفطريات (كلوكوكين، هالوفانترين، لوميفانترين، بنتاميدين)،
- دواء يُستعمل كإحداة الإمان على بعض الخدراات (ميثانول)،
- وأدوية أخرى مثل: الزنخ، فيميثالين، دولازيترون، IV، إيريروسومين، IV، ليفوفلوكساسون، ميكلانين، ميزولاستين، بروكازويد، فيكثامين، IV، مكسيفلوكساسون، سيراميسين، IV، توريميغين، فاندناتانين،
- أدوية تحتوي على الكحول.

أعلم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ حالياً أو إذا أخذت مؤخراً دواء آخر حتى ولو كان دواء حصلت عليه بدون وصفة طبية.

الطعام والشراب

كما مع كل مضادات الندهان من فئة الأدوية هذه، يجب عليك تقادي استهلاك الكحول في خلال مدة العلاج.

العمل

لا يُصح باستعمال هذا الدواء في خلال فترة الحمل.

إذا اكتشفت حملك، استشري الطبيب على الفور لأنه الوحيد القادر على اتخاذ القرار بضرورة مواصلة هذا العلاج.

إذا أخذت سوليان في خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من حملك، يمكن أن تظهر المراض التالية على طفلك: رجفة، تقيس عضلي و/أو ضعف عضلي، نماس، تهيج، مشاكل في التنفس، مشاكل في التغذية. إذا عانى طفلك من أي من هذه المراض، اتصل بالطبيب على الفور.

استشري الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

الإرضاع

إذا كنتِ تأخذين هذا الدواء، لا ينبغي عليك الإرضاع.

استشري الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

قيادة السيارات وتشغيل الآلات

يمكن أن يسبب هذا الدواء الندهان. يجب عليك أن تكون يقظاً إذا كنت تقود سيارة أو تستعمل آلة.

معلومات مهمة حول بعض مركبات سوليان

يتحتوي هذا الدواء على السكر (اللاكتوز) الذي يتصلح ليسمح للغلاكتوز وفلوكوز. لا يُصح باستعماله لدى المرضى المصابين بعدم تحمل الغالاكتوز أو بنقص لاكتاز لابي أو بنشاز سوء امتصاص الفلوكوز والغللاكتوز (أمراض وراثية نادرة).

إذا قال لك طبيبك إنك تعاني من عدم تحمل بعض أنواع السكر، اتصل به قبل أخذ هذا الدواء.

كيف يُؤخذ سوليان**مقدار الجرعة**

تعيّد دائماً بالجرعة التي وصفها طبيبك. في حال الشك، استشر الطبيب أو الصيدلي.

لا توقف العلاج من تلقاء نفسك.

طريقة الاستعمال

يُستعمل هذا الدواء عن طريق الفم. ابلع القرص (الأقرامص) مع بعض الماء.

إذا أخذت كمية سوليان أكثر من التي ينبغي لك أخذها،

قد تشعر بنماس أو بتسكين (تأثير مهدئ) أو بانخفاض ضغط الدم الشرياني أو ببولاض خارج الهرمية (خاصة رجفة وتقيس عضلي) أو يمكن أن تدخل في غيبوبة.

1. ما هو سوليان وما هي دواعي استعماله
2. ما هي للمومات الواجب معرفتها قبل أن تأخذ سوليان
3. كيف يؤخذ سوليان
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة
5. كيف يحفظ سوليان
6. معلومات إضافية

1. ما هو سوليان وما هي دواعي استعماله

ينتمي سوليان إلى فئة من الأدوية تُسمى مضادات الندهان.

يُستعمل هذا الدواء لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الضمام، الضمام مرض نفسي يتميز ببعض الاضطرابات النفسية والسلوكية، مثلاً هلوسات أو تملعل.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أن تأخذ سوليان**مواقع الاستعمال،****لا تأخذ سوليان أبداً،**

- إذا كنت تعاني من حساسية ضد المادة الفاعلة (أميسولبيريد) أو ضد أحد المركبات الأخرى التي يحتوي سوليان عليها. تجد لائحة المركبات في القسم 6.
- إذا كنت تعاني من ورم القواتم (مزعومرقل في الغدد الكظرية الموجودة على مستوى الكليتين والتي تفرز مواداً تسبب ارتفاعاً في ضغط الدم).
- لدى الأطفال ما دون 15 عاماً.
- إذا كنت حُرمنين.
- إذا كنت مصاباً بورم متعلق بالبرولاكتين (هورمون يؤدي إلى إفراز الحليب)، مثلاً سرطان الثدي أو اضطرابات تصدالي الغدة النخامية.
- إذا كنت تأخذ دواء آخر تأكد من أن استعماله لا يتعارض مع سوليان غير ممنوع (راجع فقرة 4 وأخذ أو استعمال أدوية أخرى).
- في حال الشك، لا تردد باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

محددات الاستعمال، تحذيرات خاصة،**تحذيرات ومحاذير الاستعمال**

يمكن أن يجرى لك طبيبك مخطماً لكبرائية قبل أن يُعطيك هذا العلاج. لا توقع، يمكن أن يسبب هذا الدواء اضطرابات في النظم القلبي (راجع القسم 4، ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة).

يجب استعمال هذا الدواء باحذر في الحالات التالية:

- لدى الأشخاص المسنّن، لا سيما إذا كانوا مصابين بالته، بسبب خطر انخفاض الضغط الشرياني والندهان. في حالة التصور الكوكي، يمكن أن يخفّض طبيبك مقدار الجرعة.
- إذا كان لديك عوامل خطر الإصابة بسكتة دماغية (تسمى أيضاً جلطة، وتصلو عندما تتوقف الدورة الدموية فجأة في قسم من الدماغ).
- إذا أصبت أنت أو أحد من أفراد عائلتك سابقاً بتشكّل جلطات دموية ناتجة عن مضادات الندهان يمكن أن يسبب تشكّل جلطات دموية.
- إذا كنت مصاباً بمرض كلوي (فشل كلوي). في هذه الحالة يمكن أن يخفّض طبيبك الجرعة.
- إذا كنت تعاني من الصدغ أو من داء باركنسون.
- إذا كنت مصاباً بداء السكري أو إذا كان لديك عوامل خطر الإصابة بالسكري.
- إذا أصبت سابقاً بفرفط برولاكتين الدم (كمية مفرطة من البرولاكتين في الدم)
- أو ورم متعلق بالبرولاكتين (هورمون إفراز الحليب)، مثلاً سرطان الثدي أو اضطرابات تصد
- في حال الإصابة بالخمّية. في هذه الحالة، يجب أن يراقبك طبيبك مراقبة دقيقة في خلال فترة العلاج.

في حال أصبت بتقيس في العضلات وياضطرابات الوعبي مع حمى غير مبررة في خلال فترة العلاج، يجب التوقف الفوري عن استعمال الدواء واستشارة الطبيب في الحال.

في حالة الإصابة بجمغ أو بجمي غير مبررة، يمكن أن يطلب منك طبيبك إجراء فحص دم على الفور. في الواقع يمكن أن يسبب هذا الدواء اختلالاً في عناصر الدم (انخفاض عدد كريات الدم البيض) يظهر في نتائج فحص الدم (راجع القسم 4). ما هي الآثار الجانبية المحتملة).

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي سوليان 100 ملغ، فرص قابل للتجزئة؟

المادة الفاعلة:

أميسوليريد.....100 ملغ

لتفحص الواحد القابل للتجزئة.

المركبات الأخرى هي:

كاربوكسيميثيل نشا السوديوم (النوع أ)، لاكتوز وحيد التميّة، سلولوز دقيق البلّورية، هيروميلوز، ستيرات المغنيزيوم.

ما هو سوليان ومحتوى العلبية الخارجيّة؟

يأتي هذا الدواء على شكل قرص قابل للتجزئة.

تحتوي كلّ علبية على 100، 30، 15 أو 150 قرص قابل للتجزئة.

قد لا تكون كلّ الأحجام متسوّقة في بلدك.

شروط الوصف والتسليم

قائمة 1

الشركة الحاملة لخصة التسويق

sanofi-aventis France
82, avenue Raspail
94250 Gentilly – France

المصنّع

Delpharm Dijon
6, boulevard de l'Europe
21800 Quétigny - France

التاريخ الأخير الذي تمّ فيه الموافقة على هذه النشرة، أيلول 2015.

في حال حصول إحدى هذه الحالات، يجب أن تتصل أنت شخصياً أو أحد من محيطك بالطبيب أو بالطوارئ الطبيّة.

إذا نسيت أخذ سوليان:

لا تأخذ جرعة مضاعفة، بل خذ الجرعة التالية في وقتها المعتاد.

إذا نسيت عدّة جرعات، استشر الطبيب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل الأدوية كلّها، يمكن أن يسبّب هذا الدواء تأثيرات جانبية لا تُصيب المرضى كلّهم.

إنّ حصول تيبس العضلات واضطرابات في الوعي مع حمى غير مبررة في خلال فترة العلاج يتخلّب الإفراط القوي للعلاج واستشارة طبيّة طارئة.

◀ تحصل التأثيرات الجانبية التالية بصورة شائعة جدّاً (أكثر من شخص واحد من أصل 10)،
- رجفة، تيبس عضلي، تشنجات، حركات غير طبيعيّة، زيادة إفراز العلاب.

◀ تحصل التأثيرات الجانبية التالية بصورة شائعة (من شخص واحد
حتى 10 أشخاص من أصل 100)،

- حسّاس الرقبة، نوبات في العصب المحرّك العين (حركات غير طبيعيّة في بعض عضلات العينين)،
- كدمات شديدة في الفك،
- نعاس،
- آرق، قلق، تهيج.

- إسهال، غثيان، تقيؤ، جفاف الفم،
- برودة جنسيّة (غياب الرغبة الجنسيّة لدى المرأة)،
- فرط بروتاكتين الدم (كميّة مفرطة من البرولاكتين في الدم، الهرمون الذي يؤدّي إلى درّ الحليب)،
• مما يمكن أن يسبّب:
- لدى المرأة، توقف العادة الشهرية، درّ الحليب خارج فترات الإرضاع العاديّة، أوجاع في الثديين،
• لدى الرجل: تورّم الثديين وعجز (اضطراب في الانتصاب).
- زيادة في الوزن.
- انخفاض ضغط الدم (نقص ضغط الدم).

◀ تحصل التأثيرات الجانبية التالية بصورة غير شائعة (من شخص واحد
حتى 10 أشخاص من أصل 1000)،

- حرقة غير إرادية في اللسان و/أو الوجه،
- اختلاجات (انقباضات إرادية في أحد العضلات أو في عدّة عضلات)،
- فرط سكر الدم (كميّة مفرطة من السكر في الدم)،
- تباطؤ النظم القلبي،
- زيادة انزيمات الكبد وبخاصة ناقلات الأمين،
- ارتكاسات تحسسية.

◀ يمكن أن تحصل التأثيرات الجانبية التالية ولكن معدّل حصولها غير معروف،

- حمى غير مبررة ترتبط باضطرابات عامة وعضوية،
- فرط ثلاثي غليسريد الدم (كميّة مفرطة من الشحوم (الدهون الثلاثية) في الدم)،
- فرط كولسترول الدم (كميّة مفرطة من الكولسترول في الدم)،
- تشنّج،
- إغماء خطير (فقدان الوعي)، اضطرابات في النظم القلبي يمكن أن تسبّب الوفاة
(راجع قسم «ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أن تأخذ سوليان؟»)،
- تورّم، ألم واحمرار في الساقين. في الواقع، يمكن أن تنتقل خثرات دمويّة وريدية
(لا سيّما على مستوى الساقين) عبر الأوعية الدمويّة حتّى الرئتين وأن تسبّب ألماً في الصدر
وصعوبة في التنفّس،
- تورّم مفاجئ في الوجه و/أو العنق يمكن أن يسبّب صعوبة في التنفّس ويمكن أن يعرّض المريض
للخطر (خزب وعائي)، يتبع حمراء على الجلد تسبّب الحكّة (شرى)،
- نقص الكريات البيض، قلّة العدلات، ندرة المحببات (انخفاض كمّيّة الكريات البيض في الدم)
(راجع قسم «ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أن تأخذ سوليان؟ فقرة «تحذيرات
ومحاذير الاستعمال»)
- تناذر هضام الطفل الحديث الولادة (راجع قسم «ما هي المعلومات الواجب معرفتها
قبل أن تأخذ سوليان؟ فقرة «الحمل»).

الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية

إذا شعرت بأيّ تأثير جانبيّ، تحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي، وهذا ينطبق أيضاً على كلّ تأثير جانبيّ
غير متذكور في هذه النشرة.

بالإبلاغ عن التأثيرات الجانبية، تساهم في تزويد المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

5. كيف يُحفظ سوليان

يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن نظر ومتناول الأطفال.

لا يستعمل سوليان بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدوّن على العلبية.
يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

يُحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئويّة.

لا ينبغي التخلّص من الأدوية عبر مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزليّة. أسأل الصيدلي عن كيفية
التخلّص من الأدوية غير المستعملة. من شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.