

Xatral® 2,5 mg

كزاترال® 2,5 ملغ

أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

الرجاء قراءة هذه النشرة بدقة قبل البدء باستعمال هذا الدواء.

- إن حفظت هذه النشرة فقد تحتاج إلى قرئها مجدداً.
- إذا كانت لديك أي أسئلة أو أي شكوك، استشر الطبيب أو الصيدلي للمزيد من المعلومات.
- لقد وصف هذا الدواء لك أنت شخصياً، لا يجرّد بك إعطاؤه للآخرين فقد يؤذيهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عورضك.
- في حال تقادم أحد التأثيرات الجانبية أو في حال لاحظت تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة،

1. ما هو كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة، وما هي دواعي استعماله
2. قبل أن تستعمل كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة
3. طريقة استعمال كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة
4. التأثيرات الجانبية المحتملة
5. طريقة حفظ كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة
6. معلومات إضافية

1. ما هو كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة، وما هي دواعي استعماله
حاصرات ألفا

ينتمي هذا الدواء لفئة الأدوية المسماة حاصرات ألفا بوصف هذا الدواء للعلاج للأشياء الوظيفية لتضخم البروستات الحميد (زيادة حجم البروستات)

2. قبل أن تستعمل كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص قابلة للقطع

في حال أصعبك طبيبك أنك تعاني من عدم تحمّل بعض أنواع السكر، اتصل به قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول أبداً كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة في الحالات التالية،

- حساسية معروفة ضد الألفوزين-و/أو ضد مركب آخر من مركبات الدواء
- نقص الضغط الوعائي (شعور بالدوار والقيء عند الانتقال من وضع الاستلقاء إلى الوقوف)؛
- قصور حاد في وظيفة الكبد (القصور الكبدي)؛
- قصور حاد في وظيفة الكلى؛
- بالتزامن مع الريتونايفير.

يعتمد حذراً خاصاً مع كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة،

تحذيرات

قد يكون بعض المرضى حساسين بصورة خاصة تجاه كزاترال® 2,5 ملغ، مما يسبب لديهم هبوطاً في ضغط الدم عند الانتقال من وضع الاستلقاء إلى الوقوف. قد يحدث هذا التأثير في الساعات القليلة الأولى بعد تناول الدواء ويكون مصحوباً بالعوارض التالية: دوار تعب، ترقق يجب أن يفيى المريض مستلقياً حتى تختفي بالكامل هذه العوارض العابرة. يوصى باعتماد الحذر بخصوصية لدى المسنين والمرضى الذين تعرّضوا لهبوط حاد في ضغط الدم بعد تناول دواء من الفئة نفسها (حاصرات ألفا)

تتأثر الفرجية الرهلة خلال الجراحة
إذا كنت ستخضع لجراحة البسّ (بسبب عدسات ممتعة) في المستقبل القريب وإذا عولجت في السابق أو كنت تعاني حالياً بـكزاترال® 2,5 ملغ، أعلم طبيبك المعين قبل العملية. إن إن هذا الدواء قد يسبب تأثيراً جانبياً قد يسبب مضاعفات خلال العملية ولكن في حال تمّ إعلام الجراح مسبقاً، سوف يتخذ الاحتياطات اللازمة. حسب علاجك خلال العملية يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز. يجب عدم استعماله في حال الإصابة بعدم تحمّل اللاكتوز (مرض وراثي نادر) إن حفظ الدواء دائماً بعيداً عن متناول الأطفال

محاذير الاستعمال

أعلم طبيبك إذا كنت مصاباً بمرض في القلب، وبخاصة مرض شريانتي تاجي.

تناول/ استعمال أدوية أخرى

بغية تفادي أي تفاعل بين دواء أو دواء، لا سيما بعض الأدوية المستعملة لضغط الدم أو بعض الأدوية المضادة للضغط (كينورينازول، إيتراكونازول، ريتونايفير أو بعض المضادات الحيوية (كلاريثروميسين، إيريثروميسين). يجب عليك أن تعلم الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر تخضع له.

الحمل والإرضاع

لا يستعمل هذا الدواء لدى النساء كقاعدة عامة، إذا كنت حاملاً أو مرضعة، يجب عليك دائماً إعلام الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء.

القيادة واستعمال الآلات

بواجهة السائقين وموظفي الآلات خطر التعرض لنقص ضغط الدم الوعائي (هبوط في ضغط الدم عند الوقوف، يرافقه دوار أحياناً)، أو للدوار أو للتعب أو لاضطرابات بصرية خاصة عند بداية العلاج

السواغ أو آخر محدّد

اللاكتوز الوحيد التمتي.

3. كيف يؤخذ كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

ما هو عدد أقراص كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة، التي يجب عليك

تناولها

تبلغ الجرعة المعتادة فرصاً واحداً ثلاث مرّات في اليوم. يواجه المسنون والمرضى الذين يتناولون أدوية لضغط الدم المرتفع أو الذين يعانون من قصور في وظيفة الكبد، يمكن تعديل هذه الجرعة.

كيف يجب أخذ كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

عبر الفم يجب ابتلاع الأقراص كاملة مع كوب من الماء

متى يجب أخذ كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة وصد مرّات تناولها
وفقاً لوصفة الطبيب

ما هي مدة العلاج بـكزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

لا توقف العلاج قبل استشارة الطبيب أولاً.

إذا تناولت أقراص كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة أكثر من التي يجب

عليك تناولها

اتصل بالطبيب.

إذا نسيت تناول كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة
لا تأخذ قرصين أو عدّة أقراص في الوقت نفسه ولكن تناول جرعتك التالية كالعادة.

4. التأثيرات الجانبية الممكنة

مثل الأدوية كلها، يمكن أن يسبب كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة، تأثيرات

التأثيرات الشائعة

- دوخة، دوار، شعور بالدوار إغماء، هبوط في ضغط الدم عند الانتقال من وضع الاستلقاء إلى الوقوف، صداع؛
- اضطرابات معدية معوية مثل الغثيان أو ألم المعدة أو الإسهال، جفاف الفم؛
- شعور بالثعب؛
- التأثيرات غير الشائعة:
- نعاس؛
- اضطرابات في العين؛
- تسارع سرعة القلب، خفقان، غثبان؛
- احتقان الأنف؛
- ارتكاسان لمدية مثل الطلع أو الحكاك؛
- إجمار الوجه، أوديما، ألم في الصدر؛

التأثيرات الشائعة جداً

- دجعة صدرية لدى المرضى الذين عانو في السابق من مرض شريانتي تاجي (راجع فقرة "محاذير الاستعمال")؛
- شرى، خرب وعلمي؛
- التأثيرات ذات التوتّر غير المعروف
- التهاب الكبد، خاصة بسبب انسداد السبيل الصفراوي.
- انتصاب مطوّل وولم

إذا لاحظت أي تأثيرات غير مرغوب بها ومزعجة غير مذكورة في هذه النشرة أو في حال تقادمها، الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلي

5. طريقة حفظ كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

أبق الدواء بعيداً عن متناول الأطفال وانظرهم.
لا تستعمل كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدوّن على العلبة الخارجية

يُحفظ على حرارة لا تتعدى 30 درجة مئوية.

إن حفظ عبوات الظروف المشددة حرارياً في علبيها الخارجية بعيداً عن الضوء والرطوبة.

لا ينبغي التخلص من الأدوية عبر المياه المبتذلة أو التفتاب الممتزلة. إنسال الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها في شأن هذه الإجراءات حماية البيئة

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

المادة الفاعلة هي،

ميدروكلويد الألفوزوسين.

المركبات الأخرى هي، لاكتوز وحيد التمتي، سولونول دقيق البلورية، بوفيدون، غليكولات نشا

الصوديوم، ستيارات المكنونيوم، قرص واحد مغلّف بطبقة رقيقة.

مادة تغليف القرص: ميبرونيلوز، ماعرغول 400، ثاني أكسيد التيتانيوم (E 171)

كيف يؤخذ كزاترال® 2,5 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة وما هي محتويات الغلاف الخارجي؟

أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة (علبة من 30 قرصاً).

حامل رخصة التسويق والشركة المشغلة

sanofi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris, France

المصنع

Sanofi Winthrop Industrie
30-36, avenue Gustave Eiffel
37100 Tours, France

تمت الموافقة الأخيرة على هذه النشرة في، أيار 2009.

ان هذا الدواء

مستحضر يودر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

* الطبيب والصيدلي هما الخبيرين في دواء وفي نفعه وضرره.

* لا تقطع مدة العلاج لكهدة لك من تلقاء نفسك.

* لا تترك صرف الدواء بدون استشارة لطبيب

* لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
 واتحاد الصيدالة العرب.