

فيرو سانول® الإثنا عشري

مركب سلفات – جلايسين
الحديدوز

Ferro sanol® Duodenal

<p>مذكرة معلومات المريض</p> <p>أرجو قراءة الرزمة المتوضعة في الداخل بشكل كامل وبعناية، لأنها تتضمن معلومات هامة لك.</p> <p>يتوفر هذا الدواء أيضا من دون وصفة طبية على أية حال، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة يجب استعمال الفيرو سانول® الإثنا عشري وفق التعليمات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">احفظ هذه الرزمة في الداخل، لا تك تعد تريد قراءتها مرة أخرى لاحقا. إذا احتجت إلى معلومات أو نصائح إضافية، أرجو طرح سؤالك على طبيبك أو الصيدلاني. إذا ازدادت أعراضك سوءا أو لم يطرأ عليها تحسن، فأن استشارة طبيبك في هذه الحالة يكون أمرا إلزاميا.

تتضمن هذه الرزمة معلومات حول

- ما هو الفيرو سانول® الإثنا عشري، ودواعي استعماله؟
- ما هي الاحتياطات التي عليك ملاحظتها قبل تناول الفيرو سانول® الإثنا عشري؟
- كيفية استعمال تناول الفيرو سانول® الإثنا عشري؟
- ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟
- ما هي ظروف التخزين اللازمة للفيرو سانول® الإثنا عشري؟

الفيرو سانول® الإثنا عشري

المادة الفعالة: مركب سلفات جلايسين-الحديدوز(II)

المواد الفعالة من ناحية علم الأدوية: مركب سلفات جلايسين-الحديدوز(II)

تحتوي كل كيسولة جلايتينية-صلبة منه على ٥٧.٧٠ ملغ من مركب سلفات-جلايسين-الحديدوز (والذي يكافئ ١٠٠ غراما من Fe²⁺).

السواغات هي:

للمر مشترك ميثاكريليك حسامتي-إيثيل اكريلات (٧) (Ph. Eur.)، سليولوز بلوري ميكروي، حامض الاسكوربيك، تالكوم، ثلاثي إيثيل أسيتوكسي-بروبان-١،٢،٣ ترياكربوكسيل)، هيدروكسيهوبيل سيليلوز،هيدروميلوز، بوليسوربيت ٨٠، سترات المغنيسيوم (Ph. Eur.)، صوديوم دوديسيل، نشرة الكيسولة-جيلاتين، ثنائي اوكسيد التيتانيوم (E 17١)، اوكسيد الحديديك (E17١) (III) هيدرات اوكسيد الحديد (E 172)، اوكسيد الحديدوز والحديديك(II,III) (E 172) يتوفر الفيرو سانول® الإثنا عشري في عبوات تحتوي على ٢٠ (٧)، ٥٠ (٢٠) و١٠٠ (٣٠) كيسولة ذات الجيلاتين، الصلب.

١ ما هو الفيرو سانول® الإثنا عشري، ودواعي استعماله؟

الفيرو سانول® الإثنا عشري مستحضر حديد فموي استبدالي ويستعمل لمعالجة عوز الحديد.

يتم تزويد الفيرو سانول® الإثناعشري من قبل:

سانول **GmbH** ١٠ شارع الفريد نوبل د-٤٠٧٨٩ مانهايم تelfون: ٥٨٥٧ - ٠٢١٧٣ /٤٨ فاكس: ٥٨٥١ - ٠٢١٧٣ /٤٨

الموزع المساعد:

شوارز للمستحضرات الصيدلانية هولندا GmbH ١٠ شارع الفريد نوبل د-٤٠٧٨٩ مانهايم تelfون: ٥٨٥٧ - ٠٢١٧٣ /٤٨ فاكس: ٥٨٥١ - ٠٢١٧٣ /٤٨

يتم تصنيع الفيرو سانول® الا ايضا من قبل : شوارز للمستحضرات الصيدلانية **AG**

١٠ شارع الفريد نوبل د-٤٠٧٨٩ سانهايم تelfون: ٠ - ٢١٧٣ /٤٨ فاكس: ٦٦٠٨ - ٠٢١٧٣ /٤٨

دواعي الاستعمال :

للعلاج من فقر الدم النشائي من عوز الحديد وعلى وجه الخصوص؛الحمل والارضاع؛ في مرحلة الطفولة؛ للاشخاص الذين يتناولون وجبات فقيرة بالحديد؛بعد فقدان المزمن أو الحاد.

٢-٣ ما هي الاحتياطات التي عليك ملاحظتها قبل تناول الفيرو سانول® الإثنا عشري؟

١-٢ يجب عدم استعمال الفيرو سانول® الإثنا عشري في الحالات التالية:

إذا كان لديك حساسية مفرطة للمادة الفعالة أو لأي من سواغات الدواء؛ في حالة المرضى الذين لديهم قابلية لفرط الحديد (حالات التكنس الصبغي، فقر الدم التكريسي) في حالة اضطرابات الانتعاش من الحديد (مثل فقر الدم سايديروفلاستيك، فقر الدم الرصاصي، التلاسيما)
الأطفال : يجب عدم اعطاء الاطفال دون السادسة من العمر الفيرو سانول® الإثنا عشري.

٢-٢ يتطلب استعمال الفيرو سانول® الإثنا عشري احتياطا خاصا في الحالات التالية:

في مرضى الفرح المعوية.

يجب وعلى وجه الخصوص عند كبار السن الذين يتجلى لديهم أعراض عوز الحديد / فقر الدم والتي لا يمكن تفسير مصدره اخضاعهم لفحص دقيق للتعرف على مصدر عوز الحديد /الترن.
يجب على المرضى الذين لديهم فقر دم على نحو ثانوي بالنسبة لأمراض الكلوية الخطيرة تناول الفيرو سانول® الإثنا عشري والأيزوبيريتين معا.

الحمل والارضاع

بما ان احتياجات الجسم من الحديد ترتفع اثناء الحمل والارضاع، يجب تطبيق رعاية خاصة خلال تلك الفترات حيث يمكن تناول الفيرو سانول® الإثنا عشري بانتظام حسب المقادير الموسى بها من قبل الطبيب.

المقردة على السواعة واستعمال الات لا يوجد احتياطات خاصة مطلوبة

٢-٣ تداخلات مع الأدوية الأخرى

يجب اعلام طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت ممن تأخذ أو تأخذ حديثا ادوية أخرى، حتى ولو كانت تلك الادوية لا تحتاج إلى وصفات طبية.

استعزاز الاثر من خلال الاختطار المرتفع للاثار الجانبية

يمكن تهييج استئثاره الغشاء المعدي المعوي عن طريق الاستعمال المشترك للمسكنات والادوية ضد الروماتيزم (سالييسيلات والفينيل بيوتازون).

الإنفاص في الاثر

يمكن تثبيضا امتصاص كل من الحديد و التتراسكلينات أو الفسفونات العضوية عند تزامن اعطاء الفيرو سانول® الإثنا عشري مع التتراسكلينات (وهي مضادات حيوية معينة) أو الفسفونات العضوية.
ايضا يتم تثبيضا امتصاص الحديد إذا تم اعطائه بالتزامن مع الكوليسترامين أو الادوية المحتوية على 2+2، Mg، ٣+١ A (مثل مضادات الحموضة واسلح المغنيسيوم).

يكون امتصاص البينسلاجين، والمركبات الذهبية التسوية، ل-ميتيلدايا، ليفودوبا ول-ثيروكسين اسوأ عند اعطاء ما مع الحديد.

يتم نقصان امتصاص انواعا معينة من المضادات الحيوية (فلوروكوينولونز مثل سيوفلوكراسسين، نورفلوكساسين وافرلوكساسين) بشكل كبير بفعل الحديد.
يجب فصل تناول الفيرو سانول® الإثنا عشري مع الادوية المذكورة اعلاه بساعتين على الاقل.

تداخلات محتملة أخرى

يكون اختبار البترينين ايجابيا خلال المعالجة بالحديد. قد يحدث تلونا غامقا في البراز ولذلك من الطبيعي ان تكون نتائج الاختبارات الشائعة حاليا لتقدير الدم الخفي في البراز ايجابية.

٢-٤ تناول الفيرو سانول الإثنا عشري مع الاغذية والاشربة الأخرى

تثبيط المراد المرجوة في الاغذية الخضرية (مثل، الجبوسوب والخضراوات) التي تشكل معقدات مع الحديد (مثل مركبات الفيتا، الاكسيولات والفسفاتية)

وكما هو الحال بكونونات القهوة، الشاي، الحليب والكرلا تبطأالحديد إلى الدم.

٣.كيفية استعمال تناول الفيرو سانول® الإثنا عشري؟

يجب اتباع تعليمات هذه المذكرة بدقة عند تناول الفيرو سانول® الإثناعشري، إذا لم تكن متأكد يمكنك الاتصال مع طبيبك أو الصيدلاني.

٣-١ تكون الجرعة العادية لفيرو سانول® الاثناعشري ما لم تكن هناك وصفة طبية من قبل الطبيب :

يتناول البالغون والاطفال من سن ٦ سنوات في العادة كيسولة واحدة يوميا. قد يحتاج المرضى في حالات عوز الحديد المؤكدة عند البالغين والمرهقين من سن ١٥ سنة أو ذوي الازران ٥٠ كغم تناول جرعة تبلغ ٢-٣ اضعاف الجرعة العادية في بداية المعالجة.

٣-٢ كيفية ومدة تناول الفيرو سانول® الإثنا عشري :

يجب تناول كيسولة الفيرو سانول® الإثنا عشري من دون مضغ ومع كمية كافية من مياه الشروب، يجب اخذ الدواء اما على معدة فارغة في الصباح (حوالي الساعة الاولى قبل تناول وجبة الافطار) أو على فترات طويلة كافية بحوالي ساعتين قبل أو بعد تناول الوجبة.

ملاحظة

إذا ثبت لديك صعوبة ابتلاع الكيسولة أو ان ذلك اسرا غير مرغوبيا، فيمكن في هذه الحالة تناول سحويات الكيسولة من دون الغلاف.

لاجراء ذلك، على المريض استخدام يداه الاثنان لشطر الكيسولة إلى نصفين في ملعقة شورية حيث يتم تجميع ٣٠٠ -٤٠٠ حبيبة من محتوى الكيسولة. يجب تناول كميات مياه كافيةسبب بعد تناول المريض محتويات الكيسولة من ملعقة الشورية.

طبيبك وحده من سيقدر فترة المعالجة.

يجب الاستمرار طالما نعت الحاجة في المعالجة الفموية للحديد وذلك بعد عودة مستويات وقيم الهيموجلوبين وقيم (خضاب الدم) إلى وضعهما الطبيعيين.
يجب سيطرة قيم الفريت في مصل الدم لاعادة تشجيع و ملي مخازن الحديد في الجسم.
سوف تستمر فترة المعالجة ما بين ٦ و٦ اشهر وقد تستغرق وقتا اطول في حالات معينة أخرى، ويعتمد هذا على حدة ووخامة فقر الدم والحالة الشخصية للمريض.
يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني عندما تشعر ان تأثير الفيرو سانول® الإثنا عشري قوي أو ضعيف جدا.

٣-٣ عند تناولك كمية كبيرة من الفيرو سانول® الاثناعشري فعليك فعل ما يلي:

بعد تناولك جرعة مفرطة عن قصد أو بشكل عرضي، تسمح الاعراض الموصوفة في الجزء ٤ الاعراض الجانبية أكثر بروزا.
إذا ظهرت الاعراض السريرية للتسمم بفعل الجرعة المفرطة، فسوف يتم تطبيق القواعد المعتادة لمعالجة التسمم في هذه الحالة.
في حالة تناول كمية كبيرة جدا من الفيرو سانول® الإثنا عشري، يجب اعلام الطبيب فوراً. ومن أجل تأخير أو تثبيضا امتصاص الحديد من الجسم يجب تناول مادة الحليب أو بياض البيض ومضمسه.

٣-٣ عندما يفوتك تناول جرعة الفيرو سانول® الإثنا عشري:

إذا نسيت تناول جرعة أو عدة جرعات من الفيرو سانول® الإثناعشري، فسوف تطول في هذه الحالة فترة المعالجة الكاملة، وهي الفترة الزمنية اللازمة لتقيم الفريتين في مصل الدم العردة إلى معدلها الطبيعية.

لا تتم بتناول الجرعة المضاعفة في الوقت التالي، ولكن عليك بمتابعة المعالجة بالجرعات الموسى بها.

٤.ما هي الاعراض الجانبية المحتملة؟

كما هو الحال في جميع الأدوية، فيمكن للفيرو سانول® الإثنا عشري التسبب في الاعراض الجانبية. وتستعمل المصطلحات التالية بشكل شائع في سرد الاعراض الجانبية:
نادر: اقل من ١ إلى ١٠،٠ ولكن أكثر من ١٠٠ إلى ١٠٠٠ شخصاً تم معالجتهم.
نادر اجد: اقل من ١ إلى ١٠٠٠٠ شخصاً تم معالجتهم ويتضمن هذا العدد الحالات المستفردة.
قد تحدث شكاوى من الجهاز المعدي المعوي مثل الاسهال، الامساك، الحرارة أو القيء.
تتناسب وتيرة هذه الاعراض مع الجرعة.

لم يلاحظ حدوث اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي.
قد تظهر وري في حالات قليلة جدا ريات فعل تحسسية.
تتكون محتويات الكيسولة الواحدة من حوالي ٣٠٠ -٤٠٠ حبيبة، والتي ناتج عن الحديد.
اما التلون الراجع في اللسان و ما حولها فهو نادر الحدوث.
ارجو اعلام طبيبك أو الصيدلاني لاية أعراض جانبية لم تذكر في هذه

٥. ما هي ظروف التخزين اللازمة للفيرو سانول® الإثنا عشري ؟

يجب تخزين الدواء بعيدا عن متناول الاطفال.
يجب عدم استعمال الفيرو سانول® الإثنا عشري بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الغلاف الخارجي لعبوة الدواء.

لا تحفظ الدواء على درجة حرارة أعلى من ٢٥ درجة مئوية.

تاريخ المعلومات : كانون ثاني؛٢٠٠٤

تعليمات بخصوص سحب الدواء من هذه الرزمة

للحصول على الكيسولة بسهولة أكثر من شريطة الرزمة، قسم فانسط وبعناية بالضغط على نهايتي الكيسولة.
سيمنع هذا الامر ايضا الحاق الضرر بالكيسولة ذاتها.
تحتاج كل خلية في الجسم إلى الحديد للقيام بوظائفها على اكمل وجه.
اما الانزيمات (الخمائر) المعتمدة على الحديد فهي مكونة في جميع خطوات الاستقلاب (الأيض) الهامة.
يرتبط حوالي ٧٠٪ من الحديد في الجسم بالهيموجلوبين، المادة المضيئة لخلايا كريات الدم الحمراء واهم وظائفها نقل الاوكسجين من الرئة إلى جميع اعضاء وأنسجة الجسم.
وبالتالي فان التأثير المباشر لنقص الهيموجلوبين هو الامداد غير الكافي لاعضاء الجسم بالاكسجين، يظهر نقص الحديد في البشر على شكل انهالك، ضعف التركيز، شحوب، شقير في زوايا االم، سهولة تكسر الاظافر وتساقط الشعر.
يزيد فقر الدم النشائي عن عوز الحديد من الاستعداد للاصابة وحصول المضاعفات في الام والجنين أثناء الحمل.
يحتوي الفيرو سانول® الإثنا عشري على سلفات الحديدوز والجلايسين (حامض أميني).
تتكون محتويات الكيسولة الواحدة من حوالي ٣٠٠ -٤٠٠ حبيبة، والتي تتوزع بالتساوي في المعدة بعد ذوبان الكيسولة؛ وبالاستئان إلى غلاف الكيسولة المتاوم للعصائر المعدية، تمر الكيسولة من المعدة من دون تغير، وبعد ان تصل الكيسولة إلى الاثني عشر، ينظلق الحديد بسرعة من الحبيبة ويتجلى على شكل امخصاص.

اسم المنتج	هو الفيرو سانول الاثناعشري	المصادقة	التاريخ	التوقيع	الرسالة الرسمية إلى تاريخ الشحن
رقم التعريف	٠٥٠٠٠٥٦٦٤				عقد المصنع
الاعباد	١٤٠×٥٢				رقم بطاقة التعريف لعقد المصنع
الالوان	شوارز				طباعة PDF
اسم المشغل	فينودريك				ملاحظات
تاريخ التخليق	٢٠٠٥/٩/٢٣				
قام بالتعديل	فينودريك (دورمان)				
تاريخ التعديل	٢٠٠٥/١٢/٦				
رقم الطبعة	٤				

<p>هذا هو الدواء</p> <p>الدواء وهو المنتج الذي يؤثر على صحتك عند معاكسة التعليمات خطر عليك.</p> <p>اتبع وبدقة متتامة وصمة الدواء، طريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلاني الذي يوصف الدواء.</p> <p>لا تثم من نشأة نشك ونف ملت نشرة المعالجة الموصونة.</p> <p>لا تثم بتكار تناول الرصفة لانها من دون استشارة طبيبك، لا تترق ذرواء في تناول الاطفال مجلس وزراء الصحأ العرب الاتحاد العربي للصيدلة.</p>
--

ملفات المرجع على شكل PDF الرقمية المرسله شرعية من دون توقيع، تم ايداع النسخ الأصلية في دائرة تكنولوجيا الرّم.

انتقاه؛ تنضيد جديد

ارجو قراءة الموضوع بعناية وبشكل ذاتي

شوارز للمستحضرات الصيدلانية