

فירו سانول جين®

مركب سلفات – جلايسين الحديدوز / حامض الفوليك

Ferro sanol® gyn

مذكرة معلومات المريض

أرجو قراءة الرزمة المتوضعة في الداخل بشكل كامل وبعناية، لأنها تتضمن معلومات هامة لك.

يتوفر هذا الدواء ايضاً من دون وصفة طبية على اية حال، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة يجب استعمال الفيرو سانول® جين وفق التعليمات التالية:

- احفظ هذه الرزمة في الداخل، لانك تسد تبرد قراءتها مرة أخرى لاحقاً.
- اذا احتجت الى معلومات أو نصائح إضافية، أرجو طرح سؤالك على طبيبك أو الصيدلاني.
- اذا زادت أعراضك سوءاً أو لم يطرأ عليها تحسن، فان استشارة طبيبك في هذه الحالة يكون أمراً الزامياً.

تتضمن هذه الرزمة معلومات حول

- ١.ما هو الفيرو سانول® جين، ودواعي استعماله؟
- ٢.ما هي الاحتياطات التي عليك ملاحظتها قبل تناول الفيرو سانول® جين؟
- ٣.كيفية استعمال تناول الفيرو سانول® جين؟
- ٤.ماهي الاعراض الجانبية المحتملة؟
- ٥.ما هي ظروف التخزين اللازمة للفيرو سانول® جين؟

الفيرو سانول® جين

المواد الفعالة من ناحية علم الادوية:
مركب سلفات جلايسين-الحديدوز(II) و حامض الفوليك

تحتوي كل كبسولة جلايتينية-مسلبة منه على ٤٩.١٣مليغ من مركب سلفات جلايسين-الحديدوز و حامض الفوليك (والذي يكافئ ٨٠ غراماً من Fe⁺²) وملغ واحد من حامض الفوليك.

السواغات هي:

سليولوز بلوري ميكروي، لاكلوز، سوهيدرات، بلير مشترك ميثاكرليك حامض-إيثيل اكريلات (Ph. Eur.) (٧/١)، حامض الاسكوربيك، جلايكوليت نشأ الصوديوم، (٢.٨-٤.٢٪/صوديوم)، تالكوم، ثلاثي إيثيل (٢-أسيتوكسي-بروبان-١،٢،٢-ترايكربوكسيل)، هيدروكسي بروبييل سيليلوز،هيدروميلوز، بربليسوربيت ٨٠، سترات المغنيسيوم (Ph. Eur.)،ثنائي اوكسيد السيليكون عالي الانتثار، صوديوم دوديسي، نشرة الكبسولة، جيلاتين، مياه نقية، ثنائي اوكسيد التيتانيوم (E 171)، هيرات اوكسيد الحديد (E 172)، اوكسيد الحديدك (III) (E 172) يتوفر الفيرو سانول® جين في عبوات تحتوي على ٢٠(١ن)، ٣٠، ٥٠، ١٠٠(٢ن) و١٠٠٠(٣ن) كبسولة ذات الجيلاتين الصلب.

١.ما هو الفيرو سانول® جين، ودواعي استعماله؟

الفيرو سانول® جين مستحضر حديد فقوي استبدل مع حماس الفوليك ويستعمل لمعالجة عوز الحديد و حامض الفوليك، يتم تزويد الفيرو سانول® جين من قبل سانول GmbH ١٠ شارع الفريد نوبل د -٤٧٨٩ مانهיים
تلفون: ٠٠ ٤٩ ٢١٧٣/٤٨-٥٥٨ ٥٧
فاكس: ٠٠ ٤٩ ٢١٧٣/٤٨-٥٥٨ ٥١

الموزع المساعد:

شوارز للمستحضرات الصيدلانية المانيا GmbH ١٠ شارع الفريد نوبل د -٤٧٨٩ مانهיים
تلفون: ٠٠ ٤٩ ٢١٧٣/٤٨-٥٥٨ ٥٧
فاكس: ٠٠ ٤٩ ٢١٧٣/٤٨-٥٥٨ ٥١

يتم تصنيع الفيرو سانول® الايضاً من قبل : شوارز للمستحضرات الصيدلانية AG

١٠ شارع الفريد نوبل د -٤٧٨٩ مانهיים
تلفون: ٠٠ ٤٩ ٢١٧٣/٤٨-١٦٠٨
فاكس: ٠٠ ٤٩ ٢١٧٣/٤٨-١٦٠٨

دواعي الاستعمال:

للعلاج من العوز المركب للحديد وحماس الفوليك، وعلى وجه الخصوص اثناء الحمل والارضاع وفي حالات سوء التغذية.

٢-ما هي الاحتياطات التي عليك ملاحظتها قـبل تناول الفيرو سانول® جين؟

١-٢ يجب عدم استعمال الفيرو سانول® جين في الحالات التالية:

إذا كان لديك حساسية مفرطة للسادة الفعالة أو لأي من سواغات الدواء في حالة المرضى الذين لديهم قابلية لفقر الحديد (حالات التنبكس الصبغاي فقر الدم التكريسي).

في حالة اضطرابات الانتعاف من الحديد (مثل فقر الدم سايدرو بلاستيك ، فقر الدم الرصاصي، التلاسيميا).

في حالة فقر الدم الميغالوبلاستيك، الناتجة عن عوز فيتامين ب١٢ (مثل ذلك العوز الناتج عن فتد أو نقص العامل داخلي المنشأ).

الاطفال
يجب عدم اعطاء الاطفال دون السادسة من العمر الفيرو سانول® جين.

٢-٢ يتطلب استعمال الفيرو سانول® جين احتياطا خاصا في الحالات التالية :

في مرضى الترح المعرية.

يجب وعلى وجه الخصوص عند كبار السن الذين يتجلى لديهم اعراض عوز الحديد/ فقر الدم والتي لا يمكن تفسير مصدره اخضاعهم لفحص دقيق للتعرف على مصدر عوز الحديد/الترف.

يجب على المرضى الذين لديهم فقر دم على نحو ثانوي بالنسبة للاسراض الكلوية الخطيرة تناول الفيرو سانول® جين والايريتروبيوتين معا.

الحمل والارضاع
يمكن تناول الفيرو سانول® جين بالمقادير الموصى بها اثناء الحمل والارضاع لمعالجة العوز المركب للحديد و حامض الفوليك. يجب عليك، على اية حال، عدم تناول الفيرو سانول® جين الا بوصفة من الطبيب فقط

المقكرة على السواقه واستعمال الات
لا يوجد احتياطات خاصة مطلوبة

تحذيرات هامة تتعلق بـمكونات معينة، للفيرو سانول® جين

يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز من مـونيدرات. ، اذا كنت تعرف انك تعاني من عدم تحمل السكر، يجب عدم تناول الفيرو سانول جين الابدع استشارة الطبيب.

٢-٣ تناذلات سع الادوية الأخرى

يجب اعلام طبيبك او الصيدلاني انك اذا كنت سمن تأخذ أو تأخذ حديثا اى دوية أخرى، حتى ولو كانت تلك الادوية لا تحتاج الى وصفات طبية.

استعزاز الاثر من خلال الاختطار المرتفع للانار الجانبية

يمكن تهيج استشارة العشاء المعدي المعوي عن طريق الاستعمال المشترك للمسكنات و الادوية ضد الرومازم (سالييسيلات والفينيل بيوتازون).

يمكن لتناول الجرعات العالية من الفيرو سانول جين زيادة الميل نحو حدوث الاختلاجات في الاشخاص الذين يتلقون العلاج الاختلاجي.

الانقاص في الاثر

يمكن تثبيد امتصاص كل من الحديد او التتراسيكلينات اـر الفسفونات العضوية عند تزامن اعطاء الفيرو سانول® جين مع التتراسيكلينات (وهي مضادات حيوية معينة) او الفسفونات العضوية. ايضاً يتم تثبيد امتصاص الحديد اذا تم اعطائه بالتزامن مع الكوليسترامين او الادوية المحتوية على ٢،Ca+٢، Mg+٣، AI+٣ (مثل مضافات الحومسة و املاح الكالسيوم و المغنسيوم). يكون امتصاص البنسلامين، والمركبات الذئبية القوية، ل-ميثيلدوبا، ليفودوبا ول-ثروكسين أسوأ عند اعطائه مع الحديد. يتم انقاص امتصاص انواعا معينة من المضادات الحيوية (فلوروكينولونيز مثل سيوفلوكساسين، نرفلوكساسين و اوفلوكساين) بشكل كبير بفعل الحديد.

تضعف المواد التالية امتصاص حامض الفوليك مثل سيتوستنتكس، سلفوناميد، انتيبايبتيكس وباريبيتراتيس.

يجب فصل تناول الفيرو سانول جين مع الادوية المذكورة اعلاه بساعتين على الاقل.

الاثار الجانبية المحتملة، الأخرى

بم أن لكل من حامض الفوليك وفيتامين ب١٢ المتدرة على رفع معدلات الخلايا الشبكية (وهي رسل كريات الدم الحمراء) في الدم، فان تناول احد الفيتامينين على حده (مثل ذلك تناول حامض الفوليك او الفيرو سانول® جين) قد يؤدي الى اخفاء النقص في الفيتامين الآخر.

يكون اختبار البترئين ايجابيا خلال المعالجة بالحديد. تسد يحدث ثورنا غامضا في البراز وذلك من الطبيعي ان تكون نتائج الاختبارات الشائعة حاليا لتقدير الدم الخفي في البراز ايجابية.

٢-٤ تناول الفيرو سانول® جين مع الأذبية والأشربة الأخرى

تثبيط المواد المرجودة في الأذبية الخضرية (مثل، الحبوب والخبز) والحضارات التي تشكل معدقات مع الحديد (مثل مركبات الفيتا، الاركسيلات والفسفاتية) وكما هو الحال مكونات القهوة، الشاي، الحليب والكرلا قبط الحديد الى الدم.

٣.٢ كيفية استعمال تناول الفيرو سانول® جين؟

يجب اتباع تعليمات هذه المذكرة بدقة عند تناول الفيرو سانول® جين. اذا لم تكن متأكد يمكنك الاتصال مع طبيبك او الصلياني.

٣-١ تكون الجرعة العادية للفيرو سانول® جين ما لم تكن هناك وصفة طبية، من قبل الطبيب

يتناول البالغون والاطفال من سن ٦ سنوات في العادة كبسولة واحدة ذات غلاف جيلاتيني صلب يوميا. يجب تناول مقدار اعلـى (٢-٣) كبسولة في حالات عوز الحديد المزدكة عند البالغين والمرافقين من سن ١٥ سنة أو ذوي الازران ٥٠ كغم في بداية المعالجة. في هذه الحالة يجب توزيع تناول الكبسولات على فترات متساوية.

٣-٢ كيفية ومدمة تناول للفيرو سانول® جين

يجب تناول كبسولة الفيرو سانول® جين الجلـاتينية-الصلبة من دون مضغ ومع كمية كافية من مياه الشرب. يجب اخذ الدواء اما على معدة فارغة في الصباح (حوالي الساعة الاولى قبل تناول وجبة الافطار) او على فترات طويلة كافية بحوالي ساعتين قبل او بعد تناول الوجبة.

ملاحظة،

اذا ثبت لديك صعوبة ابتلاع الكبسولة أو ان ذلك اسرا غير مرغوبا، فيمكن في هذه الحالة تناول محتويات الكبسولة من دون الغلاف، لاجراء ذلك على المريض استخدام يده الاثنان لسطح الكبسولة لي نصفين في ملعقة شورية لتجميع محتوى الكبسولة. يجب تناول كميات مياه كافية بعد تناول المرض محتويات الكبسولة من ملعقة الشوربة.

طبيبك وحده من سيقدر فترة المعالجة.

يجب الاستمرار طالما دعت الحاجة في المعالجة الفعرية للحديد وذلك بعد عودة مستشريات وقسيم الهيموجلوبين (خضاب الدم) الى وضعهما الطبيعيين. يجب مناظرة قسيم الفريتين في مصل الدم لاعادة اشباع وعلى مخازن الحديد في الجسم .سوف تستمر فترة المعالجة ما بين ٣ و٦ اشهر وقد تستغرق وقتا اطول في حالات معينة أخرى، ويعتمد هذا على حدة وخامة فقر الدم والحالة الشخصية للمريض. يجب استشارة الطبيب او الصيدلاني عندما تشعر ان تأثير الفيرو سانول جين قوي او ضعيف جدا.

٣-٣ عند تناولك كمية كبيرة من الفيرو سانول® جين فعليك فعل ما يلي:

بدا تناو لك جرعة مفرطة عن قصد او بشكل عرضي، تصعب الاعراض المرصوفة في الجزء ٤ الاعراض الجانبية اكثر بروزا. اذا ظهرت الاعراض السريرية لتسمم بفعل الجرعة المفرطة، فسوف يتم تطبيق القواعد المعتادة لمعالجة التسمم في هذه الحالة. في حالة تناول كمية كبيرة جدا من الفيرو سانول جين، يجب اعلام الطبيب فوراً. ومن اجل تاخير أو تثبيد امتصاص الحديد من الجسم يجب تناول مادة الحليب او بياض البيض وحمض.

٣-٣ عندما يفوتك تناول جرعة الفيرو سانول® جين:

اذا نسيت تناول جرعة او عدة جرعات من الفيرو سانول® جين، فسوف تطول في هذه الحالة فترة المعالجة الكاملة، وهي الفترة الزمنية اللازمة لتقيم الفريتين في مصل الدم العردة الى عدالتها الطبيعية. لا تقم بتناول الجرعة المضاعفة في الوقت التالي، ولكن عليك بمتابعة المعالجة بالجرعات الموصى بها.

٤. ما هي الاعراض الجانبية المحتملة؟

كما هو الحال في جميع الادوية، فيمكن للفيرو سانول جين التسبب في الاعراض الجانبية. وتستعمل المصطحات التالية بشكل شائع في سرد الاعراض الجانبية، نادرا: اقفل من الى ١٠٠،٠٠٠ ولكن اكثر من ال ١٠،٠٠٠ شخصاً تم معالجتهم. نادرا جدا: اقفل من ال ١٠٠٠٠٠ شخصاً تم معالجتهم ويتضمن هذا العدد الحالات المستفردة. قد تحدث شكوى من الجهاز المعدي المركزي مثل الاسهال، الامساك،الحرقه أو القيء، تتناسب وتيرة هذه الاعراض مع الجرعة. لم يلاحظ حدوث اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي، قد تظهر وفي حالات قليلة جداردات فعل حسسية. تسد يحدث ثورن غامق عديم الالم في البراز خلال المعالجة وهذا بالطبع ناتج عن الحديد. اما الثورن الرابع في الانسان وما حولها فهو نادر الحدوث. ارجو اعلام طبيبك او الصيدلاني لآية اعراض جانبية لم تذكر في هذه المذكرة.

ما هي ظروف التخزين اللازمة للفيرو سانول® جين؟

يجب تخزين الدواء بعيدا عن متناول الاطفال. يجب عدم استعمال الفيرو سانول® جين بعد تاريخ انتهائ الصلاحيه المذكور على الشريطو الغلاف الخارجي لعبوة الدواء، لا تحفظ الدواء على درجة حرارة اعلى من ٢٥ درجة مئوية.

تاريخ المعلومات: أبريل ٢٠٠٥

تعليمات بخصوص سحب الدواء من هذه الرزمة

للحصول على الكبسولة بسهولة اكبر من شريحة الرزمة، قم فقط وبعناية بالضغط على نهايتي الكبسولة. سيسمع هذا الامر ايضاً الحاق الضرر بالكبسولة ذاتها.

اسم المنتج	هو الفيرو سانول جين	المصادقة	التاريخ	التوقيع	الرسالة الرسمية الى شولتر تاريخ الشحن
رقم التعريف	١٠٠٥٠٠٥٠٠٤٠٥٢٠٠٤٠٠٤٠٥٢٠٠٤٠				عقد المصنع
الاعباد	١٤٠ × ٥٢			الزبون / INFB	
الاولان	شوارز			الإبراء	رقم بطاقة التعريف لعقد المصنع
اسم المشغل	فيزو دريك			الإبراء بعد التصميم	المصنع
تاريخ التخليق	٢٣ / ٩ / ٢٠٠٥			الاسم/الوظيفة	طباعة PDF
تأم بالتعديل	فيزو دريك (دورمان)			الاسترجاع بعد التسميم	ملاحظات
تاريخ التعديل	٦ / ١٢ / ٢٠٠٥			للمصادقة/مصادقة	
رقم الطبعة	٤			التوقيع	

ملفات المرجع على شكل PDF الرقمية المرسله شرعية من دون توزيع. تم ايداع النسخ الأصلية في داترة تكنولوجيا الرزم.

انتباه! تفصيـد جديد
ارجو قراءة الموضوع بعناية وبشكل ذاتي

شوارز للمستحضرات الصيدلانية

هذا هو الدواء <p>الدواء ومر المنتج الذي يؤثر على صحتك عند معاكسة التعليمات خطر عليك. <p>اتبع وبديانة متناهية وصفة الطبيب، طريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلاني الذي يبيع الدواء. <p>لا تقم من نقاء نمسك وثقف فترة المعالجة المرصوفة. <p>لا تقم بتكرار تناول الرزمة ذاتها من دون استشارة الطبيب. <p>لا تفرغ الدواء في متناول الاطفال <p>مجلس وزراء الصحة، العرب <p>الاتحاد العربي للصيادلة</p></p></p></p></p></p></p>
