

### وصفة "ستيميسين" من أجلك

لقد وصف لك طبيبك "ستيميسين" لأنه (لأنها) يعتبره (تعتبره) الطريقة الأنسب لعلاج حالة بشرتك. إن أخذ العلاج الصحيح هام جداً. واستخدام هذا المنتج بالطريقة الصحيحة هام جداً و الغرض من تلك النشرة هو مساعدتك على أن تحوز أفضل النتائج من الدواء. إن كان لديك أسئلة بخصوص حالتك أو بخصوص هذا العلاج فإن الصيدلي الذي فى منطقتك قد يفيدك فى هذا. فإن لم يكن عليك بالاتصال بطبيبك.

### ما أثر "ستيميسين"

"ستيميسين" هو محلول من المضاد الحيوي "إيريثروميسين". فإن له تأثير مباشر على البكتيريا التي لها علاقة بحب الشباب.

### كيفية استخدام هذا الدواء

يستخدم "ستيميسين" فقط على البشرة.

قبل استخدامك الزجاجة للمرة الأولى يجب عليك أن تفض السداد الداخلي. ولتفعل ذلك، انزع الغطاء من الزجاجة واجعلها قائمة ثم اضغط برفق على الحشوة بإصبعك حتى تسمع صوت "فرقة". عندئذ، فالمنتج يكون جاهزاً للاستخدام. قبل استعمال "ستيميسين" يجب عليك دائماً أن تغسل المنطقة المصابة بالصابون والماء وأن تنشئها بمنشفة.

لتستخدم "ستيميسين". أمل جانب الزجاجة ورجّ الضمادة على المنطقة المصابة. استخدم الضمادة لنشر المحلول برفق على كل المنطقة.

يحتوي "ستيميسين" على مكونات خاصة تساعد المضاد الحيوي على التوغل لأعمق فى تجاويف الشعر، جذر حب الشباب. وتلك المكونات تحفظ البشرة مبللة لبضعة دقائق بعد الاستعمال. اترك المنتج يجف تماماً قبل استخدام مساحيق التجميل. قد تلاحظ رائحة خفيفة أثناء جفاف المنتج. وهذا أمر عادي.

يوصى باستعمال "ستيميسين" مرتين يومياً صباحاً ومساءً. ليس هناك دلائل للاقتراح باستخدام المنتج أكثر من مرة يعطي نتائج أفضل.

العلاج الناجح لحب الشباب قد يستغرق أسابيع بل وحتى شهوراً لكنك ستلاحظ تحسناً تدريجياً بمرور الأسابيع. يجب عليك التحلي بالصبر فى الاستخدام اليومي حتى ينتهي حب الشباب؛ فإن توقفت مبكراً فإن حالتك قد تعود.

إن لم تجد بعد عدة أسابيع أى تحسنات أو إن ساءت حالتك فارجع إلى طبيبك للاستشارة.

### هل يمكن أن شيئاً ما يحدث خطأ ؟

أكثر من خمسة أعوام من الاستعمال الطبي لاقى فيها "ستيميسين" قبولاً حسناً. و برغم شعورك بدفء خفيف أو رؤيتك لقليل من الاحمرار عند أول استخدام، فعادة ما يزول هذا بعد بضعة أيام. ومن النادر أن يكون لبعض الناس حساسية من استخدام "ستيميسين"، فإن كنت كذلك فأوقف استخدامه وارجع إلى طبيبك.

إن كنت تعرف أنك شديد الحساسية لـ "إيريثروميسين" أو لأى من المكونات الأخرى فلا تستخدم "ستيميسين" وأخبر طبيبك. والحساسية لـ "إيريثروميسين" نادرة تماماً، حتى فى الناس شديدو الحساسية للمضادات الحيوية الأخرى، مثل البنسلين.

ليس لـ " " ستيמיسين " " أثر على فاعلية أقراص منع الحمل .

## احتياطات

- بصورة عامة ، يجد الناس أن " ستيميسين " سهل فى الاستعمال وأنه كورس علاجي غير ضار ، بالإضافة إلى تحسن حالة حب الشباب عندهم . تذكر على أية حال :
- يستخدم " ستيميسين " للجلد ( البشرة ) فقط . لا تشرب المحلول . تجنب ملامسته للعين والفم . فقد تجد لسعاً فى عينيك وتجد طعماً كريهاً إن دخل إلى فمك .
  - أرجع الغطاء مكانه بعد الاستخدام لمنع التطاير .
  - يحفظ هذا المنتج في درجة أقل من 25 مئوية وبعيداً عن متناول الأطفال .
  - لا تعطي من عبوتك لصديق لك أو لأحد أفراد أسرتك . فالطبيب يرى أنه مناسب لك ، لكنه ربما لا يناسبهم .
  - محلول " ستيميسين " قابل للالتهاب - فلا تستخدمه بالقرب من لهب مكشوف .
  - لا تستخدم زيوت أو كريمات لحب الشباب أثناء استخدام " ستيميسين " ما لم يحددها لك الطبيب .

## المكونات

إيريثروميسين Ph Eur 2% v/w . بروبيلين جليكول Ph Eur ، إيثانول BP . لوريث 4

تحتوي الزجاجة على 25 مليلتر " ستيميسين " من :

Stiefel Laboratories (UK) Ltd

Holtspur Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Bucks, HP10 0AU

Made by - Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

Sligo, Ireland, Finisklin Industrial Estate

THIS IS A MEDICAMENT	إن هذا الدواء
<p>Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.</li><li>• Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.</li><li>• Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.</li><li>• Keep all medicaments out of reach of children</li></ul>	<p>مستحضر يؤثر على صحتك ، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر . اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- الطبيب والصيدلي هما الخبيران فى الدواء وفى نفعه وضرره .</li><li>- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .</li><li>- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب .</li><li>- لا تترك الادوية فى متناول الأطفال .</li></ul>
<p>Council of Arab Health Ministers Union of Arab Pharmacists</p>	<p>مجلس وزراء الصحة العرب  واتحاد الصيادلة العرب</p>