

إيفتك
1/ قشدة مهبلية - بويضات
إيكونازول

التركيبية
القشدة المهبلية: 100 غرام من القشدة تحتوي على 1.0 غرام من نيترات الإيكونازول؛ السواغ: حمض البنزويك، شحم قاس، هيدروكسيانيزول الميويتيل، برفلين سائل، ستيرات النخيلات البوليأوكسيبابتيلنجليكول، ماء مكرر.
البويضات المهبلية: تحتوي كل بويضة مهبلية على 150 ملغرام من نيترات الإيكونازول؛ السواغ: غليسريد نصف صناعي.

تة الإستواء
مضاد للفطر يستعمل لمعالجة الإصابات الفرجية المهبلية حتى في الإصابات الشديدة الناتجة عن كائنات دقيقة إيجابية الغرام.

دواعي الإستعمال
الإصابات الفرجية المهبلية حتى في الإصابات الشديدة الناتجة عن كائنات دقيقة إيجابية الغرام.

التواهي عن الإستعمال
الحساسية الإفرادية المعروفة على مكونات المستحضر.

الاحتراسات
خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل يمكن استعمال هذا الدواء فقط في حال كان ذلك لازماً وبإشراف الطبيب.

التفاعل مع أدوية أخرى
لم تظهر الاختبارات السريرية ولا العلاج أو الإستعمال المكثف أي تضارب أو تفاعل مع أدوية أخرى.
من المستحسن إبلاغ الطبيب عن تناول أي دواء آخر في نفس الوقت الذي يتم فيه العلاج بهذا المستحضر.

تحذيرات خاصة
لا توجد آثار معلومة على التيقظ (قيادة السيارة أو العمل على الماكينات)

الجرعة وطريقة تناولها
القشدة المهبلية:

في المساء وقبل النوم ينبغي إدخال كل الكمية (حوالي 5 سم مكعب) الموجودة داخل أداة الإدخال في عمق المهبل وفيما المصاب في وضعية التسطح، وذلك كل يوم ولمدة 15 يوم. ينبغي متابعة العلاج حتى بعض زوال الحكاك والسيلان المهبلي الأبيض.
150 ملغ من البويضات المهبلية:

في المساء وقبل النوم ينبغي إدخال بويضة في المهبل وفيما المصاب في وضعية التسطح، وذلك لمدة 3 أيام. ينبغي معاودة العلاج في حال الانتكاسة أو عودة الإصابة أو في حال جاءت نتيجة الزرع إيجابية حتى بعد أسبوع من العلاج.

يستحسن معالجة الزوج بقشدة إيفتك المهبلية في نفس الوقت.
بعد الإستعمال جيداً بالماء الساخن ينبغي دهن القشدة على الجهاز التناسلي مرة واحدة في اليوم ولمدة 15 يوم.
(ملاحظة: إيفك لا يلوث الملابس الداخلية).

الجرعة المفرطة
لم يسبق أن تم الإعلام عن حصول جرعة مفرطة.

التأثيرات الجانبية
قد يتعرض المصابون بشدido الحساسية إلى بعض الإثارة أو التحسس الموضوعي، أو إلى غصص على مستوى الحوض أو طفق جلدي أو وجع رأس.
في هذه الحالات على الطبيب أن يأخذ بعين الإعتبار إمكانية وقف العلاج وإعتماد علاج آخر. في حال ظهرت بعض الآثار الجانبية مما لم يأت ذكره هنا ينبغي إبلاغ الأمر للطبيب.
لمزيد من المعلومات عن هذا المستحضر راجع الصيدلي.

تحذير
ينبغي عدم إستعمال الدواء بعد إنقضاء مدته المطبوعة على العبوة.

التخزين
ينبغي حفظ الدواء في مكان تقل حرارته عن 25 درجة مئوية.

التوضيب
1/ القشدة المهبلية: انبوب وزنه 78 غرام مع أداة لإدخال الدواء في المهبل
البويضات المهبلية: 3-6 بويضات وزن الواحدة منها 150 ملغرام

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

المصنع : شركة إيتالفارماكو - شارع فولفو تيستي 330- ميلان 20126- إيطاليا
مجموعة إيتالفارماكو - إيطاليا