

Ulcars® 1 g suspension buvable en sachet

sucralfate

sanofi aventis

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Sucralfate 1 g
Excipients : saccharine sodique, arôme caramel, arôme anis, parahydroxybenzoate de propyle sodique, parahydroxybenzoate de méthyle sodique, phosphate monosodique dihydraté, gomme xanthane, glycérol à 85 p. cent, eau purifiée q.s.p. un sachet.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION

Suspension buvable (boîte de 30 sachets).

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTI-ULCEREUX

(A : Appareil digestif et métabolisme).

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

sanofi-aventis france

1-13, Boulevard Romain Rolland

75014 Paris - FRANCE

Information médicale : N° vert 0 800 222 555

Appel depuis l'étranger : + 33 1 57 63 23 23

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Pharmatis

Zone d'Activités Est n° 1

60190 Estrées-Saint-Denis - FRANCE

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement de l'ulcère gastrique ou duodénal, et la prévention des rechutes de l'ulcère duodénal.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- chez les prématurés et les nouveau-nés non matures,

- en cas d'allergie connue à l'un des composants.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE SPECIALES

Quelques cas de bœzards (obstructions des voies digestives) ont été rapportés chez des patients hospitalisés en unités de soins intensifs, essentiellement en association avec une alimentation par sonde et chez des nouveau-nés, notamment les prématurés et les nouveau-nés non matures.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament **AVEC PRECAUTION** en cas de :

- insuffisance rénale chronique (défaillance des fonctions du rein),
- diminution du taux de phosphore dans le sang.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de se soumettre à une surveillance médicale régulière ; celle-ci peut comporter des examens de l'estomac : fibroscopie.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Le sucralfate peut diminuer l'effet de certains médicaments administrés simultanément. Il convient de prendre ce médicament à 2 heures de distance d'un autre médicament. **AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation du sucralfate pendant l'allaitement est déconseillée.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Parahydroxybenzoate de méthyle sodique et parahydroxybenzoate de propyle sodique.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

Cicatrisation de l'ulcère gastrique :

- 1 sachet 4 fois par jour soit :
 - 1 sachet une demi-heure à 1 heure avant chacun des 3 principaux repas,
 - 1 sachet au coucher, environ 2 heures après le repas du soir

Cicatrisation de l'ulcère duodénal :

Deux modalités de traitement sont possibles :

- 1 sachet 4 fois par jour soit :
 - 1 sachet une demi-heure à 1 heure avant chacun des 3 principaux repas,
 - 1 sachet au coucher, environ 2 heures après le repas du soir.

- 2 sachets matin et soir, soit :

- 2 sachets le matin au réveil, une demi-heure à 1 heure avant le petit déjeuner,
- 2 sachets le soir, environ 2 heures après le repas du soir.

Prévention des rechutes de l'ulcère duodénal :

Deux modalités de traitement sont possibles :

- 1 sachet 2 fois par jour soit :

- 1 sachet le matin au réveil, une demi-heure à 1 heure avant le petit déjeuner,
- 1 sachet le soir pris soit une demi-heure à 1 heure avant le repas, soit au coucher, environ 2 heures après le repas du soir.

- 2 sachets le soir, soit une demi-heure à 1 heure avant le repas, soit au coucher, environ 2 heures après le repas du soir.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Pour boire le contenu du sachet, ouvrir suivant le pointillé, puis presser le sachet en tenant son extrémité ouverte entre les lèvres.

DUREE DU TRAITEMENT

Cicatrisation des ulcères gastriques ou duodénaux : 4 à 6 semaines.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- constipation.
- rarement : sécheresse de la bouche, nausées, vomissements, éruptions cutanées, vertiges,
- en cas d'administration à fortes doses pendant longtemps, il existe un risque théorique de diminution du taux de phosphore dans le sang,
- quelques cas de bœzards (obstructions des voies digestives) ont été rapportés chez certains malades (cf. Mises en garde).

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Novembre 2005.

