

سيفاكور

سيمفلاستاتين

التركيب:

سيفاكور ١٠ مغ : كل قرص ملبس غشائياً يحتوي على ١٠ مغ من سيمفلاستاتين.

سيفاكور ٢٠ مغ : كل قرص ملبس غشائياً يحتوي على ٢٠ مغ من سيمفلاستاتين.

الخصائص:

سيفاكور هو سيمفلاستاتين مشتق من حامض الميفينيك، وهو مادة مضادة للدهون. سيمفلاستاتين هو دواء يثبط بصورة عكسية وتنافسية الإنزيم المختزل HMG-CoA (3-هايدروكسي-3-مثيل غلوتاريل-كوانزيم A) وهو إنزيم يحفز تحويل HMG-CoA إلى ميفالونيت وهي الخطوة التي تحدد تصنيع الكوليسترول. يخضع سيمفلاستاتين لعمليات استقلاب مكثفة في الكبد بعد تناوله عن طريق الفم وتصل نسبة صغيرة من الجرعة إلى الدورة الدموية. سيفاكور يقلل تركيز المواد التالية في بلازما الدم: الكوليسترول الكلي، الكوليسترول خفيف الكثافة للبروتين الشحمي (LDL) والكوليسترول شديد انخفاض الكثافة للبروتين الشحمي (VLDL). يعمل سيفاكور أيضاً إلى تقليل الترايغليسيريدات وزيادة تركيز الكوليسترول رفيع الكثافة البروتين الشحمي (HDL).

الاستطبابات:

يستخدم سيفاكور بالإضافة للحمية الغذائية من أجل تقليل المستويات المرتفعة للكوليسترول الكلي والكوليسترول خفيف كثافة البروتين الشحمي (LDL) لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ابتدائي في مستوى الكوليسترول في الدم وبالتحديد ارتفاع مستوى الليبوبروتين (البروتين الشحمي) في الدم نوع IIa و IIb (ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وارتفاع مستوى الترايغليسيريدات المتحدة في الدم)، إذا كانت الحمية الغذائية والإجراءات الأخرى غير كافية، في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين التاجية، أو الأشخاص المعرضين للإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية.

يعطى سيفاكور أيضاً لتقليل خطر الموت بسبب أمراض القلب والشرايين التاجية، مشاكل القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية، ولتقليل الحاجة لإجراء عمليات إعادة تكوين الأوعية الدموية التاجية وغير التاجية.

مضادات الاستطبابات:

فرط التحسس من السيمفلاستاتين، مرض الكبد الذي يؤدي إلى ارتفاعات ثابتة وغير معقدة في مستويات الخمائر ناقلة الأمين في الدم، الحمل والإرضاع.

الاحتياطات والمحاذير:

التأثير على الكبد: يوصى بإجراء اختبارات وظيفة الكبد قبل وبعد ٦ و ١٢ أسبوع من بدء العلاج أو زيادة الجرعة وبشكل دوري بعد ذلك. يجب أن يعطى اهتمام خاص للمرضى الذين يعانون من ارتفاع في مستويات الخمائر ناقلة الأمين في الدم.

التأثير على العضلات:

يجب أن يتم إيقاف العلاج بـ (سيفاكور) إذا حصل ارتفاع في مستويات الكرياتين كينيز (CK) أو إذا تم تشخيص اعتلال في العضلات.

استخدام الدواء عند الأطفال: لم يتم التأكد من أمان وفعالية الدواء عند الأطفال والمراهقين، لذلك لا يوصى باستخدام هذا العلاج في هاتين الفئتين من الأعمار في الوقت الراهن.

استخدام الدواء عند المسنين: إذا كان هناك دليل على وجود أو نشوء قصور كلوي شديد فإن تعديلاً مناسباً للجرعة يجب أن يتم القيام به ويجب أن تتم مراقبة المريض بشكل دقيق.

القصور الكلوي: يجب أن يعطى سيفاكور بحذر عند المرضى الذين يعانون من قصور كلوي شديد.

يجب أن يتم إيقاف العلاج بـ (سيفاكور) لبضعة أيام قبل أية عملية جراحية.

التفاعلات الدوائية:

يتم تمثيل سيمفاستاتين بواسطة الانزيم CYP3A4 ولكنه لا يملك فعالية مثبطة لهذا الانزيم، لذلك فمن غير المتوقع له أن يؤثر على تركيز الأدوية الأخرى في الدم التي يتم تمثيلها بواسطة CYP3A4
المثبطات القوية لـ (CYP3A4) تزيد من خطورة الإصابة باعتلال عضلي / انحلال عضلي من طريق تقليل طرح السيمفاستاتين المثبطات القوية لـ (CYP3A4) تتضمن ايتراكوتازول، كيتوكونازول، ارثيرومايسين، كلاريثرومايسين، تيليثرومايسين، مثبطات البروتياز لفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV)، ينغازدون، سايكلوسبورين، وكثيرات كثيرة من مصير الجريب فروت لذلك يجب تجنب تناول هذه الأدوية بشكل متزامن مع سيفاكور. تزداد خطورة الإصابة باعتلال العضلات عند تناول سيفاكور مع جيمفيبروزيل وإلى مدى أقل مع مجموعة الفيبرات الأخرى والنيلاسين (حامض النيكوتينيك) (١٠ غ يومياً). يزداد خطر الإصابة باعتلال العضلات / انحلال عضلي مخطط من طريق تناول المتزامن لـ (أميودارون) أو الفيراباميل مع جرعات عالية من سيمفاستاتين يقوم سيفاكور بتسريع بسيط للتأثير المضاد للتخثر لدواء الوارفارين.

يجب أن يتم تحديد مدة البروثرومين قبل البدء بالعلاج بالسيفاكور) في حالة المرضى الذين يتناولون مضادات التخثر كوارين. الاستخدام المتزامن للدواء مع الديجوكسين قد يؤدي إلى ارتفاع بسيط في تركيز الديجوكسين في الدم.

الآثار الجانبية:

تأثيرات بسيطة تشمل اضطرابات في القناة الهضمية مثل الإم بطنية، إسهال، وانتفاخ البطن. تأثيرات جانبية أقل شيوعاً كالصداع والتعب تم تسجيل التأثيرات الجانبية التالية بصورة متدرة: غثيان، تقيؤ، إسهال، ألم عضلي، ضعف عضلي، إيلام في العضلات، تساقط الشعر، التهاب البنكرياس، تنهّل، اعتلال عصبي طرفي، حكة، طفح جلدي، مشاكل في الكبد، دوام أو تعب ومن الممكن أيضاً حدوث تفاعل تحسسي بصورة متدرة.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

يجب وضع المريض على نظام غذائي ثابت لتقليل الكوليسترول قبل تناوله سيفاكور ويجب أن يستمر على هذا النظام الغذائي خلال فترة العلاج. الجرعة المعتادة التي يمكن البدء بها هي ١٠ مغ تعطى مرة واحدة يومياً في المساء. يجب تحديد الجرعة وفقاً للمستويات الأساسية للكوليسترول خفيف كثافة البروتين الشحمي (LDL) ووفقاً لأهداف العلاج واستجابة المريض إلى جرعة أقصاها ٨٠ مغ يومياً تعطى كجرعة مفردة في المساء. يجب أن يتم تعديل في الجرعات بفترات فاصلة تصل إلى ٤ أسابيع أو أكثر. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين التاجية أو الأشخاص المعرضين للإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية فإن الجرعة التي يمكن البدء بها يمكن أن تكون ٢٠ مغ مرة واحدة يومياً تؤخذ في المساء. إذا دعت الحاجة إلى تعديل في الجرعة فيجب أن يتم ذلك كما تم توضيحه أعلاه.

الجرعة الموصى بها للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم الوراثة المتجانس تكون ٤٠ مغ في اليوم تؤخذ مساءً أو ٨٠ مغ يومياً يتم تقسيمها إلى ثلاثة جرعات مكونة من ٢٠ مغ، ٢٠ مغ، و ٤٠ مغ مساءً. وفيها يجب استخدام سيفاكور كتنوع لعلاجات أخرى خافضة للدهون يجب أن يعطى سيفاكور بحذر عند المرضى الذين يعانون من قصور كلوي شديد، ويتم بدء العلاج بهذا الدواء تحت مراقبة شديدة وجرعة ٥ مغ يومياً. لا يكون تعديل الجرعة ضرورياً عند المرضى الذين يعانون من قصور كلوي بسيط إلى متوسط.

في حالة المرضى الذين يتناولون أدوية خافضة للمناعة بصورة متزامنة مع سيفاكور، فإن العلاج يجب أن يبدأ بجرعة ٥ مغ، ويجب أن لا تتجاوز الجرعة ١٠ مغ في اليوم الواحد.

إذا تم استخدام سيفاكور مع جيمفيبروزيل، فيجب أن لا تتجاوز جرعة سيفاكور ١٠مغ/يوم

في حالة المرضى الذين يتناولون أميودارون أو فيراباميل بصورة متزامنة مع سيفاكور، فيجب أن لا تتجاوز الجرعة ٢٠ مغ / يوم

الأشكال المتوفرة:

سيفاكور ١٠ مغ يتوفر في عبوة تحتوي على ١٠ و ٣٠ قرص ملبس غشائياً سيفاكور ٢٠ مغ يتوفر في عبوة تحتوي على ١٠ و ٣٠ قرص ملبس غشائياً

ان هذا دواء

- لا تتخذ الأدوية في متناول الأطفال.

- الدواء يستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه بخلاف التعليمات يعرضك للمخطر

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتوصف عليها وتعليمات الصيدلاني

الذي صرفها لك.

- ان الطبيب والصيدلاني هما اللذان يمان بالادوية ومنفعه وصرفه

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقا نفسك

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية

شركة الصناعات الدوائية المتطورة
ص ب ٩٢٥٤٨٢ عمان ١١١١ الأردن