

# Droxicef<sup>®</sup>

( Cefadroxil )

## **Information pharmacologique**

### **Mode d'action :**

**Droxicef<sup>®</sup>** (Cefadroxil) est un céphalosporine de la première génération avec une activité bactéricide. Il est bien absorbé par le tractus gastro-intestinal et est largement distribué dans le corps.

Auprès de 90% du médicament est excrété sous forme inchangée dans l'urine.

## **Information clinique**

### **Indications :**

**Droxicef<sup>®</sup>** (Cefadroxil) est indiqué dans le traitement des cas suivants :

- Infections du tractus urinaire causées par E.coli, P.mirabilis et les espèces de Klebsiella.
- Infections de la peau et de la structure de la peau causées par les Staphylocoques et /ou les Streptocoques.
- Infections du tractus respiratoire supérieur , otite moyenne, pharyngite, amygdalite causées par les Streptocoques pyogènes et /ou le Streptocoque pneumonie.
- Infection du tractus respiratoire inférieur.

## **Posologie et administration**

**Droxicef<sup>®</sup>** est un acide stable et peut être administré oralement sans prendre compte des repas. L'administration avec la nutrition peut aider dans la diminution du potentiel des plaintes gastro-intestinales occasionnellement associé à une thérapie avec céphalosporine orale.

### **Dose adulte habituelle :**

- Infections du tractus urinaire : 500 mg - 1 g chaque 12 heures, ou 1 - 2 g une fois par jour.
- Infections de la peau : 500 mg chaque 12 heures, ou 1g une fois par jour.
- Infections du tractus respiratoire supérieur et inférieur : Pour les infections moyennes : 500 mg chaque 12 heures. Pour les infections sévères : 500mg-1g chaque 12 heures.

**Dose pédiatrique habituelle:** 30 mg / Kg/ jour chaque 12 heures.

**Dose limite habituelle prescrite de l'adulte :** 4 g / jour.

**Dose limite habituelle prescrite de l'enfant :** jusqu'à 250 mg / Kg / jour.

## **Contre indications**

**Droxicef<sup>®</sup>** est contre indiqué chez les patients avec une allergie connue aux antibiotiques céphalosporines.

## **Précautions**

**Droxicef<sup>®</sup>** doit être utilisé avec précaution en présence de fonction rénale visiblement détériorée.

Grossesse et allaitement : Grossesse catégorie B. Ce médicament doit être utilisé durant la grossesse ou administré à la mère qui allaite si c'est clairement nécessaire.

## **Réactions inverses**

Durant ou après un traitement aux antibiotiques, des réactions réversibles moyennes ont été reportés inclus dyspepsie, nausée et vomissement, diarrhée, allergies (en forme d'éruption, urticaire, angioedème et prurit. Ces réactions se calment habituellement à l'arrêt du médicament.

## **Surdosage**

Si les quantités ingérées (chez l'enfant) dépassent 250 mg/Kg, une vidange gastrique doit être induite.

## **Information pharmaceutique**

### **Présentation :**

**Droxicef<sup>®</sup>** (60 ml) suspension : 250 mg de Cefadroxil (monohydrate) /5ml après reconstitution.

**Droxicef<sup>®</sup>** gélules : 500 mg de Cefadroxil (monohydrate)/gélule (boite de 12).

**Droxicef<sup>®</sup>** comprimés : 1000 mg de Cefadroxil (monohydrate) /comprimé pelliculé (boite de 10 comprimés).

**(Ceci est un médicament - maintenir hors de la portée des enfants)**

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions, vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi prescrit, ainsi que les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin, et votre pharmacien connaissent le médicament et ses contre-indications.
- Ne le reprenez pas sans l'avis de votre médecin.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.