

Isosorbide-5-mononitrate

La substance active du MONOCINQUE retard est l'isosorbide-5-mononitrate, un métabolite actif de l'isosorbide dinitrate, médicament largement employé pour le traitement de l'insuffisance coronarienne. Par rapport au dinitrate, le MONOCINQUE retard présente deux avantages: une meilleure disponibilité biologique après administration orale et une action plus prolongée dans le temps.

**INDICATIONS**

Traitement de maintien de l'insuffisance coronarienne, prophylaxie des attaques d'angina pectoris, traitement post-infarctus du myocarde, traitement de maintien de l'insuffisance chronique du myocarde, également associé avec des cardiotoniques et des diurétiques. La MONOCINQUE retard n'est pas indiqué pour contrôler les crises aiguës de sténocardie à cause de ses propriétés pharmacologiques.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité individuelle reconnue à l'isosorbide aussi bien mononitrate que dinitrate. La préparation ne doit pas être administrée au cours de la phase aiguë d'infarctus du myocarde, dans les cas d'insuffisance circulatoire aiguë (choc, collapsus circulatoire), de grave hypertension artérielle. En cas d'hypertension artérielle, la préparation doit être administrée uniquement sur prescription du médecin.

**EFFET SECONDAIRES**

Aux doses prescrites, aucun effet collatéral d'importance n'est apparu. Comme tous les dérivés nitrés, il peut engendrer des céphalées d'intensité et de durée assez variables, une vasodilatation cutanée avec rougeurs, des crises transitoires de vertiges et d'asthénie, une hypotension artérielle orthostatique, des manifestations cutanées, une dermatite axillaire.

De temps à autres, on peut rencontrer une forte sensibilité aux effets hypotensifs des dérivés nitrés, avec l'apparition, même aux doses thérapeutiques, de symptômes accentués comme nausée, vomissement, asthénies, agitation, pâleur, transpiration et collapsus. Lorsqu'apparaît un de ses effets collatéraux, appeler aussitôt le médecin traitant.

Chez les patients présentant une labilité circulatoire, des symptômes de collapsus peuvent se manifester lors de la première ingestion.

**AVERTISSEMENTS**

Utiliser avec précaution chez les patients atteints de glaucome.

Chez les femmes en état de grossesse, le produit doit être administré uniquement en cas de nécessité effective, sous contrôle direct du médecin. Le médicament peut agir comme antagoniste physiologique de la noradrénaline, l'acétylcholine, l'histamine et d'autres substances. Une accoutumance à la préparation peut apparaître, de même qu'une accoutumance croisée avec d'autres dérivés nitrés.

**S INTERACION MEDICAMENTOSAS ET INCOMPATIBILITE**

La consommation simultanée d'alcool peut augmenter les effets hypotensifs des dérivés nitrés et réduire les réflexes, par exemple, lorsqu'on conduit véhicule ou qu'on contrôle des appareillages.

A doses élevées, le MONOCINQUE retard peut renforcer l'action d'éventuelles autres préparations hypotensives, administrées en même temps.

**POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI**

Sauf prescription différente du médecin, la posologie est de 1 capsule de MONOCINQUE retard une seule fois par jour, le matin, à ingérer avec un peu de liquide, sans mâcher.

**PRESENTATION**

Boîte de 30 capsules. Chaque capsule contient: isosorbide-5-mononitrate mg 50.

Conservar hors de la portée des enfants.

Istituto  
LUSO FARMACO d'Italia S.p.A.  
Milano - Italy

