

LIPANTHYL® 160 mg,

comprimé pelliculé

Fénofibrate.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un hypolipidémiant/hypocholestérolémiant et hypotriglycéridémiant/fibrate.

Ce médicament est préconisé dans certaines hypercholestérolémies (*taux anormalement élevé de cholestérol dans le sang*) et/ou les hypertriglycéridémies (*augmentation des triglycérides - graisses - dans le sang*) de l'adulte, lorsqu'un régime adapté et assidu s'est avéré insuffisant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- insuffisance hépatique (trouble du fonctionnement du foie),
- insuffisance rénale (trouble du fonctionnement du rein),
- allergie connue au fénofibrate, à la lécithine de soja, à la cacahuète, à l'huile d'arachide ou à l'un des excipients de ce médicament,
- réactions connues de phototoxicité ou de photo-allergie (réactions cutanées lors d'une exposition au soleil ou à la lumière artificielle UV) pendant un traitement par le fénofibrate ou un médicament de structure apparentée, en particulier le kétoprofène (médicament anti-inflammatoire),
- calculs biliaires,
- pancréatites (inflammation du pancréas qui peut conduire à des douleurs abdominales) sauf si la pancréatite aiguë est due à un niveau élevé de certaines graisses dans le sang,

- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez,
- chez l'enfant.

Faites attention avec LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé :

- En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin traitant (cf. rubrique "Quels sont les effets indésirables éventuels").
- Un bilan hépatique sera pratiqué avant traitement et régulièrement pendant la première année de traitement (tous les 3 mois en moyenne).
- Le taux de la créatinine devra être surveillé pendant les trois premiers mois de traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladie métabolique rare).

Prise d'autres médicaments

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance, *notamment si vous prenez un autre médicament pour le cholestérol (fibrate ou statine), des anti-coagulants oraux ou de la ciclosporine.*

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

La prise de ce médicament est contre-indiquée chez la femme enceinte et durant l'allaitement, en l'absence de données.

En cas de découverte fortuite d'une grossesse alors que vous prenez ce médicament, il convient d'interrompre ce dernier. Consultez alors votre médecin traitant.

Informations importantes concernant certains composants de LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé

Liste des excipients à effet notoire : Lactose, lécithine de soja.

3. COMMENT PRENDRE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?

Chez les adultes et sujets âgés :

La posologie recommandée est d'un comprimé par jour.

Chez les insuffisants rénaux :

Une diminution de la posologie est recommandée (67 mg de fénofibrate micronisé en gélule ou 100 mg de fénofibrate standard en gélule).

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie orale.

Le traitement s'administre en 1 prise par jour.

Le comprimé est à avaler entier durant un repas.

En association avec un régime, ce médicament constitue un traitement symptomatique, devant être prolongé et régulièrement surveillé. Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de vous soumettre à une surveillance médicale régulière.

Si vous avez pris plus de LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- troubles digestifs gastriques ou intestinaux (douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée et flatulence),
- réactions cutanées (éruptions, démangeaisons) de type allergique ou réactions de photosensibilité (lors d'une exposition au soleil ou à la lumière artificielle) sur des parties du corps exposées au soleil ou aux lampes à UV.
- élévation transitoire des transaminases (*enzymes du foie*), jaunisse,
- douleurs musculaires,
Si vous ressentez des douleurs musculaires, une sensibilité musculaire douloureuse ou une faiblesse musculaire, contactez immédiatement votre médecin, car les problèmes musculaires peuvent être graves dans de rares cas.
- dans de rares cas : calculs biliaires, hépatite, impuissance, perte de cheveux, pneumopathies interstitielles,
- des augmentations du taux de créatinine et d'urée dans le sang, ainsi qu'une diminution du taux d'hémoglobine et du nombre de globules blancs peuvent être observées,
- pancréatites (inflammation du pancréas qui peut conduire à des douleurs abdominales),
- thrombose : embolie pulmonaire (caillot pouvant conduire à des douleurs dans la poitrine et à un essoufflement), thrombose veineuse profonde (caillot qui peut entraîner rougeur, douleur et gonflement d'une jambe).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température extérieure ne dépassant pas +30°C.

Ce médicament est sensible à l'humidité, à conserver dans l'emballage extérieur.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?

La substance active est :

Fénofibrate160,00 mg
Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

Laurilsulfate de sodium, lactose monohydraté, povidone, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, crospovidone, stéaryl fumarate de sodium.

Composition de l'enrobage : OPADRY® : alcool polyvinylique, dioxyde de titane (E171), talc, lécithine de soja, gomme xanthane.

Qu'est ce que LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîte de 30 ou 90 comprimés.

Titulaire

Laboratoires FOURNIER S.A.
28, boulevard Clemenceau
F 21000 Dijon

Exploitant

Abbott Products SAS
42, rue Rouget de Lisle
F 92150 Suresnes
Tél : +33 (0)1 46 25 85 00

Fabricant

RECIPHARM FONTAINE
Rue des Prés Potets
F 21121 Fontaine-lès-Dijon

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :

Allemagne (Lipidil Ter 160) ; Autriche (Lipanthyl Supra 160 mg) ; Belgique, Finlande, Luxembourg (Lipanthyl supra 160 mg) ; Irlande (Lipantil Supra 160 mg) ; Italie (Fenolib 160 mg) ; Espagne (Secalip Supra 160 mg) ; Portugal, Royaume-Uni (Supralip 160 mg).

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 30 juin 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).