هيموبرا ٤٠ ملغ سائل للحقن في حقنة مسبقة الملء

أداليوماب

إقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء باستعمال هذا الدواء، فهي تحتوي على معلومات هامة في أجلك.
- احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة ثانية.
- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، فاطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك أنت فقط. لاتعطه لآخرين، فقد يسبب لهم الأذى، حتى ولو كانت علامات مرضهم مشابهة لعلامات مرضك.
- إذا أصبت لك بآثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني. هذا يشمل أي تأثيرات جانبية ممكنة محددة في هذه النشرة (راجع قسم التأثيرات الجانبية الممكنة المحدودة).

في هذه النشرة

١- ما هو هيموبرا ولماذا يستعمل؟
٢- ما الذي يجب أن تعرفه قبل استعمال هيموبرا
٣- كيف تستعمل هيموبرا؟
٤- التأثيرات الجانبية الممكنة المحدودة
٥- كيف تحفظ ب هيموبرا
٦- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ما هو هيموبرا ولماذا يستعمل؟

يحتوي هيموبرا على المقاطع المضادة لأداليوماب.
هيموبرا دواء معدّ لعلاج الأمراض الالتهابية الموضوعة فيما يلي:
- إلتهاب المفاصل الروماتويدي
- إلتهاب المفاصل المتعدد الشباني مجهول السبب
- إلتهاب المفاصل الناجم عن التهاب نقاط الارتكاز
- إلتهاب الفقار المقسط
- إلتهاب المفاصل المقسط لمحوري غير المُراق بدليل شعاعي لإلتهاب الفقار المقسّط
- إلتهاب المفاصل الصدفي
- الصدفية
- إلتهاب القدم العرقية المفتّح
- داء كرون
- إلتهاب القولون القرحي
- إلتهاب القزحية الاندماجي الذي يؤثر على القسم الخلفي من العين

المادة الفعالة في هيموبرا، أداليوماب، عبارة عن جسم مضاد بشري أحادي النسيلة. الإسم المضاد وحيدة النسيلة هي بروتينات ترتبط بهدف معيّن.
هذا الأداليوماب هو بروتين يدعى عامل الخثر الورمي (TNFα)، الذي يشارك في العِهار المناعي (الدفاعي) وهو يوجد بمعدلات أكثر إرتفاعاً في الأمراض الالتهابية المذكورة أعلاه. عند إرتباطه بعامل النخر الورمي، يحد هيموبرا من العملية الالتهابية في هذه الأمراض.

إلتهاب المفاصل الروماتويدي

إلتهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض إلتهابي يصيب المفاصل.
يستعمل هيموبرا لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي عند البالغين. إذا كنت مصاباً بالشكل المتوسط أو الشديد من إلتهاب المفاصل الروماتويدي الفعّال، فقد يوصف لك في البداية تناول الأدوية الأخرى المعدّلة للمرض. مثل الميثوتركسات. إذا كان تجاوب حالتك مع هذه الأدوية غير كافٍ، فستعطى هيموبرا لعلاج حالة إلتهاب المفاصل الروماتويدي لديك.
من الممكن أيضاً وصف هيموبرا لمعالجة حالات إلتهاب المفاصل الروماتويدي الشديدة، الفعّالة والمتطورة، والتي لم يستجِ علاجها بالميثوتركسات.
أظهر هيموبرا قدرة على تأخير تطور الأضرار الغضروفية والعظمية والمتابعة عن الضرر الشعور بالتعب عن الفرض وعلى تحسين الوظيفة الجسدية.
يستعمل هيموبرا مع الميثوتركسات عادةً. إذا قرر طبيبك أن الميثوتركسات غير مناسب لك، فمن الممكن إعطاءك هيموبرا لوحده.

إلتهاب المفاصل المتعدد الشباني مجهول السبب و التهاب المفاصل الناجم عن التهاب نقاط الارتكاز

إلتهاب المفاصل المتعدد الشباني مجهول السبب و التهاب المفاصل الناجم عن التهاب نقاط الارتكاز هما مرضان التهابيان.
يستعمل هيموبرا لعلاج إلتهاب المفاصل المتعدد الشباني مجهول السبب عند الأطفال والمراهقين الذين يتراوح عمرهم بين ٢ و ١٧ سنة و إلتهاب المفاصل الناجم عن التهاب نقاط الارتكاز عند الأطفال بين ٦ و ١٧ سنة. من الممكن أن يوصف لك الدواء في البداية أدوية الأدوية المعدّلة للمرض. مثل الميثوتركسات. إذا كان تجاوب حالتك مع هذه الأدوية غير كافٍ، فستعطى هيموبرا لعلاج حالة إلتهاب المفاصل المتعدد الشباني مجهول السبب أو إلتهاب المفاصل الناجم عن التهاب نقاط الارتكاز لديك.
استشر طبيبك للحصول على مزيد من المعلومات.

إلتهاب المفاصل المقسط لمحوري غير المُراق بدليل شعاعي لإلتهاب الفقار المقسّط

إلتهاب المفاصل المقسط والتهاب المفاصل المقسّط لمحوري غير المُراق بدليل شعاعي لإلتهاب الفقار المقسّط، هما مرضان التهابيان يصيبان العمود الفقري.
يستعمل هيموبرا لعلاج إلتهاب المفاصل المقسط والتهاب المفاصل المقسّط لمحوري غير المُراق عند البالغين. ويستعمل هيموبرا لإلتهاب المفاصل المقسّط عند البالغين. إذا كنت مصاباً بإلتهاب الفقار المقسّط أو بإلتهاب المفاصل المقسّط المحوري غير المُراق بدليل شعاعي لإلتهاب الفقار المقسّط فستوصف لك في البداية أدوية أخرى. إذا لم تتجاوب حالتك مع هذه الأدوية جيدا يا كفي فستعطى هيموبرا لإنقاص أعراض وعلامات مرضك.

إلتهاب المفاصل الصدفي

إلتهاب المفاصل الصدفي هو حالة إلتهابية تصيب المفاصل وتترافق بالصدفية.
يستعمل هيموبرا لعلاج إلتهاب المفاصل الصدفي عند البالغين. إذا كنت مصاباً بالصدفية قدرة على إبطاء التغيرات الضغروفية والعظمية في المفاصل والتي تحدث بسبب هذا المرض وعلى تحسين الوظيفة الجسدية.

اللويحات الصدفية عند البالغين و الأطفال

اللويحات الصدفية هي حالة جلدية تسبب ظهور بقع حمراء رُقاقية، متقشرة، قاسية مغطاة بقشور فضية. يمكن للصدفية التوضحية أن تؤثر أيضاً على الأظافر، مسببة تقنتها، وتسكّها وتبتعادها عن فراش الظفر وهو ما قد يكون مؤلماً. يعتقد أن الصدفية تحدث بسبب مشكلة في الجهاز المناعي للجسم تؤدي إلى تشكيل إنتاج متزايد لخلايا الجلدية.
يستعمل هيموبرا لعلاج الحالات المتوسطة إلى الشديدة من اللويحات الصدفية عند البالغين. ويستعمل هيموبرا أيضاً لعلاج اللويحات الصدفية عند الأطفال والمراهقين الذين يتراوح عمرهم بين ٤ و ١٧ سنة والذين ثبت أن العلاج الموضعي أو العلاجات الضوئية لديهم لم ما يكن مجدياً أو أنه غير مناسب.
استشر طبيبك للحصول على مزيد من المعلومات.

إلتهاب العقدة العرقية المفتّح عند البالغين والمراهقين

إلتهاب العقدة العرقية المفتّح (والذي يسمى أحيانا الغدّ المعكوس) هو مرض جلدي التهابي مزمن وكثيرا ما يكون مؤلما. قد تشمل أعراضه عُقيدات مؤلمة (كتل) وخراجات (انداغات) يمكن أن يتسرب منها القيح. وهي أكثر ما تؤثر على مناطق عديدة من الجلد. مثل المنطقة تحت الثديين، منطقة الإربط، الوجه الداخلي للفخذ، المقعد والمقعدة. من الممكن أيضاً أن يحدث التندب في المناطق المصابة.
يستعمل هيموبرا لعلاج إلتهاب العقدة العرقية المفتّح عند البالغين والمراهقين بدءا من ١٦ عاما. يستطيع هيموبرا إنقاص عدد العقيدات والخراجات الموجودة لديك. والأهم الذي كثيرا ما يرافق المرض. ستوصف لك أدوية أخرى في البداية. إذا لم يكن تجاوبك مع هذه الأدوية جيدا يا كفي، فستعطى هيموبرا.

داء كرون عند البالغين والأطفال

داء كرون هو حالة إلتهابية تصيب الجهاز الهضمي.
يستعمل هيموبرا لعلاج داء كرون عند البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و ١٧ سنة. إذا كنت تعاني من داء كرون فستوصف لك في البداية أدوية أخرى. إذا لم يكن تجاوبك مع هذه الأدوية جيدا يا كفي، فستعطى هيموبرا لتخفيف أعراض وعلامات داء كرون الذي تعاني منه.
استشر طبيبك للحصول على مزيد من المعلومات.

إلتهاب القولون القرحي

إلتهاب القولون القرحي هو مرض التهابي يصيب الأمعاء الغليظة.
يستعمل هيموبرا لعلاج إلتهاب القولون القرحي عند البالغين. إذا كنت مصاباً بإلتهاب القولون القرحي فستوصف لك أدوية أخرى في البداية. إذا لم يكن تجاوبك مع هذه الأدوية جيدا يا كفي، فستعطى هيموبرا لتخفيف أعراض وعلامات مرضك.

إلتهاب القزحية الاندماجي الذي يؤثر على القسم الخلفي من العين

إلتهاب القزحية الاندماجي هو مرض التهابي يؤثر على أجزاء معينة من العين.
يستعمل هيموبرا لعلاج
- البالغين المصابين بإلتهاب القزحية الاندماجي الذي يترافق بإلتهاب يؤثر على القسم الخلفي من العين.
- الأطفال ابتداء من عمر السنتين المصابون بإلتهاب العينية الاندماجي المزمن الطفولي المترافق بإلتهاب يؤثر على القسم الأمامي من العين.

قد يؤدي هذا الالتهاب إلى تراجع الرؤية و / أو وجود جسيمات طافية في العين (نقاط سوداء أو خيوط تتحرك في الساحة البصرية). يعمل هيموبرا عن طريق إنقاص الالتهاب.
استشر طبيبك للحصول على مزيد من المعلومات.

ما الذي يجب أن تعرفه قبل استعمال هيموبرا

لاتستعمل هيموبرا:
- إذا كنت مصاباً بالحساسية تجاه أداليوماب أو أي من مكونات الدواء الأخرى (المذكورة في قسم محتويات العبوة ومعلومات أخرى).
- إذا كنت مصاباً بحالة عدوى شديدة، بما فيها حالة السل الفعّال، (راجع "تحذيرات واحتياطات"). من الممكن أيضاً أن تعطى طبيبك إذا ظهرت لديك علامات عدوى كالرشفة الحمراء، الحروح، الشعور بالتعب، أو مشاكل الأسنان.
- إذا كنت تعاني من قصور القلب المتوسط أو الشديد. من المهم جداً أن تبلغ طبيبك إذا عانيت في السابق أو كنت تعاني حالياً من مشاكل شديدة في القلب (راجع "تحذيرات واحتياطات").

تحذيرات واحتياطات
تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال هيموبرا
- إذا أصبت بإلتهابات تحسسية مصحوبة بأعراض مثل ضيق الصدر، صفير الصدر، شعور بالدوخة، تورم أو ظهور طفح جلدي، توقف عن حقن المزيد من هيموبرا واتصل بطبيبك على الفور لأن هذه التفاعلات، في حالات نادرة، قد تكون مميتة للحياة.
- إذا كنت مصاباً بحالة عدوى، سواء أكانت عدوى طويلة الأمد أو عدوى موضعية (مثل فراق الساق)، فاستشر طبيبك قبل البدء باستعمال هيموبرا. وإذا كنت غير متأكد، فاراجع أن تتأكد طبيبك.
- قد تصبح إصابتك بالعدوى أسهل أثناء استعمال هيموبرا. وتزداد هذه الخطورة في حال إصابة الوظيفة الرئوية. هذه الإصابات قد تكون خطيرة وقد تشمل الحالات الأخرى الناجمة عن الفيروسات، الفطريات، الطفيليات أو الجراثيم أو غيرها من حالات العدوى الانتهازية والإنتان التي قد تكون في حالات نادرة، مهددة للحياة. من المهم إبلاغ طبيبك إذا ظهرت لديك أعراض مثل إرتفاع الحرارة، الجروح، الشعور بالتعب أو مشاكل الأسنان. قد يوصيك الطبيب بالتوقف مؤقتا عن استعمال هيموبرا.
- نظرا لإبقائي عن حدوث حالات السل لدى المرضى الذين يتعالجون ب هيموبرا، فسيحث الطبيب عن علامات وأعراض السل فيه. بالعلاج، هذا سيضمن إجراء فحوص كاملة تتضمن تاريخك الصحي واختبارات المسح المناسبة (مثل صورة الصدر الشعاعية واختبار التوبركولين). من المهم جداً أن تبلغ طبيبك إذا كنت قد أصبت في السابق بالسل أو إذا كنت على اتصال وثيق بأي شخص كان قد أصيب به. قد تحدث الإصابة بالسل أثناء العلاج حتى وإن كنت قد تلقيت علاجا وقائيا من السل. إذا ظهرت أعراض السل عليك (سعال مستمر، نقص الوزن، الحرارة، حرارة متوسطة الارتفاع)، أو إذا ظهرت لي عدوى أخرى أثناء فترة العلاج أو بعدها، فاراجع إبلاغ طبيبك على الفور.
- أخبر طبيبك إذا كنت تعيش في منطقة تستوطن فيها الأمراض الفطرية مثل داء النوسجات (histoplasmosis) أو الفطار الكوكوي (coccidioidomycosis) أو الفطار الريمي (blastomycosis) أو تسافر إليها.
- أخبر طبيبك إذا تعرضت لعدوى متكررة أو أي مشاكل صحية أخرى ترفع من إمكانية حدوث العدوى.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملا لفيروس إلتهاب الكبد الإنتاني B. إذا كنت مصاباً بحالة فعّالة منه أو إذا كنت تعتقد أنك معرض لخطر الإصابة به يجب أن يطلب طبيبك إجراء فحص لكشف الكبد الإنتاني B. قد يتسبب استعمال هيموبرا لعدوى إعادة نشيط فيروس الكبد الإنتاني B لدى الفرض الحاملين إياه الذين يتعالجون في بعض الحالات النادرة، وخاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى مثبطة للجهاز المناعي. قد يكون تنشيط فيروس إلتهاب الكبد الإنتاني B مميتا للحياة.
- إذا كنت قد تجاوزت الخامسة والستين بعد الصيف، فقد تكون أكثر عرضة لإصابة بالعدوى أثناء العلاج ب هيموبرا. من المهم أن تبلغ طبيبك إذا ظهرت لديك علامات عدوى أثناء فترة العلاج ب هيموبرا. من المهم أن تبلغ طبيبك إذا ظهرت علامات عدوى مثل