

لينثيل 200 م

محول إلى مسحوق مستعلق فينوفبرات

وصف الدواء

الاسم

لينثيل 200 محوّل إلى مسحوق مستعلق، كبسولات، فينوفبرات

التركيب للكبسولة الواحدة

فينوفبرات (INN) : 200 ملغم.

سولفات لوريل الصوديوم، لاكتوز، نشاء الذرة ما قبل الجيلاتين، كروسوفيدون، ستيرات المغنسيوم.

غلاف الكبسولة: جيلاتين، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، أكسيد الحديد (E172)، إيرثروسين (E127).

الشكل الصيدلي

كبسولة صلبة.

التصنيف الدوائي العلاجي

هذا الدواء يؤدي إلى تخفيض الدهون في الدم / مانع إنتاج الكوليسترول والتريجليسرايد في الدم/ فيبرات.

الشركة المصنعة

RECIPHARM FONTAINE

شارع دي بري بوتييه - 21121 فونتين لي ديجون - فرنسا

الاستعمالات العلاجية

يستعمل هذا الدواء من أجل تخفيض الدهون في الدم (في حالة الارتفاع غير العادي لمعدل الكوليسترول في الدم) و/أو (في حالات الارتفاع غير العادي لمعدل التريجليسريد - الدهون - في الدم) لدى البالغين عندما تكون الحمية المتبعة غير كافية.

تحذيرات!

الحالات التي لا يستعمل بها هذا الدواء

لا يستعمل هذا الدواء في الحالات التالية:

- قصور في وظائف الكبد،
- قصور في وظائف الكلى،
- لدى الأطفال،
- حساسية معروفة تجاه الفينوفبرات أو إحدى مكوناته،
- التفاعلات الضوئية المؤذية أو التحسسية (تفاعلات الجلد بعد التعرض للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية) خلال العلاج بالفينوفبرات أو بالمواد المرتبطة بها بنائياً، بشكل خاص كيتويرفين (دواء مضاد للالتهاب)

تحذيرات خاصة

- في حالة الآلام العضلية يجب استشارة الطبيب فوراً (يرجى مراجعة «الأعراض المرعبة وغير المرغوب فيها»).
- يجب إجراء اختبارات الكبد قبل بدء العلاج وتكرار بانتظام خلال السنة الأولى من العلاج.
- بسبب وجود اللاكتوز يجب عدم استخدام هذا المستحضر في حالات الجلاكتوزيا الوراثية ومتلازمة سوء امتصاص الجلوكوز و/أو الجلاكتوز أو مرض نقص أنزيم اللاكتيز (مرض أبيض نادر).

هذا دواء

إن هذا الدواء هو عبارة عن مستحضر يؤثر على صحتك واستعماله خلافاً للتعليمات يشكل خطراً عليك.

- اتبع وصفة الطبيب بدقة وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلاني الذي باع لك الدواء.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا تقطع فترة العلاج الموصوف من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة طبيبك.
- إحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب - اتحاد الصيدالة العرب.

احتياطات الاستعمال

إن تناول هذا الدواء لا يفنيك عن المشاركة على نظام الحمية المتبع؛ بل أن المواظبة عليه ضرورية دائماً. يجب القيام بتحليل للدم بشكل منتظم.

تفاعلات الأدوية والتفاعلات أخرى

لتفادي التداخلات الناتجة عند أخذ أدوية مختلفة في نفس الوقت يجب دائماً وبشكل فوري إبلاغ الطبيب عن الأعراض غير العادية الناتجة عن تناول هذا الدواء، بالأخص عند تناول مسيل للدم أو دواء آخر للكوليسترول (نوع آخر من الفيبرات أو الستاتين).

الحمل والرضاعة

ينصح بعدم تناول هذا الدواء من قبل المرأة الحامل. وفي حال اكتشاف الحمل يجب عدم متابعة تناول الدواء واستشارة الطبيب المعالج.

نظراً لعدم توفر أي معلومات حول مدى مرور هذا الدواء إلى حليب الأم، لا ينصح باستعمال هذا الدواء خلال الرضاعة.

كيفية استعمال الدواء

الجرعة

كبسولة واحدة في اليوم.

وفي جميع الحالات يجب اتباع وصفة الطبيب.

أسلوب وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم.

تواتر وتوقيت الاستعمال

يؤخذ هذا الدواء مرة واحدة في اليوم أثناء الأكل وحسب وصفة الطبيب.

مدة العلاج

إضافة إلى نظام الحمية، يعتبر هذا الدواء علاجاً طويلاً المدى للأعراض ويجب الاستمرار فيه ومراقبته بانتظام.

للتأكد من الاستخدام الجيد لهذا الدواء من الضروري خضوعكم لمراقبة طبية منتظمة.

الأعراض المرعبة وغير المرغوب فيها

ككل دواء فعال، قد يؤدي هذا الدواء لدى بعض الأشخاص إلى ظهور أعراض جانبية متفاوتة الأثر:

هذه الحالات قليلة وغير خطيرة:

- اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل صعوبات الهضم،
- ظهور حساسية أو تحسس للضوء على مستوى الجلد مثل التهيج أو الحكة (خلال التعرض للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية). في بعض الحالات وحتى بعد الاستعمال لعدة شهور بدون مضاعفات فقد تظهر تفاعلات جلدية في المناطق المعرضة للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية (مصابع محاكاة التعرض للشمس)،
- ارتفاع عابر في كمية ترانز أمينيز (أنزيمات الكبد)،
- حصة صفراوية،
- اعتلال رئوي،
- آلام عضلية (ارتفاع الأنزيمات العضلية في بعض الأحيان).

إذا شعرت بأي ألم في العضلات أو حساسية عضلية مؤلمة أو ضعف في العضلات، اتصل بطبيبك فوراً لأن الاضطرابات العضلية قد تكون خطرة في بعض الحالات النادرة.

قم بإبلاغ الطبيب أو الصيدلاني بأي أعراض مرعبة أو غير مرغوب فيها ولم يتم ذكرها في هذه الوصفة.

حفظ الدواء

يجب أن لا يستعمل الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المذكور على العبوة الخارجية.

الاحتياطات الخاصة لحفظ الدواء

يحفظ الدواء في مكان جاف، تحت درجة 30 د.م.

تاريخ مراجعة النشرة

فبراير 2010