

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء بتناول علاجك. تعطيك هذه النشرة بعض المعلومات المفيدة عن علاجك. اذا كان لديك بعض الاسئلة عن اي شيء، فالرجاء ان تستشير طبيبك او الصيدلي (الكيميائي).
تذكر:

هذا المستحضر هو لك. لا تعطه لأي شخص آخر. فقد تؤذيته حتى ولو كانت اعراض مرضه شبيهة بأعراض مرضك.
ما هو علاجك:

اسم علاجك هو اقراص دتروسيترول (Detrusitol). وكل قرص يحتوي على ١ ملليغرام او ٢ ملليغرام من المادة الفعالة تلتيرودين ل - تارتترات (مما يعادل ٠.٦٨ ملليغرام او ١.٣٧ ملليغرام من تلتيرودين).

تحتوي الاقراص ايضاً على العناصر غير الفعالة التالية: سيللولوز بذرات دقيقة جداً، كالسيوم هيدروجين فسفات ثنائي الماء، صوديوم ستارش غليكولات، مغنيزيوم ستيرات، سليكا غروية غير مميّهة، هيروميللوز، حمض الستياريك، ثاني او أكسيد التيتانيوم (E171).

اقراص دتروسيترول (Detrusitol) ١ ملغ بيضاء ومؤشر عليها بقوسين فوق وتحت الحرفين TO.

اقراص دتروسيترول (Detrusitol) ٢ ملغ بيضاء ومؤشر عليها بقوسين فوق وتحت الحرفين DT.

يتوفر علاجك في العبوات التالية:

عبوة تحتوي على ٢٨ قرصاً بشرائط صلبة (شريطين في كل منهما ١٤ قرصاً)، وعبوة تحتوي على ٥٦ قرصاً بشرائط صلبة (اربعة شرائط في كل منها ١٤ قرصاً)، وعبوة تحتوي على ٦٠ قرصاً.
من يصنع علاجك:

يصنع مستحضر دتروسيترول (Detrusitol) من قبل:

Pharmacia & Upjohn SPA, Marino Del Tronto, Ascoli Piceno, Italy.

كيف يؤدي مستحضر دتروسيترول (Detrusitol) مفعوله:

يساعد دتروسيترول (Detrusitol) في تسوية فعالية الكلى. وهذا يساعدها على احتباس مقدار اكثر من البول مما يطيل المسافة الزمنية للمريض قبل الذهاب للمرحاض للتبول.
لماذا يستعمل هذا المستحضر:

يوصف مستحضر دتروسيترول (Detrusitol) لمعالجة اعراض الحالات غير المستقرة لوظائف الكلى، مثل الحاجة للاندفاع بسرعة للذهاب للمرحاض دون سابق انذار، او الحاجة للذهاب للمرحاض تكراراً، او تبلل الثياب بسبب عدم استطاعة المريض للوصول الى المرحاض في الوقت اللازم.

قبل تناول المستحضر:

عليك ان تخبر طبيبك في الحالات التالية:

الحمل، او الشك في حصول الحمل، او عند الهدف بحصول الحمل

ترضيع الطفل من الثدي.

اذا سبق ظهور اعراض معاكسة عند استعمالك تلتيرودين او اي عنصر اخر موجود في هذا المستحضر.

الغلوكوما (ازدياد الضغط في العينين، والفقدان التدريجي للنظر).

الوهن العضلي الوبيل (مرض يسبب تعباً وضعفاً غير طبيعيين في بعض العضلات. اعراضه تشمل تدلي الجفون العليا للعينين، النظر المزدوج، التعبير الشاحب في الوجه، والتكلم غير واضح اللفظ).

صعوبة التبول ودفق ضعيف للبول.

الاضطرابات المعدية المعوية الانسدادية التي تعيق مرور الطعام وهضمه - سوف يخبرك طبيبك اذا كنت مصاباً بهذه الاضطرابات.

اذا كنت تعاني من فتق جوي (اندفاع المعدة الى القفص الصدري)، قد تشعر بالحرقرة التي تزداد عند الانحناء او الاضطجاع.

اذا كنت مصاباً بمرض كبدي او كلوي.

اذا كنت تتناول اي عقار كالمهدئات، او مخفضات ضغط الدم، او المريبات (انتيبوتيك)

من فصيلة مأكرونيدي (ايرثروميسين و كلاريثروميسين)، او مضادات الفطر

(كيتوكونازول، اترافونازول و ميكرونازول)، لأن هذه المواد قد تغير فعالية مستحضر

دتروسيترول (Detrusitol) -- --

إذا كنت تشكو من التهاب القولون التقرحي الحاد، أو تمدد أو تضخم القولون السمي - سوف يخبرك طبيبك إذا كنت مصاباً بإحدى هذه الحالات إذا كنت تشكو من الاعتلال العصبي الاستقلابي مما يجعلك تشعر بالتنميل، أو الوخز، أو الألم، أو ضعف العضلات.

كيف يجب عليك ان تستعمل الدواء:

لل كبار والسنين: الجرعة العادية ٢ ملغم مرتان يومياً قد يخفف طبيبك مقدار الجرعة إذا كنت تشكو من مشاكل في الكبد. سيرشدك طبيبك عن عدد الاقراص اللازمة يومياً وعدد تكرار الجرعات.

لا بوصف مستحضر دتروسيبتول (Detrusitol) للأطفال.

ما هي الفترة الزمنية لاستعمال علاجك:

سيرشدك طبيبك عن امتداد فترة المعالجة. عليك ان تكمل المعالجة بالاقراص، لأنك قد لا تشعر بتأثير عاجل للعلاج إذا ان المانة تحتاج الى فترة من الزمن لتتكيف مع العقار. إذا لم تشعر بأي تحسن بعد اكمال المعالجة عليك ان تحت هذا الامر مع طبيبك.

ماذا يجب عليك ان تفعل إذا نسيت ان تتناول اقرصك:

إذا نسيت ان تتناول الجرعة الموصوفة لك من الاقراص، استعض عنها بتناولها حالاً تتذكر، إلا إذا حان وقت، تناول الجرعة التالية. لا تأخذ أكثر من جرعة واحدة في نفس الوقت. استمر بتناول اقرصك حسب التعليمات المذكورة على لصاقة العبوة.

ماذا يحدث لو تناولت العديد من الاقراص:

لا يجوز مطلقاً ان تتناول عدداً من الاقراص يزيد عما وصفه لك طبيبك. إذا ابتلعت اقرصاً عديدة خطأ اتصل فوراً بطبيبك أو بأية مؤسسة أخرى خبيرة بهذا الشأن.

هل يؤدي استعمال مستحضر دتروسيبتول (Detrusitol) لظهور ردود فعل معاكسة: بالمقارنة للعقاقير الأخرى هذا المستحضر قد يسبب أحياناً ردود فعل معاكسة عند القليل من البشر. قد يؤدي استعمال المستحضر للأمور التالية:

الردود العادية:

- جفاف الفم

- الأكتام، الألم البطني، ريح البطن، التقيؤ، الحرقه.

- الصداع.

- جفاف الجلد

- النقص في انتاج الدموع (العين الجافة القابلة للتهيج).

- اضطراب النوم، العصبية.

- الاحساس غير الطبيعي بالنخز، كالوخز بالابر.

الردود النادرة:

- غشاوة البصر.

- الألم في الصدر.

الردود المألوفة:

- الحساسية مثل الطفح مع الحكاك.

- صعوبة التبول

- الارتباك.

إذا كانت اي من هذه الاعراض تعتبر مشكلة لك، أو إذا كنت تعاني من اي ردود فعل أخرى غير مرغوبة أثناء تناول هذا المستحضر، الرجاء ان تراجع طبيبك أو الصيدلي. العناية المطلوبة لعلاجك.

لا تستعمل علاجك بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكورة على العلبة وعلى اللصاقة احفظ كافة الادوية بعيداً عن متناول ايدي الاطفال. علاجك قد يضر بهم.

أعد ما تبقى من علاجك غير المستعمل للصيدلي لطرحه في النفايات.

معلومات اضافية:

ماذا تستطيع ايضاً فعله:

تدريب المثانة: هذا الامر يساعدك على استرجاع التحكم في مثانتك حتى تستطيع اطالة الفترة الزمنية قبل التبول. بوسعك ان تفعل ذلك باحتباس البول لاطول فترة ممكنة قبل الذهاب للمرحاض للتبول

التمارين الارضية على الحوض: هذه تقوي العضلات التي تساعدك على احتباس البول لمدة اطول قبل التبول. كما تساعدك على تقادي تسرب البول أثناء السعال أو الضحك أو العطس

إذا اردت الحصول على معلومات مفصلة عن هذه الامور. راجع طبيبك.

اعتدت هذه النشرة بتاريخ ١٦ نيسان (ابريل) ١٩٩٨.