INDOCID® إندوسيد

كبسولات / تحاميل (إندومِتاسين)

المعادلة الكيميائية الإجمالية

يمكن أن تزيد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية من خطر تفجر المريض لعوارض قلبية وعائية خثارية خطيرة، والتي قد تؤدي إلى الاحتشاء والسكتة الدماغية، مما قد يسبب الوفاة. ويمكن أن يزيد الخطر مع فترة الاستعمال. وقد يعاني المرضى الذين لديهم أمراض قلبية وعائية أو عوامل خطر قلبية وعائية أو المرضى الذين لديهم عوامل خطر كثيرة لحدوث أمراض قلبية وعائية من خطر أكبر أثناء فترة العلاج.

تجنب استعمال إندوسيد لعلاج الألم المرافق لعملية جراحة القلب والأوعية الدموية. وتجنب استعمال إندوسيد لعلاج الألم المرافق لعملية جراحة المجاري البولية والتناسلية (راجع فقرة التحذيرات).

الحمض النووي الريبوزي المنقوص الأكسجين

تزيد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مخاطر الإصابة بالأحداث الخثارية المحاذية لمنطقة الجراحة، خاصة في المرضى الذين لديهم أو لمن يمتلكون عوامل خطر قلبية وعائية. ويمكن أن تحمل هذه الأحداث في أن تكون مميتة. وقد يكون الخطر أعلى خلال الأسابيع الأولى من العلاج. ويجب تجنب استعمال إندوسيد لعلاج الألم المرافق لعملية جراحة المجاري البولية والتناسلية (راجع فقرة التحذيرات).

الحمض النووي الريبوزي

تزيد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مخاطر الإصابة بالأحداث الخثارية المحاذية لمنطقة الجراحة، خاصة في المرضى الذين لديهم أو لمن يمتلكون عوامل خطر قلبية وعائية. ويمكن أن تحمل هذه الأحداث في أن تكون مميتة. وقد يكون الخطر أعلى خلال الأسابيع الأولى من العلاج. ويجب تجنب استعمال إندوسيد لعلاج الألم المرافق لعملية جراحة القلب والأوعية الدموية. وتجنب استعمال إندوسيد لعلاج الألم المرافق لعملية جراحة المجاري البولية والتناسلية (راجع فقرة التحذيرات).

الحمض النووي الريبوزي المنقوص الأكسجين

تزيد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية من خطر تفجر المريض لعوارض قلبية وعائية خثارية خطيرة، والتي قد تؤدي إلى الاحتشاء والسكتة الدماغية، مما قد يسبب الوفاة. ويمكن أن يزيد الخطر مع فترة الاستعمال. وقد يعاني المرضى الذين لديهم أمراض قلبية وعائية أو عوامل خطر قلبية وعائية من خطر أكبر أثناء فترة العلاج. وتجنب استعمال إندوسيد لعلاج الألم المرافق لعملية جراحة القلب والأوعية الدموية. وتجنب استعمال إندوسيد لعلاج الألم المرافق لعملية جراحة المجاري البولية والتناسلية (راجع فقرة التحذيرات).

الحمض النووي الريبوزي المنقوص الأكسجين

تزيد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية من خطر تفجر المريض لعوارض قلبية وعائية خثارية خطيرة، والتي قد تؤدي إلى الاحتشاء والسكتة الدماغية، مما قد يسبب الوفاة. ويمكن أن يزيد الخطر مع فترة الاستعمال. وقد يعاني المرضى الذين لديهم أمراض قلبية وعائية أو عوامل خطر قلبية وعائية من خطر أكبر أثناء فترة العلاج