

# «TENIADEX»

- Composition** : 5 - chloro - N - (2' - chloro - 4' - ni - trophenyl) salicylamide.
- Indication** : Taenia saginata (boeuf). Taenia solium (porc.). Diphyllbothrium latum (poisson), H. nana
- Mode d'emploi** : Mastiquer les comprimés complètement et les avaler avec un peu d'eau. Pour les jeunes enfants, pulvériser les comprimés finement.
- Posologie** : Les comprimés sont pris après un léger petit déjeuner. La veille au soir, n'absorber que des liquides non alcoolisés (jus de fruits).  
L'alcool est défendu durant le traitement.

1) T. saginata. T. solium, D. latum: une seule dose suffit.

Adultes et enfants de plus de 6 ans : 4 comprimés  
Enfants de 2 à 6 ans : 2 comprimés  
Enfants de moins de 2 ans : 1 comprimé

Une purge prise 2 heures plus tard assure une complète expulsion du Taenia. Sans la purgation, le Taenia sera rejeté en fragments les jours suivants.

2) H. nana Traitement sur 7 jours

Premier jour:

Adultes et enfants de plus de 6 ans : 4 comprimés  
Enfants de 2 à 6 ans : 2 comprimés  
Enfants de moins de 2 ans : 1 comprimé

Les 6 jours suivants :

Adultes et enfants de plus de 6 ans : 2 comprimés  
Enfants de 2 à 6 ans : 2 comprimés  
Enfants de moins de 2 ans : ½ comprimé

**Présentation** : Boîtes de 4 comprimés dosés à 0,5g



**PHARMADEX S.A.L.**  
**KAHALE - LIBAN**