الفصل 3: أب الفكرة

> الرجاء قراءة هذه الكتيبة بدقة قبل تناول الدواء.
> احتفظ بهذه الكتيبة لعلك تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
> إذا كانت لديك أسئلة أخرى يجب أن تسألها الطبيب أو الصيدلاني المؤهل طبيا.
> إذا ما أصابك أحد الأعراض الجانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني المؤهل طبيا. وينطبق هذا على أي أعراض جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.
> يجب عليك دائما تناول هذا الدواء بالضبط كما وصفه لك الطبيب أو الصيدلاني المؤهل طبيا. فلا تغير الجرعة التي وصفت لك من تلقاء نفسك، ولا تتوقف عن تناول الدواء قبل أن يطلب منك ذلك الطبيب أو الصيدلاني المؤهل طبيا.

الاسم التجاري: بنزوفيزاكس 500 ملغ/5 مل، محلول فموي للأطفال (عبوة 100 مل)

المكون الفعال: بنزوفيزاكس ..... 500 ملغ

المكونات غير الفعالة: ..... 200 مل

بالإضافة إلى: ..... 5 مل ..... إلى 100 مل

الشكل الصيدلاني: محلول فموي، أزرق سكري، برائحة توت العليق

الشركة المصنعة:

المستودع: 31-F-22790 شارع سيلفيرفيو الصناعي، مدينة برونتو، مقاطعة الغيوم، 10218، مملكة الكاريبيوم

الشركة المسجلة:

الرقم التسلسلي: 9000 زجاجة، 5 مل في كل زجاجة، صالحة لمدة 24 شهرًا

تاريخ التصنيع: 14 مارس 2024

تاريخ انتهاء الصلاحية: 14 مارس 2026

تاريخ الإصدار: 1 أبريل 2024

الرقم التسلسلي للدفعة: BZ-2024-0314

تاريخ الإصدار: 1 أبريل 2024

تاريخ انتهاء الصلاحية: 31 مارس 2026

تعليمات التخزين: يحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، في درجة حرارة تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية.

تحذير: يحتوي على الكحول.

تحذير: يحتوي على السكر.

تحذير: يحتوي على الأسبارتام.

تحذير: يحتوي على الصوديوم.

تحذير: يحتوي على البوتاسيوم.

تحذير: يحتوي على الكالسيوم.

تحذير: يحتوي على الحديد.

تحذير: يحتوي على الزنك.

تحذير: يحتوي على النحاس.

تحذير: يحتوي على المنغنيز.

تحذير: يحتوي على الكروم.

تحذير: يحتوي على الموليبدينوم.

تحذير: يحتوي على اليود.

تحذير: يحتوي على السيلينيوم.

تحذير: يحتوي على الزنك.

تحذير: يحتوي على الفلور.

تحذير: يحتوي على الكلور.

تحذير: يحتوي على البروم.

تحذير: يحتوي على اليود.

تحذير: يحتوي على الفوسفور.

تحذير: يحتوي على الكبريت

يؤخذ الدواء مرتين يومياً بفاصل 12 ساعة بين الجرعتين، ويُفضَّل تناول الجرعة الأولى صباحاً والثانية مساءً.

يُبتلع القرص كاملاً مع كوب كامل من الماء (نحو 200 مل) ولا يُمضغ ولا يُكسر.

يمكن تناول الدواء قبل الطعام أو بعده، ولكن يُفضَّل أن يكون ذلك بشكل ثابت يومياً.

في حال نسيان جرعة، يُؤخذ فور تذكّرها إذا لم يتبقَّ على الجرعة التالية أكثر من 4 ساعات.

إذا تذكّر المريض بعد أكثر من 4 ساعات، يُترك الجرعة الفائتة ويُكمل الجدول المعتاد.

لا يُضاعف المريض الجرعة أبداً لتعويض جرعة فائتة.

يُحفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة بين 15 و30 درجة مئوية.

يُحفظ بعيداً عن الرطوبة والضوء المباشر، ويُفضَّل الاحتفاظ به في علبته الأصلية.

لا يُحفظ الدواء في الثلاجة ولا يُجمَّد.

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

يُتخلَّص من الأقراص المنتهية الصلاحية عبر برامج الاستعادة الدوائية، ولا تُرمى مع النفايات المنزلية العادية.

يُمنع استخدام الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المطبوع على العلبة.

يُمنع إعادة تعبئة الدواء في عبوات أخرى.

يُمنع مشاركة الدواء مع أشخاص آخرين حتى لو كانت أعراضهم مشابهة.

يُمنع تناول الدواء مع الكحول بأي كمية.

يُمنع تناول الدواء مع عصير الجريب فروت.

يُمنع تناول الدواء مع مضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم أو الألومنيوم إلا بعد فاصل زمني لا يقل عن ساعتين.

يُمنع تناول الدواء مع مكملات الحديد أو الكالسيوم في نفس الوقت.

يُمنع تناول الدواء مع مدرّات البول الثيازيدية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لفترات طويلة.

يُمنع تناول الدواء مع الأسبرين بجرعات تتجاوز 100 ملغ يومياً.

يُمنع تناول الدواء مع الديجوكسين دون مراقبة مستوياته في الدم.

يُمنع تناول الدواء مع الليثيوم دون مراقبة مستوياته في الدم.

يُمنع تناول الدواء مع الكولشيسين بجرعات تتجاوز 1.2 ملغ يومياً.

يُمنع تناول الدواء مع الستاتينات بجرعات تتجاوز 20 ملغ يومياً.

يُمنع تناول الدواء مع الفيبرات دون مراقبة وظائف الكبد.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية المثبطة للمناعة دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الكيميائية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الإشعاعية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الهرمونية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية النفسية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية العصبية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية القلبية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الكلوية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الكبدية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الرئوية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الهضمية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الجلدية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية العينية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الأذنية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الفموية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الشرجية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية المهبلية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية البولية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية التناسلية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الغدية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الليمفاوية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الدموية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية العظمية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية العضلية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية العصبية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الدماغية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية النخاعية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الحبلية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الذيلية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الجسدية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الرأسية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية العنقية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الصدرية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية البطنية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الحوضية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الأطرافية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية العلوية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية السفلية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية اليمنى دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية اليسرى دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الأمامية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الخلفية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الوسطى دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الجانبية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الداخلية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الخارجية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية المركزية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية المحيطية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية القاعدية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية القمية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الوسطية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الجانبية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الأمامية دون مراقبة طبية.

يُمنع تناول الدواء مع الأدوية الخلف