

نشرة الدواء: معلومات للمريض

لوزانت ٥٠ ملغ أقراص

لوزانت ١٠٠ ملغ أقراص

لوزنتان البيوتاسيوم

إقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل القيام بتناول هذا الدواء حيث أنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إليها لاحقاً.
- في حال وجود أي تساؤلات لديك، يفضل استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً، ولا ينبغي بك أن تعطه لأحد آخر حتى لو ظهرت عليه نفس أعراض مريضك فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.
- إذا أصبت بأي آثار جانبية غير مذكورة في هذ النشرة، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي.

ما الذي تحتويه هذه النشرة

- ما هو لوزانت وما هي دواعي استعماله
- ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول لوزانت
- ما هي طريقة تناول لوزانت
- الأعراض الجانبية المحتملة
- طريقة تخزين لوزانت
- محتويات العبوة ومعلومات إضافية أخرى

١. ما هو لوزانت وما هي دواعي استعماله

تحتوي أقراص لوزانت على لوزنتان البيوتاسيوم، وينتمي لوزنتان البيوتاسيوم إلى مجموعة من الأدوية تُسمى "مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين آ". ينتج الجسم مادة الأنجيوتنسين آ التي ترتبط مع المستقبلات في الأوعية الدموية مما يسبب تضيق هذه الأوعية الدموية. بالتالي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. يمنع لوزنتان البيوتاسيوم من ارتباط أنجيوتنسين آ بهذه المستقبلات مسبباً ارتخاء الأوعية الدموية فينخفض بالتالي ضغط الدم. يبطئ لوزنتان البيوتاسيوم تدهور وظائف الكلى لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني.

يُستخدم لوزانت

- لمعالجة ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى البالغين والأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٨ عاماً.
- لحماية الكلى لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني وتدل نتائجهم السريرية على ضعف في وظائف الكلى وزلا البول حين تتخطى مستويات البروتين ٠.٥ غرام يومياً (حالة مرضية يحتوي فيها البول على كمية غير طبيعية من البروتين).
- لمعالجة قصور القلب المزمن في حال لا يرى الطبيب المعالج أن العلاج ببعض الأدوية التي تسمى مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنيسين (مثبطات ACE، الأدوية المستخدمة لحفض ضغط الدم المرتفع) مناسباً لك. وفي حال استقر قصور القلب الذي تعاني منه بواسطة أحد مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنيسين، لا يجب أن تغير علاجك وتتناول اللوزنتان.
- لمعالجة المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتضخم البطين الأيسر، ثبت أنلوزنتانتيقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية (بحسب الدراسات حول كيفية تعزيز وظيفة المناعة).

٢. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول لوزانت

لا تتناول لوزانت

- إذا كان لديك حساسية تجاه اللوزنتان أو لأي من مكونات هذا الدواء الأخرى (المدرجة في القسم ٦).
- إذا كنت حاملاً أو كنت حاملاً مؤخراً أو أنت في بداية الحمل -مراجعة قسم الحمل).
- إذا كنت تعاني من ضعف حاد في وظائف الكبد.
- إذا كنت تعاني من داء السكري أو خلل في وظائف الكلى وتعالجهما بواسطة أدوية خافضة لضغط الدم وتحتوي على أليسكبرين.
- إذا كانت إحدى الشروط أعلاه تنطبق عليك، لا تتناول لوزانت واستشر الطبيب المعالج.

التحذيرات والإحتياطات

استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

يجب تناول لوزانت بحذر شديد:

- إذا كنت قد عانيت سابقاً من الوذمة الوعائية (تورم الوجه، الشفتين، الحلق، و/أو اللسان) (مراجعة أيضاً القسم ٤ "الأعراض الجانبية المحتملة").
 - إذا كنت تعاني من الفء أو الإسهال الحاد مما يؤدي إلى خسارة كمية كبيرة من السوائل و/أو الملح في الجسم.
 - إذا كنت تتناول مدرات البول (أدوية تزيد من كمية الماء التي تفرغها من خلال كليتيك) أو تقلل من كمية الملح في نظامك الغذائي مما يؤدي إلى خسارة كبيرة من السوائل والأملاح في الجسم (مراجعة القسم ٣ "الجرعة الموصى بها لبعض فئات من المرضى").
 - إذا كنت تعاني من تضيق أو انسداد في الأوعية الدموية المؤدية إلى كليتيك أو إذا كنت قد أجريت مؤخراً عملية زرع كلية.
 - إذا كانت وظيفة الكبد لديك ضعيفة (مراجعة القسم ٢ "لا تتناول لوزانت") و"٣" الجرعة الموصى بها لبعض فئات من المرضى").
 - إذا كنت تعاني من قصور في القلب من قبل أو بدون قصور كلوي أو ما يصاحب ذلك من اضطرابات قلبية خطيرة مهددة للحياة.
- يجب توخي الحذر بشكل خاص عند تناول لوزانت بيتا إلى جانب هذا الدواء.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في صمامات القلب أو عضلة القلب.
 - إذا كنت تعاني من مرض الشريان التاجي (الناجم عن انخفاض تدفق الدم في الأوعية الدموية التي تزود القلب) أو من مرض يصيب الأوعية الدموية الدماغية (الناجم عن انخفاض الدورة الدموية في الدماغ).
 - إذا كنت تعاني من فرط الألدوستيرونية الأولي (متلازمة تتعلّق بزيادة إفراز الغدة الكظرية لهرمون الألدوستيرومن بسبب خلل في الغدة).
 - إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية التالية المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم:
 - أحد مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (على سبيل المثال إنبالابريل، ليفينوبريل، رامبيريل). خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى تتعلّق بمرض السكري.
 - أليسكبرين.

قد يقوم الطبيب المعالج بفحص وظائف الكلى وضغط الدم ونسبة الكهارل (مثل البيوتاسيوم) في الدم بشكل دائم.

مراجعة أيضاً المعلومات الواردة تحت عنوان **"لا تتناول لوزانت"**.

- إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تزيد من مستوى البيوتاسيوم في الدم (مراجعة القسم ٢ **"الأدوية الأخرى ولوزانت"**).

الأطفال والمراهقون

لا ينصح للأطفال الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الكبد باستخدام لوزانت، حيث أنّ البيانات المتوفرة المتعلقة بهذه الفئة من المرضى محدودة، لا ينصح للأطفال الذين يقل عمرهم عن ٦ سنوات باستخدام لوزانت، حيث أنه لم يتم إثبات فعاليته لهذه الفئة العمرية.

الأدوية الأخرى ولوزانت

أبلغ الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

أبلغ الطبيب المعالج إذا كنت تتناول مكملات البيوتاسيوم، بدائل الملح التي تحتوي على البيوتاسيوم، الأدوية الحافظة للبيوتاسيوم مثل بعض مدرات البول (أميلويد، تريامتيرين، سيبرونولاكتون)، أو أدوية أخرى قد تزيد من مستوى البيوتاسيوم في الدم (على سبيل المثال، الهيبارين، الأدوية التي تحتوي على تريمتيوبريم)، لأنه لا ينصح بتناولها إلى جانب لوزانت.

يجب توخي الحذر عند استخدام:

- أدوية أخرى خافضة لضغط الدم لأنها قد تؤدي إلى مزيد من انخفاض ضغط الدم. يمكن أيضاً خفض ضغط الدم بواسطة أحد الأدوية / إحدى فئات الأدوية التالية: مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، مضادات الذهان، باكليفين، أميفوستين.
- مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإندوميثاسين، بما في ذلك مثبطات كوكس-٢ (الأدوية التي تقلل من خطر الالتهاب والتي يمكن استخدامها لتخفيف الألم) لأنها قد تقلل من تأثير اللوزنتان في خفض ضغط الدم.
- قد يضطر الطبيب المعالج إلى تغيير جرعتك و/أو اتخاذ احتياطات أخرى:

إذا كنت تتناول أحد مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو أليسكبرين (مراجعة أيضاً المعلومات الواردة تحت العناوين "لا تتناول لوزانت" و"التحذيرات والاحتياطات").

إذا كانت وظائف الكلى لديك ضعيفة، قد يؤدي استخدام هذه الأدوية إلى جانب هذا الدواء إلى تدهور وظائف الكلى.

لا ينبغي أن يتم استخدام الأدوية التي تحتوي على الليثيوم إلى جانب اللوزنتان من دون أن يقوم الطبيب المعالج بمراقبتك بشكل دقيق، قد تكون التدابير الاحترازية الخاصة (مثل اختبارات الدم) مناسبة.

لوزانت مع الطعام والشراب

يمكنك تناول لوزانت مع الطعام أو بدونه.

الحمل والرضاعة الطبيعية

الحمل

يجب أن تبغلي الطبيب المعالج إذا كنت تعتقدين أنك (أو قد تصابين) حاملاً. ينصح الطبيب المعالج عادة بالتوقف عن تناول هذا الدواء قبل الحمل أو حالماً تدرك المرأة بأنها حامل وسوف ينصحك بتناول دواء آخر بدلاً من لوزانت.

لا ينصح بتناول هذا الدواء في بداية الحمل ولا يجب تناوله إذا كنتِ حاملاً لأكثر من ٣ أشهر لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً لطفلك إذا تم استخدامه بعد الشهر الثالث من الحمل.

الرضاعة الطبيعية

أبلغي الطبيب المعالج إذا كنت ترضعين طفلك أو على وشك البدء في الرضاعة الطبيعية. لا يُنصح بهذا الدواء للأمهات المرضعات، وقد يصف لك الطبيب المعالج علاجاً آخر إذا كنت ترغبين في الرضاعة الطبيعية، خاصة إذا كان طفلك حديث الولادة أو قد ولد قبل أوانه.

إذا كنتِ حاملاً أو ترضعين طفلك، نعتقدين أنكِ حامل أو تخططين لإنجاب طفل، استشيري الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

القيادة واستخدام الآلات

لم يتم إجراء أي دراسات حول تأثيرات هذا الدواء على قدرة الفرد على القيادة واستخدام الآلات.

من غير المحتمل أن يؤثر لوزانت على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات، ومع ذلك، كما هو الحال مع العديد من الأدوية الأخرى المستخدمة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، قد يسبب اللوزنتان البيوتاسيوم الدوخة أو النعاس لدى بعض المرضى. إذا شعرت بالدوخة أو النعاس، يجب استشارة الطبيب المعالج قبل القيام بمثل هذه الأنشطة.

يحتوي لوزانت على اللاكتوز

يحتوي لوزانت على أحادي هيدرات اللاكتوز. إذا كنت لا تهضم بعض السكريات، اتصل بالطبيب المعالج قبل تناول هذا الدواء.

٣. ما هي طريقة تناول لوزانت

اتبع بدقة إرشادات الطبيب المعالج عند تناول هذا الدواء، واستشر الطبيب المعالج إذا لست متأكدًا.

سيحدد الطبيب المعالج الجرعة المناسبة لك من لوزانت، وذلك بناءً على حالتك الصحية والأدوية الأخرى في حال كنت تتناولها. من الضروري الاستمرار في تناول لوزانت ما دام يطلب منك الطبيب المعالج تناوله، من أجل الحفاظ على المستوى الطبيعي لضغط الدم لديك.

كيفية تناول هذا الدواء

- يجب أن تبلغ الأقراص مع كوب من الماء.

- حاول أن تتناول جرعتك اليومية في الوقت نفسه تقريباً كل يوم.

- من الضروري أن تستمر في تناول لوزانت حتى يطلب منك الطبيب المعالج التوقف.

المرضى البالغون الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

عادة ما يبدأ العلاج بـ ٥٠ ملغ من لوزنتان البيوتاسيوم (قرص واحد من لوزانت ٥٠ ملغ) مرة واحدة في اليوم. من المفترض أن يتم الوصول إلى الحد الأقصى من التأثير الخافض لضغط الدم بعد ٣ إلى ٦ أسابيع من بدء العلاج. يمكن زيادة الجرعة لاحقاً لبعض المرضى حتى تصل إلى ١٠٠ ملغ من لوزنتان البيوتاسيوم (قرصان من لوزانت ٥٠ ملغ أو قرص واحد من لوزانت ١٠٠ ملغ) مرة واحدة يومياً. إذا كنت تشعر بأن تأثير هذا الدواء قوي جداً أو ضعيف جداً، يجب أن تستشير الطبيب المعالج أو الصيدلي.

المرضى البالغون الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني

عادة ما يبدأ العلاج بـ ٥٠ ملغ من لوزنتان(قرص واحد من لوزانت ٥٠ ملغ) مرة واحدة في اليوم. يمكن زيادة الجرعة لاحقاً إلى ١٠٠ ملغ من لوزنتان(قرصان من لوزانت ٥٠ ملغ أو قرص واحد من لوزانت ١٠٠ ملغ) مرة واحدة يومياً وذلك وفقاً لاستجابة ضغط الدم لديك.

يمكن تناول اللوزنتان إلى جانب أدوية أخرى خافضة لضغط الدم (مثل مدرات البول، حاصرات قنوات الكالسيوم، حاصرات ألفا أو بيتا، والأدوية مركزة المفعول) وكذلك إلى جانب الأنسولين والأدوية الأخرى الشائعة الاستخدام التي تقلل مستوى الجلوكوز في الدم (مثل السلفونيل يوريا، مجموعة الجلبتازون ومثبطات الجلوكوزيدار).

المرضى البالغون الذين يعانون من قصور في القلب

عادة ما يبدأ العلاج بـ ١٢,٥ ملغ من لوزنتان مرة واحدة في اليوم. عموماً، يجب زيادة الجرعة أسبوعياً بشكل تدريجي (أي، ١٢,٥ ملغ يومياً خلال الأسبوع الأول، ٢٥ ملغ يومياً خلال الأسبوع الثاني، ٥٠ ملغ يومياً خلال الأسبوع الثالث، ١٠٠ ملغ يومياً خلال الأسبوع الرابع، ١٥٠ ملغ يومياً خلال الأسبوع الخامس) حتى تصل إلى جرعة المداومة التي حددها الطبيب المعالج. يمكن استخدام جرعة قصوى مقدارها ١٥٠ ملغ من لوزنتان(على سبيل المثال، ثلاث أقراص من لوزانت ٥٠ ملغ أو قرص واحد من كل من لوزانت ١٠٠ ملغ ولوزانت ٥٠ ملغ) مرة واحدة يومياً.

في علاج قصور القلب، عادة ما يتم الجمع بين لوزنتان ومدر للبول (دواء يزيد من كمية الماء التي تفرغها من خلال الكليتين) و/أو مستخلصات نبتة اليجبتنل(دواء يساعد على تقوية القلب ليصبح أكثر فعالية) و/أو حاصرات بيتا.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٦ سنوات

لا ينصح باستخدام لوزانت للأطفال دون سن ٦ سنوات، حيث لم يتم إثبات فعاليته لدى هذه الفئة العمرية.

استخدام الأطفال والمراهقين (من ١٨ عاماً) لهذا الدواء

تكون الجرعة الأولى الموصى بها للمرضى الذين يتراوح وزنهم بين ٦٠ و ٥٠ كلغ، ٠,٧ ملغ من اللوزنتان لكل كيلوغرام من وزن الجسم ويُعطى مرة واحدة في اليوم (حتى ٢٥ ملغ من اللوزنتان البيوتاسيوم). قد يقوم الطبيب بزيادة الجرعة إذا لم يتم ضبط ضغط الدم على النحو المطلوب.

الجرعة الموصى بها لبعض فئات من المرضى

قد يصف لك الطبيب المعالج جرعة أقل، خاصة عند بدء العلاج لدى مرضى معينين مثل أولئك الذين يتناولون مدرات البول بجرعات عالية، أو مثل المرضى الذين يعانون من ضعف في الكبد أو المرضى الذين تزيد أعمارهم عن ٧٥ عاماً. لا ينصح للمرضى الذين يعانون من قصور كبدي حاد بتناول اللوزنتان (مراجعة قسم "لا تتناول لوزانت").

إذا تناولت لوزانت بكمية أكبر مما ينبغي عليك

إذا تناولت عن طريق الخطأ كمية كبيرة من أقراص لوزانت، اتصل بالطبيب على الفور. تشمل أعراض الجرعة الزائدة انخفاض ضغط الدم، زيادة ضربات القلب، وربما انخفاض ضربات القلب.

إذا نسيت تناول لوزانت

إذا نسيت عن غير قصد أن تتناول جرعتك اليومية، تناول فقط الجرعة التالية كالمعتاد. لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة الفائتة.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول طريقة تناول هذا الدواء، استشر الطبيب المعالج.

٤. الأعراض الجانبية المحتملة

قد ينتج عن هذا الدواء وكذلك باقي الأدوية، آثاراً جانبية إلّا أنها قد لا تصيب الجميع.

إذا واجهت أي من الآثار الجانبية التالية، توقف عن تناول أقراص لوزانت واتصل بالطبيب المعالج على الفور أو اذهب إلى أقرب مستشفى:

- رد فعل تحسسي شديد (طفح جلدي، حكة، تورم الوجه، الشفتين، الفم أو الحلق الذي قد يسبب صعوبة في البلع أو التنفس).

هذا الأثر الجانبي خطير ولكنه نادر، قد تحتاج إلى عناية طبية عاجلة أو دخول المستشفى.

تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية مع اللوزنتان البيوتاسيوم:

الآثار الجانبية الشائعة (قد تصيب شخصاً من بين ١٠ أشخاص):
دوار، انخفاض ضغط الدم (خاصة بعد خسارة كمية كبيرة من الماء في الجسم في الأوعية الدموية، على سبيل المثال لدى المرضى الذين يعانون من قصور حاد في القلب أو يخضعون لعلاج يتطلب جرعات عالية من مدرات البول)، انخفاض ضغط الدم الانتصابي المرتفع بضغط الدم، انخفاض الجرعة مثل انخفاض ضغط الدم الذي يحدث عند الوقوف من وضعية الاستلقاء أو الجلوس.

الضعف، الإرهاق، مستوى منخفض لسكر الدم (نقص السكر في الدم)، ارتفاع نسبة البيوتاسيوم في الدم (فرط بوتاسيوم الدم)، تغيرات في وظائف الكلى بما في ذلك الفشل الكلوي، انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، زيادة نسبة اليوريا، الكرياتينين والبيوتاسيوم في الدم لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب.

الآثار الجانبية غير الشائعة (قد تصيب شخصاً من بين ١٠٠٠ شخص):
نعاس، صداع، اضطرابات في النوم، الشعور بزيادة معدل ضربات القلب (خفقان القلب)، آلام حادة في الصدر(ذبحة صدرية)، ضيق في التنفس، آلام في البطن، إسهال، إمساك، إسهال، غثيان، قيء، تفرحات (شرى)، حكة، طفح جلدي، تورم موضعي (وذمة)، سعال.

الآثار الجانبية النادرة (قد تصيب شخصاً من بين ١٠٠٠٠ شخص):
فرط الحساسية، وذمة وعائية، الالتهاب العائلي (التهاب الأوعية الدموية بما في ذلك فرعية هينوخ شونلاين)، الإحساس بالوخز والتنميل، الإغماء، تسارع ضربات القلب وعدم انتظامها (الرجفان الأذيني)، النوبة الإقفارية العابرة (سكتة دماغية).

انخفاض ضغط الدم، ارتفاع مستويات ناعلات أمين الألائين في الدم، وعادة ما تزول عند التوقف عن العلاج.

مدى تواتر هذه الآثار غير معروف (لا يمكن تقدير معدل تواترها بناءً على البيانات المتاحة)؛ انخفاض عدد الصفيحات، الصداع النصفي، اضطرابات في وظائف الكبد، آلام العضلات والمفاصل.

انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم (فرط بوتاسيوم الدم)، تغيرات في وظائف الكلى (بولون الشاي) (بولون الشاي) (انحلال اليريدات)، العجز الجنسي، التهاب البنكرياس.

انخفاض مستويات الصوديوم في الدم (نقص صوديوم الدم)، الاكتئاب، الشعور بتوعك بشكل عام، زنين، أنين أو زئيفري الأذنين (الطنين)، اضطراب الذوق (خلل الذوق).

قد يواجه الأطفال آثار جانبية مماثلة لتلك التي يواجهها البالغون.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

إذا واجهت أي آثار جانبية بما في ذلك الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة، استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي.

من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

٥. طريقة تخزين لوزانت

- قم بتخزين هذا الدواء بعيداً عن مرآى ومتناول الأطفال.

- لا تستعمل لوزانت بعد انتهاء تاريخ الصلاحية والمذكور على العبوة الخارجية والشريط الداخلي، يشير انتهاء تاريخ الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر.

- لا تقم بتخزين هذا الدواء في درجة حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية، إحتفظه بعيداً عن الرطوبة.

- لا تستخدم هذا الدواء إذا لاحظت تدهور وإضحة عليه.

- لا تقطع مدة العلاج المحدة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

- لا تترك الأطفال في متناول الأطفال.

٦. محتويات العبوة ومعلومات إضافية أخرى

على ماذا يحتوي لوزانت

المادة الفعالة في لوزانت هي أقراص بيضاء اللون ومستديرة الشكل.

- أقراص لوزانت ٥٠ ملغ: يحتوي كل قرص على ٥٠ ملغ من لوزنتان البيوتاسيوم.

- أقراص لوزانت ١٠٠ ملغ: يحتوي كل قرص على ١٠٠ ملغ من لوزنتان البيوتاسيوم.

المكونات الأخرى هي: السليلوز دقيق التبلور، أحادي هيدرات اللاكتوز، ستيرات المغنيسيوم، نشا اللوز الجانسي.

كيف يبدو شكل لوزانت ومحتويات العبوة

أقراص لوزانت هي أقراص بيضاء اللون ومستديرة الشكل.

تتوفر أقراص لوزانت ٥٠ ملغ في علب تحتوي على ٣٠ قرص.

تتوفر أقراص لوزانت ١٠٠ ملغ في علب تحتوي على ٣٠ قرص.

الشركة المصنعة ومالكة حق التسويق

فارمالين ش.م.ل - لبنان

الصدوق البريدي ٩٠٢٠ جديدة المتن، لبنان

البريد الإلكتروني: pharmaline@maliagroup.com

الموقع الإلكتروني: www.pharmaline.com.lb

رقم تسجيل لوزانت ٥٠ ملغ في لبنان: ١٨/١٩٥٠٤/٠٤

رقم تسجيل لوزانت ١٠٠ ملغ في لبنان: ٠٨/٢٢٢٢٠٧/٠٧

إن هذا الدواء:

- لا يتغير مستحضره ويؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة استعمال المستعمل عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفه لك.

- الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وفي نفعه وضرره.

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

تمت مراجعة هذه النشرة في شباط/فبراير ٢٠٢٢.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالة العرب