

Eludril

Solution

Composition :

Chlorhexidine (DCI) digluconate.....	0,10 g
Chlorobutanol (DCI).....	0,10 g
Docusate sodique (DCI).....	0,10 g
Chloroforme.....	0,5 ml
Excipient aromatisé q.s.p.....	100 ml
(alcool à 95°, glycérine, menthol, essence de menthe, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, coccine, eau purifiée).	

Classe pharmaco-thérapeutique : Antiseptique pour application locale.
Anesthésique local (A : Appareil digestif et métabolisme).

Indications : • Angines • Soins pré et postopératoires en O.R.L. et stomatologie
• Gingivites, stomatites, aphtes, parodontites.

Contre-indication : Ne pas utiliser chez le nourrisson.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PRATICIEN.

Précautions d'emploi : **NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.**
En raison de la teneur en alcool de ce produit, veiller à ce que l'enfant n'avale pas le médicament.

Interactions médicamenteuses et autres interactions : Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre praticien ou à votre pharmacien.

Posologie : 10, 15 à 20 ml d'Eludril solution à diluer dans de l'eau 2 à 3 fois par jour ou plus selon l'avis de votre praticien. En bain de bouche ou gargarismes.
Posologie moyenne = 15 ml d'Eludril solution.

Mode d'emploi : Diluer 2 à 4 cuillères à café d'Eludril solution dans un demi-verre d'eau.

Effets non souhaités et gênants : Signalez à votre praticien ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant.

Durée de stabilité : Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

* Conserver entre 15° - 25° C à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Médicament autorisée au Liban sous le N° 38908/96

Présentation : Flacon de 90 ml.

Pharmaline

Fabriqué par Pharmaline - Liban
Licence Pierre Fabre - France



Pierre Fabre