

# لو-ليب®

جمفبروزيل

الوصف:

لو-ليب® (جمفبروزيل) مستحضر لتنظيم الدهون، حيث يقلل من إجمالي كوليستيرول وترايغليسيريد البلازما. يحدث هذا التقليل للبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) والبروتينات الدهنية ذات الكثافة المنخفضة جدا (VLDL). بالإضافة إلى أن لو-ليب® يزيد من البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL).

الخواص:

يتم امتصاص جمفبروزيل بشكل جيد، يرتبط بشكل كبير ببروتينات البلازما ويتم استقلابه بشكل أساسي في الكبد، أهم مستقلب هومستقلب حمض بنزويك. كما أن إعادة امتصاص جمفبروزيل من الأمعاء جزء هام من عملية الاستقلاب. يتم طرح حوالي 70٪ عن طريق الكلى، كما أن نصف عمر الإطراح يبلغ 4، ١ ساعة.

دواعي الاستعمال:

يستعمل لو-ليب® في معالجة حالات معينة من اضطراب استقلاب الدهون التي لا يمكن تعديلها عن طريق تنظيم الغذاء أو تغيير العوامل الخارجية كالتمارين الرياضية أو تخفيف الوزن. بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والتدخين، فإن ارتفاع نسبة الدهون في الدم يعتبر من أهم عوامل خطر حدوث وتطور تصلب الشرايين. كما يستعمل لو-ليب® أيضاً في معالجة اضطراب استقلاب الدهون التي قد تصاحب بعض الأمراض كالسكري أو النقرس وغيرها من الأمراض والتي قد تستمر بالرغم من معالجة المرض الأساسي.

الجرعات وطريقة الاستعمال:

قرص واحد لو-ليب® مرتين يومياً صباحاً ومساءً، ٣٠ دقيقة قبل الوجبات.

موانع الاستعمال:

الحساسية لجمفبروزيل.

إدمان الكحول، حالات القصور الشديد في وظائف الكلى أو الكبد بما في ذلك تليف الصفراء الأولي وإعتلال المرارة المسبق بوجود أو عدم وجود حصى المرارة.

محاذير الاستعمال:

يجب ضبط مستويات دهنيات مصل الدم قبل بدء العلاج بجمفبروزيل، مع الحماية المناسبة والتمارين الرياضية وإيقاف التدخين والحد من تناول الكحول والعمل على إنقاص الوزن لدى المرضى الذين يعانون من السمنة ومعالجة مسببات الارتفاع الثانوي لنسبة الدهون في الدم مثل نقص التدرق والسكري. يجب مراقبة العلاج وعمل التحاليل المخبرية الكافية قبل البدء في المعالجة.

الاستعمال خلال فترتي الحمل والإرضاع:

يستعمل خلال فترة الحمل فقط إذا كانت الفائدة المرجوة تفوق الضرر المحتمل حدوثه للأم أو للجنين.

إيقاف إما الرضاعة أو العلاج بالدواء، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الدواء للأم.

التداخلات الدوائية:

- مضادات التخثر: قد يزيد جمفبروزيل من التأثير العلاجي لمضادات التخثر.
- موانع الحمل الاستروجينية (الفموية) : يجب إعلام طبيبك اذا كنت تتناولين حبوب منع الحمل، لأنها قد تكون السبب في إختلال نسبة الدهون في الدم.
- لوفاستاتين والأدوية المانعة لإنزيم HMG-CoA ريداكناز: يمكن حدوث التهاب عضلي شديد عند استعمال جمفبروزيل ولوفاستاتين، لذا ينصح بتجنب استعمالهما بشكل متزامن.
- قد ينخفض مستوى سايكلوبورين عند استعماله بشكل متزامن مع جمفبروزيل.

• ريفامبين يقلل من مستوى جمفبروزيل.

• قد يقل التوافر الحيوي لجمفبروزيل عند استعماله بشكل متزامن مع أدوية حبيبات الريسين مثل كوليسيستيبول. يوصى بإعطاء هذه الأدوية بشكل منفصل ، أي حوالي ساعتين أو أكثر بينها.

#### الأعراض الجانبية:

عادة ما تكون أعراض هضمية عابرة وتشمل: عسر الهضم، آلام البطن، إسهال، غثيان، ألم شرسوفي، قيء وانتفاخ.

حالات نادرة: صداع، التهاب الجلد، عدم وضوح الرؤية، إرهاق ودوار.

#### فرط الجرعة:

تم تسجيل حدوث فرط الجرعة بسبب جمفبروزيل. الأعراض كانت تشنجات بطنية، شذوذ في نتائج فحص وظائف الكبد، إسهال، ارتفاع إنزيم كرياتين فوسفوكيناز، ألم عضلي ومفصلي، غثيان وقيء.

يجب اتخاذ إجراءات داعمة وعرضية عند حدوث فرط الجرعة.

#### ظروف الحفظ:

يحفظ بين ١٥-٣٠°م.

#### كيفية التزويد:

لوليب® ٦٠٠ أقراص: كل قرص مغلف يحتوي على جمفبروزيل ٦٠٠ ملغم في عبوات سعة ٣٠ قرص. عبوات مستشفيات متوفرة أيضاً.

#### السواغات:

- ثاني أكسيد السيليكون الغروي ، بوليسوربات ٨٠ ، هيدروكسي بروبيل سيليلوز ، نشأ، فوسفات الكالسيوم ، ميكروكريستالين سيليلوز ، كروس كارميلوز الصوديوم، ماغنيسيوم ستيريت و اوبادراي ابيض للتغليف .

#### إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- إحفظ الدواء بعيداً عن متناول الاطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب  
إتحاد الصيدالة العرب

الشركة المتحدة لصناعة الأدوية ذ.م.م  
ص.ب ٦٩ عمان ١١٥٩١ الأردن

June, 2013  
M3-14-0581