

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Sabril®

500mg

Sabril® 500 mg - comprimés

Ce médicament a pour composition

Vigabatrin 500 mg

Excipient q.s.p. un comprimé pelliculé.

(polyvidone, cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique, stéarate de magnésium

PELLICULAGE : hydroxyméthylcellulose, dioxyde de titane, polyéthylène glycol 8000)

Ce médicament se présente sous la forme de comprimés pelliculés, boîte de 60.

Sabril® 500 mg - poudre pour solution buvable

Ce médicament a pour composition

Vigabatrin 500 mg

Ce médicament se présente sous la forme de poudre pour solution buvable en sachets, boîte de 60.

Ce médicament est un antiépileptique.

Ce médicament est commercialisé par :

Marion Merrell Dow S.A.

130, rue Victor Hugo

92300 LEVALLOIS-PERRET (France)

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

(Indications thérapeutiques)

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains types d'épilepsies rebelles de l'adulte et de l'enfant, en complément du traitement antérieur.

ATTENTION !

Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament ?

(Contre-indications)

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie à l'un des constituants du médicament.

Sabril®

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde spéciales

La prescription de ce médicament doit rester exceptionnelle chez les personnes ayant présenté des maladies psychiatriques par le passé.

Précautions d'emploi

Utiliser ce médicament avec précaution en cas de :

- maladie des reins.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement

Avertir votre médecin en cas de désir de grossesse, grossesse ou allaitement.

Conducteurs et utilisateurs de machines

L'attention est appelée sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie

La dose à utiliser est déterminée par votre médecin. Elle est strictement individuelle.

Mode et voie d'administration

Avaler les comprimés avec un demi-verre d'eau.

ou

Dissoudre le contenu du ou des sachets dans un demi-verre d'eau, de jus de fruit ou de lait.

Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré

La posologie sera répartie en 1 ou 2 prises par jour.

Sabril®

Durée du traitement

Ne pas modifier et ne pas arrêter brutalement le traitement sans prévenir votre médecin.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

(Effets indésirables)

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- somnolence, confusion, agitation, irritabilité, agressivité, dépression, maux de tête, troubles de la mémoire, troubles de la vision.

D'autres effets sont plus rares :

- prise de poids, troubles gastriques et intestinaux.

Une perturbation de la fonction du foie peut également survenir.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament est inscrit sur la liste I.

Sa délivrance ne peut être renouvelée que si le médecin l'a expressément indiqué sur l'ordonnance ou sur présentation d'une nouvelle ordonnance.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit dans une situation précise :

- Il peut ne pas être adapté à un autre cas.
- Ne pas le réutiliser sans avis médical.
- Ne pas le conseiller à une autre personne.

Date de révision de la notice

Septembre 1994

Sabril®

Les informations et conseils suivants vous sont donnés par l'Industrie Pharmaceutique, les Professions de Santé et des Organisations de Consommateurs :

Ce médicament traite les troubles de l'excitabilité du système nerveux. Il vous a été prescrit, seul ou associé à d'autres médicaments du même type, parce qu'il est adapté à votre cas personnel.

Pour que ce médicament donne les meilleurs résultats, vous devez impérativement respecter les recommandations de votre médecin :

- la dose journalière prescrite,
- l'horaire des prises,
- la durée du traitement, généralement prolongée,
- les conseils d'hygiène de vie.

La modification des doses et, surtout, l'arrêt brutal du traitement peuvent entraîner la réapparition des troubles.

N'oubliez pas votre médicament si vous partez en voyage.

Lisez attentivement toutes les informations sur votre médicament contenues dans la notice.

N'associez jamais de votre propre initiative un autre médicament sans en avoir parlé à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce traitement vous est personnel : ne le donnez pas et ne le conseillez pas à une autre personne pour laquelle il ne serait pas douteusement adapté.

Signalez systématiquement à votre médecin, comme à votre pharmacien, les médicaments que vous prenez déjà, avant qu'il ne rédige une ordonnance ou ne délivre un médicament.

**Votre médecin, votre pharmacien
connaissent bien les médicaments.
N'hésitez pas à leur demander des précisions.**

**Ne laissez jamais un médicament
à la portée des enfants.**

1512297

Marion Merrell Dow S.A.
130, rue Victor Hugo
92300 Levallois-Perret

 MARION
MERRELL
DOW

