

	<p>• التوجع • التعرق • الضعف • التماس • الجوع • الإرتباك • الضعية</p> <p>• تسارع ضربات القلب</p> <p>☐ تفاعلات حساسية خطيرة إذا بدت عليك أعراض الحساسية الخطيرة، وتوقف عن تناول جانيوميت واتصل بطبيبك فوراً. انظر الفقرة بعنوان "من الذي يجب ألا يتناول جانيوميت؟".</p> <p>☐ من المحتمل أن يعطيك طبيبك دواء لعلاج نفاذات الحساسية ويصف لك دواء آخر لعلاج السكري.</p> <p>☐ مشكلات في الكلى، وفي تحتاج أحياناً إلى تعديل كولي.</p> <p>☐ ألم في المفاصل يمكن لبعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية تدعى مثبطات إنزيم الببتيداز ثاني الليبتيد الراجع (DPP-4 inhibitors)، أحد الأدوية الموجودة في جانيوميت، أن يعاودوا بالألم عادة أحياناً في المفاصل. اتصل بطبيبك على الفور إذا شعرت بالألم عادة في المفاصل.</p> <p>☐ تفاعل جلدي. يمكن لبعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية تدعى مثبطات كزيم الببتيداز ثاني الليبتيد الراجع (DPP-4 inhibitors)، أحد الأدوية الموجودة في جانيوميت، أن يعاودوا بتفاعل جلدي يدعى الفقاع الفقاعي، وهي حالة يحتمل أن تستدعي العلاج في المستشفى. اتصل بطبيبك على الفور إذا ظهرت عليك بثور أو تآكلت الطبقة الخارجية من الجلد لديك. من المحتمل أن يطلب منك طبيبك التوقف عن تناول جانيوميت.</p> <p>الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لجانيوميت تشمل:</p> <p>☐ اسداد أو سيلان الأنف والتهاب الحلق</p> <p>☐ عوزي الجهاز التنفسي العلوي</p> <p>☐ نقص سكر الدم عند استخدام جانيوميت بالتزامن مع أدوية معينة مثل السلفونيل يوريا أو الأسولين.</p> <p>☐ الغثارات، اضطراب المعدة، عسر الهضم</p> <p>☐ الضعف</p> <p>☐ التقيؤ والغثي</p> <p>☐ الصداع</p> <p>☐ الإسهال</p>	<p>التشرة الدوائية</p> <p>جانيوميت® (جان- بيو- ميت)</p> <p>٥٠٠ ملج/ ٥٠٠ ملج - ٥٠ ملج/ ١٠٠٠ ملج (سيتاجليبتين وميتفورمين هيدروكلوريد) أقراص</p> <p>قرأ هذه التشرة الدوائية بعناية قبل أن تبدأ في تناول جانيوميت وفي كل مرة تكرره، ربما كانت تحتوي على معلومات جديدة. إن تفقك هذه المعلومات عن الحاجة إلى التحدث مع طبيبك عن حالتك الحالية أو علاجك، إذا كانت لديك أية أسئلة عن جانيوميت، فاسأل الطبيب أو الصيدلي.</p> <p>ما أهم المعلومات التي يجب أن أعرفها عن جانيوميت؟</p> <p>١. الحساسيات الخطيرة التي يمكن أن تسبب الأشخاص الذين يتناولون جانيوميت وتشم:</p> <p>☐ الحساسيات الجلدية. من المحتمل أن يتسبب الميتفورمين - أحد المواد الدوائية في جانيوميت - بحالة نادرة ولكن خطيرة ومميتة أحياناً تسمى الحماض اللبني (تر كم حمض اللاكتيك في الدم)، والحماض اللبني حالة طبية خطيرة يجب علاجها في المستشفى.</p> <p>☐ يجب عليك الاتصال بالطبيب على الفور إذا بدت عليك أي من الأعراض التالية التي تدل على احتمال الإصابة بالحماض اللبني، إذا كنت:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ تشعر بالبرودة على مستوى الذراعين والساقين. ☐ تشعر بالقيء أو الدوخة ☐ تعاني من تباطؤ أو عدم انتظام ضربات القلب. ☐ تعاني من ضعف أو التعب الشديد ☐ تعاني من ألم غير اعتيادي (غير طبيعي) في العضلات. ☐ تعاني من صعوبة في التنفس. ☐ تعاني من غثاس أو غثاس شديد. ☐ تعاني من الألم في البطن أو غثاس أو قيء. <p>معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالحماض البني بعد استعمال الميتفورمين كانوا يعانون من حالات أخرى تسببت مع الميتفورمين بالحماض اللبني. أخبر طبيبك في حال كنت مصاباً بأي من الحالات التالية لأنك أكثر عرضة للإصابة بالحماض اللبني عند استخدام جانيوميت في الحالات التالية:</p> <p>☐ إذا كنت تعاني من مشكلات حادة في الكلى أو تآكرت الكلى لديك ببعض الإجراءات البسيطة التي تخففت حثقتك بمدة واحدة.</p> <p>☐ إذا كنت تعاني من مشكلات في الكلى.</p> <p>☐ إذا كنت تسرف في شرب الكحول بصورة منتظمة أو متقطعة.</p> <p>☐ إذا كنت تعاني من الجفاف (فقدت كمية كبيرة من سوائل الجسم). يمكنك الإصابة بالجفاف إذا كنت تعاني من الحمى أو القيء أو الإسهال، كما يمكنك الإصابة بالجفاف عندما تتعرق كثيراً أثناء ممارسة الرياضة أو التفرجات الرياضية من سون أو تتعرق كمية كافية من السوائل.</p> <p>☐ إذا لم يمت لك جرح جراحاً.</p> <p>☐ إذا كنت تعاني من دوية قوية أو عدوى شديدة أو سكتة دماغية.</p> <p>أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بالحماض اللبني بسبب الميتفورمين تسمى بإخبار طبيبك في حال كنت تعاني من أية مشكلة من المشكلات المدرجة أعلاه من المحتمل أن يقرر طبيبك التوقف عن استخدام جانيوميت لفترة من الوقت في حال كنت مصاباً بأي من تلك الحالات.</p> <p>يمكن لجانيوميت أن يتسبب بغير تلك من الآثار الجانبية الخطيرة. انظر الفقرة بعنوان "ما هي الآثار الجانبية الممكنة لجانيوميت؟".</p> <p>٢. التهاب البنكرياس الذي يحتمل أن يكون شديداً ويؤدي إلى الوفاة.</p> <p>هناك مشكلات طبية معينة تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس.</p> <p>قبل أن تبدأ في تناول جانيوميت:</p> <p>☐ أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي وقت مضى من:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ التهاب البنكرياس ☐ حصوات في المرارة (حصوات صفراء) ☐ تاريخ من الأمتاع على الكحول ☐ ارتفاع لثاني الغلوسيريول في الدم <p>توقف عن تناول جانيوميت واتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من ألم شديد ولا يزال في منطقة المعدة (البطن). ربما تشعر بالألم يأتي من البطن باتجاه الظهر أو في بطن في.</p> <p>وهي أعراض تشير إلى احتمال الإصابة بالتهاب البنكرياس.</p> <p>٣. قصور القلب. قصور القلب يعني أن قلبك لا يضح الدم جيداً بما فيه الكفاية.</p> <p>قبل البدء بتناول جانيوميت، أخبر طبيبك إن تعرضت في أي وقت مضى لقصور أو قلب أو كنت لديك مشاكل في الكلى. اتصل بطبيبك على الفور إذا بدت تعاني من الأعراض التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ تزايد سريع في تورم الكاحل أو الساقين أو تورم سريع في القدمين خاصةً عند الوقوف. ☐ تورم أو انتفاخ السوائل، خاصةً في القدمين أو الكاحلين أو الساقين. ☐ زيادة الوزن بسرعة غير اعتيادية. ☐ قبح غير اعتيادي. ☐ هبة العوارض تشير إلى احتمال الإصابة بقصور في القلب. 	<p>ما هو جانيوميت؟</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ جانيوميت عبارة عن دواء يؤخذ بوسفة طبية، ويحتوي على دوائين يتم وصفهما لمرض السكري هما سيتاجليبتين (جانوفيا®) وميتفورمين. يمكن استخدام جانيوميت إلى جانب الحمية الغذائية والتفرجات لتقليل السكر في الدم عند البالغين المصابين بمرض السكري من النوع الثاني. ☐ جانيوميت ليس للأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الأول. ☐ جانيوميت ليس للأشخاص المصابين بالحماض الكيتوني السكري (زيادة الكيتونات في الدم أو البول). ☐ إذا كنت قد عانيت من التهاب البنكرياس في الماضي، فليس من المعروف إذا كنت عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس أثناء تناول جانيوميت أو لا. ☐ ومن غير المعروف إذا كان جانيوميت آموناً وآمناً عند استخدامه للأفراد الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً. <p>من الذي يجب ألا يتناول جانيوميت؟</p> <p>لا تتناول جانيوميت إذا:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ كنت تعاني من مشكلات حادة في الكلى. ☐ كنت تعاني من حساسية لأي من مكونات جانيوميت. انظر نهاية هذه التشرة الدوائية للاطلاع على القائمة الكاملة لمكونات جانيوميت. ☐ يمكن لأعراض الحساسية الخطيرة تجاه جانيوميت أن تشمل الطفح الجلدي، بقرع جاف ناتجة عن سطح الجلد (شرى) أو تورم الوجه والشفتين واللسان والحلق الذي قد يسبب صعوبة في التنفس أو البلع ☐ كنت مصاباً بالحماض الكيتوني السكري. انظر الفقرة بعنوان "ما هو جانيوميت؟". <p>ما المعلومات التي يجب إبلاغها لطبيب قبل تناول جانيوميت؟</p> <p>قبل أن تتناول جانيوميت، أخبر طبيبك إذا كنت:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ تعاني أو عانيت من التهاب البنكرياس. ☐ تعاني من مشكلات حادة في الكلى. ☐ تعاني من مشكلات في الكلى. ☐ تسرف في شرب الكحول بصورة منتظمة أو متقطعة. ☐ إذا كان سيتم حقنك بصبغة أو مادة ملونة لإجراء أشعة سينية، ربما سيكون عليك التوقف عن استخدام جانيوميت لفترة قصيرة. اسأل الطبيب عن الوقت المناسب للتوقف عن تناول جانيوميت والوقت المناسب لمعاداة استعماله. انظر الفقرة بعنوان "ما أهم المعلومات التي يجب أن أعرفها عن جانيوميت؟". ☐ تعاني من أي حالات طبية أخرى. ☐ حامل أو تخططين للحمل من غير المعروف إذا كان جانيوميت سوف يؤدي الجينين أو لا. إذا كنت حاملاً، تحدثي مع طبيبك عن الطريقة المثالية لتسيير طبيك في الدم أثناء الحمل. ☐ عرضة أو تخططين لإرضاعة طفليكم، من غير المعروف إذا كان جانيوميت يفر في لبن الثدي أو لا. تحدثي مع طبيبك عن الطريقة المثالية لتفحصك إذا كنت تتناولين جانيوميت. ☐ يجب أخبر طبيبك بكافة الأدوية التي تتناولها، سواء الأدوية التي تحصل عليها بوسفة طبية أو بدون وصفة طبية والتفرجات والمكملات العشبية. يمكن لجانيوميت أن يؤثر على مفعول الأدوية الأخرى كما يمكن لبعض الأدوية أن تؤثر على مفعول جانيوميت. ☐ اعرف الأدوية التي تتناولها. احتفظ بقائمة بالأدوية التي تتناولها وأعرضها على الطبيب والصيدلي. كلفم حصلت على دواء جديد. <p>كيفية استخدام جانيوميت؟</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ يجب تناول جانيوميت حسب إرشادات الطبيب بالتحفظ. سيخبرك الطبيب بعدد الأقراص التي ينبغي أن تتناولها من جانيوميت ومواعيد تناولها. ☐ من المحتمل أن يعطيك جرعة جانيوميت عند الإفطار. ☐ من المحتمل أن يطلب منك طبيبك تناول جانيوميت إلى جانب أدوية أخرى للسكري. يزداد احتمال انخفاض السكر في الدم عند تناول جانيوميت مع أدوية أخرى للسكري. انظر الفقرة بعنوان "ما هي الآثار الجانبية الممكنة لجانيوميت؟". ☐ تناول جانيوميت مع إحدى الوجبات لتقليل احتمال الإصابة بطنش أو المعدة. ☐ ينبغي تناول أقراص جانيوميت كاملة وعدم تكسيرها أو تقطيعها. إذا كنت لا تستطيع ابتلاع أقراص جانيوميت كاملة، فأخبر طبيبك بذلك. ☐ استمر في تناول جانيوميت ما دام طبيبك يحفظ بذلك. ☐ إذا تناولت جرعة زائدة من جانيوميت، فاقصلي فوراً بطبيبك أو بالمركز لعلاج السموم. ☐ إذا نسيت جرعة من جانيوميت، تناولها فور تذكرها، وإذا كان وقت الجرعة التالية قد اقترب، فخط الجرعة التي نسيتها وتناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. لا تتناول جرعة من جانيوميت في نفس الوقت. ☐ ربما تحتاج إلى أن تتوقف عن تناول جانيوميت لوقت قصير. اتصل بطبيبك من أجل التعليمات إذا: ☐ كنت تعاني من الجفاف (فقدت كمية كبيرة من سوائل الجسم). يمكنك الإصابة بالجفاف إذا كنت تعاني من قيء أو إسهال أو حمى بشكل شديد أو إذا كنت تتعرق كمية سائل أقل بكثير من الكمية المعتاد. ☐ كنت تخطط لإجراء جراحة. ☐ كان سيتم حقنك بصبغة أو مادة ملونة لإجراء أشعة سينية. انظر الفقرة بعنوان "ما أهم المعلومات التي يجب أن أعرفها عن جانيوميت؟" والفقرة بعنوان "ما المعلومات التي يجب إبلاغها لطبيب قبل تناول جانيوميت؟". ☐ عندما يكون الجسم تخفت بعض أنواع المضغوط مثل الحمى أو العضة (مثل حادث سيارة)، أو العدوى، أو الجراحة، ربما تتغير كمية دواء السكري التي تحتاج إليها. أخبر طبيبك فوراً إذا تغيرت أي من إحدى هذه المشاكل وبيع تعليمات طبيبك. ☐ خصص السكر في الدم أثناء حسب التفرجات المعتاد. ☐ افق على الحمية الغذائية ورائج التفرجات المعتاد. المسموعة لك أثناء استخدام جانيوميت. ☐ تحدث مع طبيبك عن كيفية الوقاية من سكر الدم المنخفض وسكر الدم المرتفع وكيفية التعرف عليها، وعلاجها، والمشكلات التي يسببها لك داء السكري. ☐ سوف يفحص الطبيب حالة السكري لديك عن طريق اختبارات دم منتظمة تشمل مستويات السكر في الدم والبيموجلولين السكري. ☐ سوف يراقب طبيبك بإجراء اختبارات دم للتفحص من وظيفة الكلى لديك قبل وأثناء علاجك باستخدام جانيوميت. <p>ما هي الآثار الجانبية الممكنة لجانيوميت؟</p> <p>ظهرت آثار جانبية خطيرة عند الأشخاص الذين يتناولون جانيوميت من أيأ من المكونات الدوائية التي يحتوي عليها جانيوميت.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ انخفاض السكر في الدم. إذا كنت تتناول جانيوميت مع دواء آخر يمكن أن يسبب انخفاض السكر في الدم، مثل السلفونيل يوريا أو الأسولين، يزداد احتمال إصابتك بانخفاض السكر في الدم. إذا بقرع جفاف، جرعة السلفونيل يوريا أو الأسولين أثناء استخدام جانيوميت. تشمل علامات وأعراض انخفاض السكر في الدم: ☐ الصداع ☐ التقيؤ
--	--	---	---