

رودولاك

مُليّن تناضحّي (أسموزي)•

الشكل الصيدلاني

شراب، ٢٥٠ ملل•

التركيب

المادّة الفعّالة: لاكتولوز ٣.٥ غ / ٥ ملل•

الأسوغة: نكهة المشمش، نكهة ليمون الأفندي•

دواعي الاستعمال

١- علاج أعراض الإمساك: يوصفُ للبالغين ولكبار السنّ المصابين بأمراض الشيخوخة أو للمرضى طريحي الفراش، كما يوصف للأطفال بعد استشارة الطبيب. ويستخدمُ هذا الدواء بعد العمليّات الجراحية•

٢- مرض دماغيّ وريديّ: يوصفُ الدواء للوقاية كما العلاج، ويشمل حالات السبات وحالات ما قبل السبات. يتزامنُ إنخفاضُ معدّل الأمونياك في الدم في معظم الأحيان مع تحسّن حالة المريض النفسية وبرزو نتائج جيّدة على مستوى جدول تخطيط الدماغ الكهربائي•

مقادير الجرعة/طريقة الاستعمال

١. الإمساك

يتم تعديل الجرعة اليومية وفقاً للنتيجة المبيّنة. من المحتمل إذاً ألا يتنبأ التغوط الطبيعي إلا بعد انقضاء ٢٤ إلى ٤٨ ساعة على بدء العلاج. يُسمح بتناول جرعة الدواء مرّة واحدة في الصباح، ويمكن أن تُمزج مع شراب ساخن أو بارد (حليب، عصير، قهوة، لبن أو فاكهية).

للبالغين: ١٠ إلى ٢٠ غ/اليوم (١٥ إلى ٣٠ ملل). يمكن زيادة الجرعة عند الضرورة إلى ٤٠ غ (٦٠ ملل). يمكن تقليص هذه الجرعة تدريجياً إلى جرعة الصيانة بمقدار ٧ إلى ١٠ غ/اليوم (١٠ إلى ١٥ ملل) وفقاً للجدول السريري.

لكبار السن: ٣،٣ إلى ٦،٦ غ (٤ إلى ١٠ ملل) مع تناول جرعتين إلى ثلاث جرعات/اليوم الواحد.

للأطفال: ٠،٢ إلى ٠،٤ غ (٠،٣ إلى ٠،٦ ملل) لكل كغ واحد من وزن الجسم مع تناول ٣ إلى ٤ جرعات/اليوم الواحد.

٢. مرض دماغي وريدي
٢٠ إلى ٣٠ غ (٣٠ إلى ٤٥ ملل) مع تناول ٣ إلى ٤ جرعات/اليوم الواحد. ويتم تعديل الجرعة بطريقة فردية.

موانع الاستعمال

- فرط الحساسية لأيّ من مكونات الدواء، وعدم تحمل الغالاكتوز أو اللاكتوز، الغالاكتوزيمية، التهاب الزائدة الدودية، إنسداد معوي غير كامل، إنسداد معوي شللي.

- يجب تفادي تناول هذا الدواء وكافة أنواع المليّنات في حالة آلام البطن غير المشخصة، والغثيان، ونزيف الجهاز المعدي-المعوي.

التحذيرات واحتياطات الاستعمال

- يجب أن يخضع المصابون بمرض الدماغ الوريدي وكبار السن لقياس الكهارل المصلية (وبخاصة البوتاسيوم، والصوديوم، والكلورايد) بشكل دوري ومنتظم.

- يجب تقليص مقدار الجرعة في حالات الإسهال. وفي حالات الإسهال المستمرة، ينبغي التوقف عن تناول الدواء.

- من الضروري أخذ الاحتياطات اللازمة لدى وصف رودولاك لمرضى السكري نظراً إلى مقدار اللاكتوز والغالاكتوز المتواجد في الدواء. تحتوي نسبة ١٠ ملل من رودولاك على ١،٤٨ غ من السكريات السريعة الامتصاص ما يعادل ٦،٢ كيلو كالوري أو ٢٦،٤ كيلو جول، وما يعادل أيضاً ٠،١٥ من السكريات.

- يجب عدم تناول رودولاك بالتزامن مع أنواع أخرى من المليّنات.

الآثار الجانبية

إضطرابات معدية-معوية كآلام البطن، تطبّل وانتفاخ البطن. وقد تسبّب جرعات عالية من الدواء الغثيان، التقيؤ والإسهال.

الحمل والرّضاعة

يُسمح بتناول رودولاك خلال الحمل والرّضاعة.

التأثير على القيادة والعمل على الآلات

لا يظهر أيّ تأثير لعقار رودولاك على القدرة على القيادة أو العمل على الآلات.

فرط الجرعة

يسبّب فرط الجرعة في حدوث حالات الإسهال. وفي هذه الحالة، يجب تقليص مقدار الجرعة. كما يجب إتخاذ التدابير المناسبة لإعادة التمييه عند الضرورة.

حفظ الدواء

يجب عدم استعمال الدواء بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية المبين على العبوة. يُحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

يُحفظ بين ١٥-٢٥ درجة مئوية.

تعلق العبوة بعد فتحها.

يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس.

