

ما هي محتويات لاميزيل «مرة واحدة»؟

يحتوي جم ١ لاميزيل «مرة واحدة» على ١٠ ججم من تيربيتافين في شكل تيربيتافين هايدرو كلورايد (المكون النشط) والكحول ومكونات أخرى.

ما هو حجم العبوات المتأحة؟

أنبوب سعة ٤ جم.

تم التصنيع بواسطة نوفارتيس كونسيومر هيلث، نيون، سويسرا
تم تحديث المعلومات: في أبريل ٢٠٠٥.



كيف تستعمل لاميزيل «مرة واحدة»؟

البالغين والمرأهقين من عمر ١٥ سنة: يجب أن يتم وضع لاميزيل «مرة واحدة» مرة واحدة فقط.

- قبيل وضع لاميزيل «مرة واحدة»، أغسل يديك جيداً بالماء ونظف الأجزاء المتأثرة باستعمال قطعة من القطن وماء دافئ وقم بتجفيفها جيداً.

• يجب أن يتم وضع لاميزيل «مرة واحدة» على كلتا القدمين المعالجة الفطرىات فى أماكن أخرى حتى في حالة عدم ظهور الإصابة فى القدم الأخرى.

- ضع في البداية طبقة خفيفة من لاميزيل «مرة واحدة» بين و على أصابع القدم.



أقرأ هذه النشرة بعناية لأنها تحتوى على معلومات مهمة. تم وصف هذا العلاج لك بواسطة طببك أو قد تم صرفه لك دون وصفة طبية بواسطة الصيدلى. لكي تحصل على أفضل النتائج، فإنك تحتاج أن تقرأ هذه النشرة بعناية، أو وفقاً للتعليمات التى أعطيت لك بواسطة طببك أو الصيدلى على التوالى. أحافظ بهذه النشرة حتى تتمكن من قراءتها في وقت لاحق ثانية.

لاميزيل مره واحده

محلول مكون لطبقة رقيقة

ما هو لاميزيل «مرة واحدة» ومتى يتم استعماله؟

لاميزيل «مرة واحدة» هو دواء لعلاج فطريات القدم (سعفة القدم). و خلال العلاج باستعمال لاميزيل «مرة واحدة»، فإن أعراض فطريات القدم مثل الحكة والإحمرار والتقرّش سوف تختفي.

متى لا ينصح باستخدام لاميزيل «مرة واحدة»؟

في حالة الحساسية لمكوناته النشطة أو لأى من سواهاته.

بالنسبة للأطفال أقل من ١٥ سنة:

لم يتم الكشف عن امكانية استعمال لاميزيل «مرة واحدة» للأطفال دون الخامسة عشرة.

ما هي التدابير الاحترازية التي يجب مراعاتها عند استعمال لاميزيل «مرة واحدة»؟

يستخدم لاميزيل «مرة واحدة» خارجياً فقط ويجب أن لا يصل إلى عيونك. إذا لامس لاميزيل «مرة واحدة» عينيك، فإنه يجب أن تتشطف جيداً بالماء. اتصل على طببك للإشتارة في حالة أنك لم تشعر بالراحة.

يجب استعمال لاميزيل «مرة واحدة» بعناية في حالة الجروح المفتوحة وذلك لأن المنتج يحتوى على كحول يمكن أن يسبب التهيج.

اتصل على طببك للحصول على الإشتارة في حالة حدوث داء فطري شديد أو أن الداء الفطري قد وصل إلى الأظافر.

يرجى إخبار طببك أو الصيدلى في حالة:

• أنك تعانى من أمراض أخرى.

• أنه لديك حساسية، أو

• أنك تتناول أو تستعمل خارجياً أدوية أخرى (حتى لو كانت متوفّرة لديك دون وصفة طبية).

ما هي الآثار الجانبية التي تصاحب استعمال لاميزيل «مرة واحدة»؟

إن الآثار الجانبية التالية يمكن أن تحدث خلال العلاج باستعمال لاميزيل «مرة واحدة»:

أحياناً حساسية سبيطة أو أحمرار أو إحساس ضعيف بحرقة على الجلد، إلا أن العلاج يجب أن يتوقف إلا في حالات نادرة جداً، لوحظ وجود فرط حساسية (حكة واحمرار وطفح جلدي). يجب استشارة الطبيب في هذه الحالات.

إن كنت قد لاحظت أي آثار جانبية أخرى لم يتم وصفها في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طببك أو الصيدلى.

ماذا يجب أن يوضع في الاعتبار إضافة لهذا؟

الأدوية يجب أن تحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

يتم التخزين تحت ٣٠ °م.

يجب أن يتم استعمال الدواء حتى التاريخ المطبوع على العبوة الموجودة عليها إشارة (EXP).

لمزيد من المعلومات اتصل على طببك أو الصيدلى للحصول على النصائح والاستشارة. حيث لديهم تفاصيل أكثر خاصة بالأشخاص في المجال الطبي.

هل يمكن استخدام لاميزيل «مرة واحدة» خلال فترة الحمل أو الرضاعة؟

يجب أن لا يستعمل لاميزيل «مرة واحدة» خلال فترة الحمل أو الرضاعة باستثناء أن يكون ذلك من خلال وصفة طبية. وللإحتياط، فإنه يجب عليك عدم استعمال الدواء خلال فترة الحمل أو الرضاعة إن كان ذلك ممكناً أو أنه عليك أن تبخيّ عن نصائح واستشارة طببك أو الصيدلى الذي تعاملين معه.

(إن هذا دواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحنك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- فالطبيب والصيدلاني هما الخبران بالدواء وبنفعه وضرره.

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لاتترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيادلة العرب