

معلومات لمستخدم الدواء - النشرة الداخلية للمستهضر الصيدلاني

بروكيتين® ١٠ ملجم أقراص صلبة
بروكيتين® ٥ ملجم/٥ مل معلق للشراب
دوميبيريون

قم بإعادة هذه النشرة جوداً قبل استعمال أو تناول هذا الدواء
- احتفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.
- في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر، قم باستشارة الطبيب أو الصيدلاني.
- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية، وإذ يجب عليك عدم إعطائه لأشخاص آخرين، لأن ذلك قد يضرهم، حتى وإن كانوا يعانون من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.
- قم بالاتصال بطبيبك للمعالج أو الصيدلاني في حال زيادة حدة الآثار الجانبية أو الإصابة بأعراض أخرى لم يتم ذكرها في هذه النشرة

في هذه النشرة
١- ما هو بروكيتين وما هي دوائيه استعماله
٢- قبل القيام بتناول بروكيتين
٣- ما هي طريقة تناول بروكيتين
٤- الآثار الجانبية المحتملة
٥- ظروف تخزين بروكيتين
٦- معلومات إضافية
١- ما هو بروكيتين وما هي دوائيه استعماله
بروكيتين هو مسكن للألم، ويعمل على منع الشعور بالألم الناتج عن الإصابة بالتهاب المفاصل أو التهابات المفاصل.
هي دوميبيريون
يستخدم بروكيتين لعلاج
التهاب المفاصل والألم
لتخفيف أعراض التهابات المفاصل.

٢- قبل القيام بتناول بروكيتين
موانع استعمال بروكيتين
- إذا عانيت في السابق من رد فعل سيء لأي من المكونات.
- إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو الكبد (مرض حاد في الكلى أو الكبد).
- إذا كنت تعاني من مرض في الجهاز الهضمي، مثل:
- قرحة المعدة أو الاثني عشر.
- تضيق المريء أو حدوث ثقب فيه.
- إن كنت تعاني من مرض في القلب، أو إذا لاحظت ظهور دم في البراز، أو
- شحير ذلك إلى حدوث نزيف في المعدة أو الأمعاء.
- إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو الكبد.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو الكبد.
إذا كان أي من ذلك ينطبق عليك، قم باستشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول بروكيتين.
معلومات مهمة عن بعض مكونات بروكيتين
- إذا كنت قد أُعريت من قبل الطبيب أنك تعاني من عدم القدرة على تحمل بعض أنواع السكريات، قم باستشارة الطبيب قبل تناول بروكيتين.
- يحتوي هذا المستحضر الدوائي على السوربيتول، يجب أخذ هذا بعين الاعتبار من قبل المرضى الذين يتناولون جرعة قليلة للسوربيتول.
- يحتوي معلق الشراب على السوربيتول، وقد يكون غير مناسب للمرضى الذين يعانون من عدم القدرة على تحمل السوربيتول.
تناول أدوية أخرى
الرجاء أن تشير طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية. إذا تم تناوله بشكل متزامن مع أدوية أخرى، قد يتأثر مفعول بروكيتين أو قد يتغير مفعول الأدوية الأخرى.
أعطى على الأدوية التي من الممكن أن تترافق مع معلق دوميبيريون
- كينازول، يستعمل لعلاج التهابات الفطرية.
- ريتروفيروس، يستعمل لعلاج التهابات الكبدية.
- إذا كنت لديك شكوك حول إذا كان من الممكن أن تتناول هذا الدواء، قم باستشارة الطبيب قبل تناوله.
إذا كنت حامل أو مرضعة
- يجب عدم تناوله إذا كنت حامل أو إذا كنت تتظنون أنك حامل.
- من غير المعروف إذا كان هذا الدواء يسبب الأذى للأطفال، حتى في الولادة.
لذلك لا يوصى بالرضاع من قبل الأمهات المرضعات اللاتي يتناولن بروكيتين.
إعادة التركيبات واستخدام الآلات
لم تعد تستخدم على آلات التعريض أثناء فترة تناول بروكيتين. إذا حصل هذا نتيجة القيادة أو استخدام أي آلات
تعتبر خاصة حول الاستعمال في حالة الشعور بالتهاب عند استعمال وسائل النقل (أي في وسيلة نقل)
يجب عدم استعمال هذا المستحضر لعلاج الشعور بالتهاب عند استعمال وسائل النقل.
قم باستشارة طبيبك أو الصيدلاني عن العلاجات البديلة.

٣- ما هي طريقة تناول بروكيتين
يرعى تناول بروكيتين عن طريق الفم قبل تناول الوجبات. تأخر الامتناع عن تناول الدواء بعد تناوله للوجبات.
الجرعة الموصى بها للبالغين والبالغين الذين تبلغ أوزانهم ٣٥ كجم أو أكثر هي ١٠ ملجم (٥ أقراص) أو ١٠ مل من معلق الشراب، ثلاث مرات يوميًا كحد أقصى عن طريق الفم.
الجرعة الموصى بها للأطفال والبالغين الذين تقل أوزانهم عن ٣٥ كجم هي ٥ ملجم لكل كجم من وزن الجسم ثلاث مرات يوميًا كحد أقصى عن طريق الفم.
الأقراص غير مناسبة للأطفال الذين تقل أوزانهم عن ٣٥ كجم عادةً. يجب عدم استعمال بروكيتين لمدة تزيد عن أسبوع واحد.
يجب تجنب الجرعة للمرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الكلى ومرضهم بشكل منتظم من قبل الطبيب.
قد يتسبب الطبيب بأن تتناول الدواء بطريقة مختلفة. لذلك يجب دائماً أن تتبع تعليمات الطبيب المتعلقة بكمية ووقت تناول الدواء واحرص على قراءة اللاصقة التي يوضعها الصيدلاني. إذا شرحت بأن معلق بروكيتين قوي أو ضعيف جداً، قم باستشارة الطبيب أو الصيدلاني.
إذا تناولت أي شخص أكثر مما يجب
إذا تناولت أي شخص أكثر مما يجب من بروكيتين، قم بالاتصال بالطبيب أو أقرب مركز طبي، مصطحباً معك هذه النشرة والجرعة.
إذا نسيت تناول الدواء
يجب فقط أن تتناول هذا الدواء كما هو مطلوب باتباع تعليمات الجرعة في الأعلى بدون أي تغييرات. تناول الجرعة التالية عند الحاجة طالما لم تتناول أكثر من ٤ أقراص خلال ٢٤ ساعة. لا تتناول جرعة مضاعفة.
٤- الآثار الجانبية المحتملة
مثل كل الأدوية، قد يسبب بروكيتين آثاراً جانبية على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع وتكون عادة متوسطة.
إذا حصل لديك أي من التالي، توقف عن استعمال الدواء واطلب المساعدة الطبية فوراً:
- نزيفات ظهور أعراض مفاجئة أو نزيفات صرع.
- حركات لا إرادية للرجل أو الذراعين والأرجل. ارتعاش شديد، تصلب شديد في العضلات أو ضعف عضلي.
- تغيرات في الرؤية أو الشعور بالوخا أو الشعور بالوخا أو الإغماء.

٦- معلومات إضافية
مناخ يحتوي بروكيتين
أقراص بروكيتين
يحتوي كل قرص صلب على ١٠ ملجم دوميبيريون.
الساعات: سيلولوز، سوليدوم، لوبول، سلفات، ثاني أكسيد السيليكون، كبريتات، كبريتات صوديوم، ميسوم، سبيرون، فينوكسي بروبيل ميثيل سيلولوز، بولي إيثيلين جلايكول، سميثون، كوك، E171.
معلق بروكيتين للشراب
يحتوي كل ٥ مل على ٥ ملجم دوميبيريون.
الساعات: ميثوكريستالين، سيلولوز، كاربوكسي ميثيل سيلولوز صوديوم، سيلولوز، بارابين، بروبيل بارابين، سوبيتول، بولي أكريلات، زيت الفروع، هيدروجيل، سكارين، صوديوم، نيكوتين، الفينول، وسيليكون.
الهيئات:
معلق بروكيتين للشراب: هيئة تنظيمي ١٨٠ مل.
أقراص بروكيتين: هيئة تنظيمي على ٣٠ قرصاً صلباً.
تتوفر عبوات خاصة بالمستشفيات.
للقيام بالإبلاغ عن أي من الأعراض الجانبية
٥- المساعدة الصحية الحكومية
المركز الوطني للتفتيش والسلامة الدوائية
فاكس: ٠٢٥-٦٦٦-١١-٩٦٦
للاتصال بالإدارة التنفيذية للتفتيش وإدارة الأزمات
هاتف: ٠٢٥-٢٨٢٢٢-١١-٩٦٦
تحويل: ٢٢٤٠-٢٢٤٠-٢٢٤٠-٢٢٤٠-٢٢٤٠-٢٢٤٠
الهاتف الصناعي: ٨٠٠٢٤٦٠٠٠
البريد الإلكتروني: npc.drug@sda.gov.sa
المواقع الإلكترونية: www.sda.gov.sa/npc
٥- دول التفتيش الأخرى
الرجاء الاتصال بالمؤسسات والهيئات الوطنية في كل دولة.

٥- علامة تجارية
إن هذا دواء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإمكانياتك، خلافاً للتعليمات بعبءك للشراب.
- تتبع بدقة وصفة الطبيب بطريقة استعمال الدواء وتعليمات الصيدلاني الذي صرفه لك.
- الطبيب الصيدلاني هما الذين يصفان الدواء ويصفون وصفته.
- لا تلعب دوراً في العلاج، فاحرص من لقاء نفسك.
- لا تترك صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- تترك الأدوية في متناول الأطفال.
جلسي وزردي الصحة العرب، وكشاح الصيدلاني العرب.
تمت الموافقة على هذه النشرة من قبل اللجنة العامة للدواء، والدواء

التي
شركة توكو للصناعات الدوائية
ص ب ٣١٣٣، نيوك-المنطقة الصحية السعودية

July 2014
4465091