

Platil®

Clopidogrel

Informations pharmaceutiques

Platil® (Clopidogrel) est un inhibiteur de l'agrégation plaquettaire induite par l'ADP. Il inhibe directement la fixation de l'adénosine diphosphate (ADP) à son récepteur plaquettaire, et donc l'activation du complexe de la glycoprotéine GPIIb/IIIa provoqué par l'ADP.

Indications

Platil® est indiqué pour éviter la formation des caillots sanguins (thrombus) dans les vaisseaux sanguins (artères) devenus rigides, une maladie connue comme athérombose, laquelle peut conduire à la survenue d'évènements athérombotiques tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès.

Platil® est prescrit pour empêcher la formation de caillots sanguins et réduire le risque de survenue de tels évènements graves chez :

- Les patients ayant des artères qui sont rigidifiées (aussi connu comme athérombose)
- Les patients qui ont déjà eu une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, ou ceux qui ont une condition connue comme artériopathie des membres inférieurs, ou ceux qui ont eu un angor instable ou un infarctus du myocarde.

Posologie et administration

La dose habituelle est d'un comprimé de **Platil®** 75mg par jour, à prendre par voie orale pendant ou hors lez repas.

En cas de douleur thoracique grave, 300mg de **Platil®** peuvent être prescrits pour débiter le traitement.

Si vous oubliez de prendre un comprimé de Platil®, mais vous vous en apercevez dans les 12 heures suivantes, prenez votre comprimé immédiatement et prenez le suivant à l'heure habituelle.

Si vous vous en apercevez au delà des 12 heures suivantes, prenez simplement le comprimé suivant à l'heure habituelle. Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous auriez oubliée de prendre.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Si la grossesse est soupçonnée pendant le traitement, le médecin doit être consulté immédiatement avant de prendre **Platil®**.

Les femmes qui allaitent ne doivent pas prendre **Platil®**.

Contre-indications

- Hypersensibilité au clopidogrel ou à un des composants du produit.
- Présence d'une maladie actuellement responsable d'un saignement tel qu'un ulcère de l'estomac.
- Insuffisance hépatique sévère.
- Allaitement.

Précautions

- Si le patient a un risque hémorragique comme un ulcère de l'estomac.
- Des troubles de la coagulation favorisant des hémorragies internes (saignement au sein d'un tissu, d'un organe ou d'une articulation).
- Une blessure grave récente.
- Une intervention chirurgicale récente (y compris dentaire).
- Une intervention chirurgicale prévue dans les sept jours à venir (y compris dentaire).
- La prise d'autres médicaments. (conf. Interactions médicamenteuses)

Effets secondaires

Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés avec **Platil®** sont :

ecchymose, hématome, saignement du nez, sang dans les urines, hémorragie gastrique ou intestinale. Dans des rares cas, des hémorragie oculaires, cérébrales, pulmonaires ou articulaires ont également été rapportés.

Les autres effets secondaires rapportés avec **Platil®** sont :

- Diarrhée, douleur abdominale, constipation, nausée, vomissement, digestion difficile, ou brûlure d'estomac.
- Vertige, céphalée, baisse de tension, confusion, hallucinations.
- Problèmes cutanés tels qu'éruptions et démangeaison cutanée, réactions allergiques généralisés.
- Douleur articulaire, fièvre, trouble du goût.

Contactez immédiatement votre médecin en cas de survenue de :

- Fièvre, signes d'infection ou fatigue importante.

- Jaunisse car des cas de troubles hépatiques ont été très rarement rapportés.

Interactions médicamenteuses

- La prise de warfarine n'est pas recommandée lors d'un traitement par **Platil®**.
- Le médecin devrait être informé avec précision en cas d'utilisation d'un anti-inflammatoire non stéroïdien ou de l'héparine (un médicament utilisé pour diminuer la coagulation du sang).
- Une utilisation occasionnelle d'acide acétylé salicylique (pas plus que 1000 mg sur une période de 24 heures) ne doit généralement pas causer de problèmes, mais une utilisation prolongée dans d'autres circonstances doit être discutée avec votre médecin.

Présentations

Platil® 75mg comprimés pelliculés: Clopidogrel 75mg/comprimé.
(30 comprimés).

(Ceci est un médicament - Garder les médicaments hors de la portée des enfants.)

- Le médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et la mode d'emploi prescrite, ainsi que les conseils de votre pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien sont les meilleures personnes à connaître le médicament, ses avantages et ses risques.
- N'arrêter pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne répéter pas le médicament sans l'avis de votre médecin