

كيف ينجز ربيف

• إنجز مع حق.

• تضمن الواقع الجيد أعلى الخذين وأسلف الطعن.

الملكية مثل قلم أو سهم. ينسج بأن تلاحظ وتغير موقع الحق لكن لا تغير ملقطة من الجلد كثيراً بغرض الدخ من مخاطرة الإصابة

ملاحظة: لا تستعمل أي ملقطة تشعر فيها بكل أو عقد صلبة أو

الماء، أعلم طبيك أو أخصائي الرعاية الصحية باى شيء تجده.

• أغلب جلدك جيداً بالساخن والماء.

• إنزع ملقطة ربيف من سوتها بواسطة تغيير طبلة الستيك.

قبل الحق، استعمل مسححة كحول لتنظيف الجلد عند موقع الحق. دع الجلد يجف. إنما ي بعض الكحول على الجلد قد تشعر ببعض العرق.

اقرط الجلد برقف حول موقع الحق (الرفع قليلاً).

واضعه مصعكم على الجلد بالقرب من موقع الحق، إغز البرة براوية مستقمية في الجلد بميشة سرعة وينبات.

الحق الدواء بدغ المكبس ببطء وبثبات (انفع المكبس حتى النهاية إلى أن تغز المحقق).

ضع قطعة من القطن على موقع الحق وأخرج الإبرة من الجلد.

ذلك بلفظ موقع الحق، بواسطة كرتونة قطنية حادة أو قطعة شاش.

• تخلص من كل الأشياء المستعملة: عندما تنتهي من الحق، أصل الحقة على الفور في متوعن مناسب.

مدة العلاج

سوف يجذب لك طبيك مدة العلاج بربيف. لا توفر العلاج بدون الاتصال طبيك.

في الوقت الحاضر، من غير المعروف المدة اللازمة لعلاج المرضي. لم يتم بين سلامة ربيف وفعاليته ما بعد ٤ ساعات في دراسات جزئية.

• ظهرت المطالعات المشورة تشير إلى أن المعايير تتفق إلى ما بعد عكسية بعد السنوات القليلة الأولى من العلاج. يوصى بتقييم المدة المرضية مرة كل ستون على الأقل في فترة الأربع شهور، حيث تختلف بربيف ومن ثم يقرر الطبيب العلاج طول الأمد على أساس فردية.

تفويت ربيف

إذا تم تقوية ربيف، واصل الحقن ابتداء من يوم الجمعة الثالثة المفترضة.

لا تأخذ جرين للتعرض عن الجرعة التي تسببت.

إذا كان لديك أي أسلحة حول استعمال هذا المستحضر، أصل الطبيب أو الصيدلي.

زيادة الجرعة

إذا استعملت ربيف بأكثر من الجرعة الموصوفة، اتصل بطبيبك على الفور.

يجب إدخال المرضى الذين حقروا بجرعة زائدة إلى المستشفى للمرة الثانية.

و يجب إعطاءهم العلاج الداعم المناسب.

التخزين والتقط

احفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

لا تستعمل ربيف بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدون على البطاقة.

احفظ الدواء في ثلاجة بين ٨-٢٠ درجة مئوية. لا تجعله يتجمد.

احتلال التجميد، تجنب وضع جوار "الغافر".

بغرض الاستعمال المنشق، يمكن إخراج ربيف في درجة حرارة لا تتجاوز ١٤ درجة حرارة لا تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

ومع ذلك، بعد هذه الفترة يجب إعادة ربيف إلى الثلاجة واستعماله قبل انتهاء تاريخ الصلاحية.

احفظ الدواء في علبته الأصلية لحمايته من الضوء.

العبوات

محفنة مسحية مسيرة مسيرة جاهزة للاستعمال مع إبرة ثالثة الحق ذاتي.

غيره من ٣ و ١١ محفنة مسحية مسيرة.

قد لا يتم تسويق جميع العبوات.

الشركة الصاحبة حق التسويق في الاتحاد الأوروبي

ميرك سيرورن أوروبا لمتد

الملكة المتحدة

الشركة المصنعة

ميرك سيرورن أوروبا، بي، أي، باري - إيطاليا

تاريخ التشرعة

٢٠١٣ أكتوبر ٢٨

لمزيد من الاستفسارات داخل مصر، الاتصال برقم ١٩٩٥٥

هذا دواء

الدواء مستحضر قد يوثر على صحتك واستهلكه خلافاً

- اتبعه وتعليمات الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليهما وتعليمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء.

- لا توقف قترة الملاجع الموصوفة بفترة.

- لا تكرر صرف الدواء دون وصفة طبية.

- لا تترك الدواء في متناول أيدي الأطفال

أو جلطات الدم وبالتالي تحت اضطرابات في الروية مما يؤدي إلى

فقدان النصر الشكير.

الاضطرابات الجسدية

(طفح، طفح أحمراري، طفح يتعقى ذو بثرات)

شائع. حالات نادر قد يوثر على المرضي تخرُّص أو تغير للجلد،

كالعسر الوحش الذي يذكر عليه الفار الملاجع، لذلك يجب إعادة الفحص

الثابت لاجسام مضادة معالجة.

بالرغم من أنه لم يتم بعد التوضيح الكامل لأهمية الجلدية لتفريح الأجسام

المضادة، تم ظهور ظهور الأجيام المضادة المعادلة في بعض الحالات، وانتهت الشيارة

بالرنين المغناطيسي. لا يمكن استعمال فحص أجسام مضادة دقيقة وأي تفاقم لهذه

الحالات.

الحالات أو الطفح الجلدي (طفح، طفح أحمراري، طفح يتعقى ذو بثرات)

شائع. إنما يثير تأثير الجلد عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

لأن هذه الحالات قد تكون لها عواقب خطيرة وتتضمن حالات تهدّد

الحياة.

الاضطرابات المصلية البوليوكال

(طفح، طفح أحمراري، طفح يتعقى ذو بثرات)

شائع، الذي يثير تأثير على الجلد بالقرب من موقع الحق، إنما يثير عرض ملحوظ

الحادي والثانية.

الاضطرابات العامة

قد يحدث عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

على القادة.

الاضطرابات الشعيرية

قد يثير عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

على القادة.

الاضطرابات الشعيرية

قد يثير عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

على القادة.

الاضطرابات الشعيرية

قد يثير عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

على القادة.

الاضطرابات الشعيرية

قد يثير عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

على القادة.

الاضطرابات الشعيرية

قد يثير عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

على القادة.

الاضطرابات الشعيرية

قد يثير عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

على القادة.

الاضطرابات الشعيرية

قد يثير عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

على القادة.

الاضطرابات الشعيرية

قد يثير عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

على القادة.

الاضطرابات الشعيرية

قد يثير عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

على القادة.

الاضطرابات الشعيرية

قد يثير عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

على القادة.

الاضطرابات الشعيرية

قد يثير عرض ملحوظ مختلفاً لكشف وجود أجسام مضادة في المصيل

وتحديثات مختلفة لإيجابية الجسم المضاد، يحدّث إلى طبيتك فوراً، لأنّه يجب إعادة الفحص

على القادة.

الاضطرابات الشعير