

ليبينثيل 145 ملغم، قرص مغلف

يجب قراءة كامل هذه النشرة بانتباه قبل تناول هذا الدواء.
• احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى إعادة قراءتها من جديد.
• إذا كانت لديك أسئلة، إذا كان لديك شك، أطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو من الصيدلي.
لقد تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي. لا تقم أبداً بإعطائه لشخص آخر، حتى في حالة وجود أعراض مشابهة، لأنه قد يتعرض للضرر بسبب ذلك.

ليبينثيل 145 ملغم، قرص مغلف

المادة الفاعلة هي: فينوفيرات (145 ملغم)

المكونات الأخرى هي: هيبروميلوز، دوكوسات الصوديوم، سوكروز، لوريل سولفات الصوديوم، لاكتوز أحادي الهيدرات، سليولوز كريستالين متناهي الصغروسيليكات كوليدي عديم الماء، كروسوبوفيدون، ستيرات المغنسيوم.
تركيبة غلاف القرص: OPADRY®: كحول متعدد الفينيل، ثاني أكسيد التيتان (E171)، تالك، ليسيتين الصويا، صمغ كزانتان.

المالك:

Laboratoires FOURNIER S.A.
28, boulevard Clemenceau
21000 DIJON, FRANCE

المصنّع:

RECIPHARM FONTAINE
Rue des Prés - Potets
21121 FONTAINE LES DIJON, FRANCE

ما هو الليبينثيل 145 ملغم، قرص مغلف، وفي أي حالات يستعمل؟

يقدم هذا الدواء تحت شكل أقراص مغلفة. علبه من 30 قرصاً.
هذا الدواء يؤدي إلى تخفيض الدهون في الدم / تخفيض إنتاج الكوليسترول والترايغليسيريد في الدم/ فيبرات.
يستعمل هذا الدواء من أجل تخفيض فرط الكوليسترول في الدم (في حالة الارتفاع غير العادي لمعدل الكوليسترول في الدم) و/أو فرط الترايغليسيريد (في حالات الارتفاع غير العادي لمعدل الترايغليسيريد - الدهون - في الدم) لدى البالغين، عندما تكون الحماية المناسبة المتبعة غير كافية.

معلومات ضرورية قبل تناول ليبينثيل 145 ملغم، قرص مغلف

لا يستعمل ليبينثيل 145 ملغم، قرص مغلف في الحالات التالية:

- قصور كبدى (اضطراب في وظائف الكبد)،
- قصور كلوي (اضطراب في وظائف الكلى)،
- حساسية معروفة تجاه الفينوفيرات، ليسيتين الصويا، الفستق، زيت الفستق أو أحد مكونات هذا الدواء،
- التفاعلات الضوئية المؤدية أو التحسسية (تفاعلات الجلد بعد التعرض للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية) خلال العلاج بالفينوفيرات أو بالمواد المرتبطة بها بنائياً، بشكل خاص كيتوبروفين (دواء مضاد للالتهاب)،
- حساسة صفراوية،
- التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس الذي يسبب الآم في البطن) إلا إذا كان سبب التهاب البنكرياس الحاد هو ارتفاع حاد في مستوى الدهون في الدم،
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة،
- لدى الأطفال.

يجب اتخاذ احتياطات خاصة مع ليبينثيل 145 ملغم، قرص مغلف

- في حالة المعاناة من الآلام العضلية، يجب استشارة الطبيب المعالج فوراً (يرجى مراجعة فقرة «ما هي الأعراض الجانبية، إن وجدت؟»).
- يجب إجراء اختبارات الكبد قبل بدء العلاج وتكرر بانتظام خلال السنة الأولى من العلاج (بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر).
- يتوجب مراقبة نسبة الكرياتينين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العلاج.
- بسبب وجود اللاكتوز، يجب عدم استخدام هذا الدواء في حالات الجلاكتوزيميا الوراثية ومتلازمة سوء امتصاص الجلوكوز والجلاكتوز أو مرض نقص أنزيم اللاكتاز (أمراض أيضية نادرة).

هذا دواء

- إن هذا الدواء هو عبارة عن مستحضر يؤثر على صحتك واستعماله خلافاً للتعليمات يشكل خطراً عليك.
- اتبع وصفة الطبيب بدقة وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلاني الذي باع لك الدواء.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا تقطع فترة العلاج الموصوف من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة طبيبك.
- إحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.
- مجلس وزراء الصحة العرب - اتحاد الصيادلة العرب.

الاستعمال خلال الحمل والإرضاع

ينصح بعدم تناول هذا الدواء من قبل المرأة الحامل وأثناء الإرضاع، نظراً لعدم توفر أي معلومات.
في حال اكتشاف الحمل أثناء تناولك لهذا الدواء يجب إيقاف تناول الدواء واستشارة الطبيب المعالج.
يجب أن تستشير الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء.

لائحة السواغات التي لها تأثير معروف

لاكتوز، ليسيتين الصويا.

تفاعلات مع أدوية أخرى:

لتفادي التداخلات الناتجة عند أخذ أدوية مختلفة في نفس الوقت يجب دائماً وبشكل فوري إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن أي دواء تتناولونه أو سبق تناوله منذ فترة قريبة، حتى لو كان الأمر يتعلق بدواء يمكن الحصول عليه من دون وصفة طبية، بالأخص عند تناول دواء آخر للكوليسترول (فيبرات أو ستاتين)، مضادات التخثر التي يتم تناولها عبر الفم أو السيكلوسبورين.

كيفية تناول ليبينثيل 145 ملغم، قرص مغلف؟

لدى البالغين وكبار السن:
إن المقدار الموصى به هو قرص واحد في اليوم.

لدى المصابين بالقصور الكلوي:

يوصى بتخفيض المقدار.
في كل الأحوال عليك الالتزام بدقة بوصفة طبيبك.

إذا كان لديك انطباع أن ليبينثيل 145 ملغم، قرص مغلف هو قوي جداً أو ضعيف جداً، استشر طبيبك أو الصيدلي.

يتم تناوله عبر الفم.

يتم العلاج عبر تناول جرعة واحدة في اليوم.

يجب ابتلاع القرص بكامله أثناء تناول الطعام.

يشكل هذا الدواء بالمواكبة مع نظام الحمضية علاج أعراض ويجب تمديده مع المراقبة المنتظمة. ومن أجل استعمال أمثل لا بد من الخضوع لرقابة طبية منتظمة.

إذا قمت بتناول كمية إضافية من ليبينثيل 145 ملغم، قرص مغلف دون موجب لذلك: استشر فوراً طبيبك أو الصيدلي.

إذا نسيت تناول ليبينثيل 145 ملغم، قرص مغلف: لا تضاعف الكمية لتعويض نقص المقدار الذي نسيت تناوله.

ما هي الأعراض الجانبية، إن وجدت؟

- مثل جميع الأدوية الأخرى، قد يؤدي تناول ليبينثيل 145 ملغم، قرص مغلف إلى ظهور أعراض جانبية غير مرغوب فيها:
- اضطرابات في الجهاز الهضمي أو الأمعاء (آلام في البطن، غثيان، تقيؤ، إسهال و انتفاخ البطن)،
- ظهور رذات فعل جلدية (التهيج، الحكة) من نوع الحساسية أو تحسس للضوء على مستوى الجلد (خلال التعرض للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية) في المناطق المعرضة للشمس أو مصابيح الأشعة فوق البنفسجية،
- ارتفاع عابر في كمية ترانز أمينيز (انزيمات الكبد)، يرقان،
- آلام عضلية.

إذا شعرت بأي ألم في العضلات أو حساسية عضلية مؤلمة أو ضعف في العضلات، اتصل بطبيبك فوراً لأن الاضطرابات العضلية قد تكون خطيرة في بعض الحالات النادرة.

- في حالات نادرة: حساسة صفراوية، التهاب الكبد، عجز، التهاب البنكرياس، فقدان الشعر، اعتلال رنوي خلالي،
- من الممكن ملاحظة ارتفاع في نسب الكرياتينين والبول في الدم، بالإضافة إلى نقص نسبة خضاب الدم وعدد الكريات البيض،
- التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس الذي يسبب الآم في البطن)،
- انسداد ختاري: سدة رئوية (جلطة يمكنها التسبب بالآم في الصدر وضيق نفس)، خثار وردي عميق (جلطة قد تتسبب باحمرار وآلم وانتفاخ في الساق).

قم بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن أية أعراض غير مرغوب فيها لم يتم ذكرها في هذه النشرة.

كيفية حفظ ليبينثيل 145 ملغم، قرص مغلف

يحفظ ضمن درجة حرارة لا تتجاوز +30 د.م.
يتأثر هذا الدواء بالرطوبة، لذلك يحفظ ضمن غلافه الخارجي.
يجب أن يبقى بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.
لا تستعمل الدواء بعد تاريخ انتهاء الاستعمال المذكور على العلبة.
تاريخ آخر تصديق لهذه النشرة: يونيو 2010.