

حبات للucus

# اوروكال® الكالسيوم

٥٠٠ ملغ

١٢٥٠ ،٠٠ ملغ

١٠٠٠ ملغ

سواع (صوريبيتون، بولييفيدون، سكريات المفترزيوم، أحادي وثاني وثلاثي الفليسريدي، زيوت البرترال الأساسية) يكفيه كافية لكل حبة للucus

التركيز  
كربيونات الكالسيوم

كمية تعادل ٥٠٠ ملغ من الكالسيوم المادة

أسباراتام

يعتني هذا الدواء على الكالسيوم. يوصى به لتعويض النقص في الكالسيوم أثناء فترة النمو والحمل والإرجاع

وللحماية ترقة المظاهم.

## مضادات الاستطباب

فقط، كالسيوم الدم (ارتفاع غير طبيعي لنسبة الكالسيوم في الدم).

فقط، كالسيوم البول (تصريف مفرط للكالسيوم في البول).

الحصاة الناجمة عن الكالسيوم، تكس الخلايا.

الإفراط الطويل الذي يؤدي إلى فرط الكالسيوم في البول / أو فرط الكالسيوم في الدم.

## احتياطات الاستعمال

إذا أخذت العلاج لمدة طويلة، يجب فحص نسبة الكالسيوم في البول بانتظام.

في حال تناول فيتامين D في نفس الوقت، يجب فحص نسبة الكالسيوم في الدم وفي البول بانتظام.

في حال تلقى علاج بقلورور الصوديوم؛ يتطلب تناول الكالسيوم (الاسيما مع الفيتامين D) الإشراف الطبي المستمر.

في حال تلقى علاج بالتيتراسيكلينات (نوع من المضادات الحيوية) عن طريق الفم، يتطلب تناول هذا الدواء ٣ ساعات على الأقل.

بسبب وجود مادة الأسباراتام في الدواء؛ يجب تفادى تناول هذا الدواء إذا كان المريض يعاني من التهابات في القولون.

التدخّلات بين الأدوية والتدخلات الأخرى  
لتقدّي التدخّلات المحتملة بين عدة أدوية. يجب تلقّائياً إشعار الطبيب أو الصيدلي في حال تلقى أي علاج آخر في نفس الوقت.

## الجرعات - طريقة الاستخدام

عن طريق الفم، تناول جرعة مفرطة.

- البالغين: تناول الكالسيوم بشكل عام وترقق المظاهم: ٢ إلى ٢ حبات في اليوم.

- الأطفال: تناول الكالسيوم أثناء فترة النمو: ١ إلى ٢ حبة في اليوم أخذنا بالاعتبار للوزن واللمامة.  
في جميع الحالات، يجب التقييد تقدير صارماً وبوصفة الطبيب.

ما يجب عمله في حال تناول جرعة مفرطة

في حال تناول جرعة مفرطة أو التسمم المرضي، يجب إشعار الطبيب فوراً.

الأثار الثانوية غير المرغوب فيها

انخفاض الفم أثناء مص الدواء.

## طريقة الحفظ

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية

المصنوع الحفظ المسؤولة

NYCOMED PHARMA AS, Drammensveien 852, P.O. Box 205, N-1372 Asker, NORWAY

يجب غلق القارورة جيداً بعد الاستعمال.

لا يجوز تخفيي التاريخ الأقصى للاستعمال المذكور على العلبة.