بيغ وين® إكس أر

ميتفورمين هيدروكلوريد

ZENTIVA
A SANOFI COMPANY

ما هو بيغ وين® إكس أر؟

ـ تحتوي كل مضغوطة بيغ وين® إكس أر ٥٠٠ ملبسة بالفيلم ممتدة المفعول على ٥٠٠ ملغ من العامل الفعال ميتفورمين هيدروكلوريد.

ـ تحتوي كل مضغوطة بيغ وين® إكس أر ٧٥٠ ملبسة بالفيلم ممتدة المفعول على ٧٥٠ ملغ من العامل الفعال ميتفورمين هيدروكلوريد.

ـ تحتوي كل مضغوطة بيغ وين® إكس أر ١٠٠٠ ملبسة بالفيلم ممتدة المفعول على ١٠٠٠ ملغ من العامل الفعال ميتفورمين هيدروكلوريد.

المواد غير الفعالة: كربوكسي ميثيل سلولوز الصوديوم، بوفيدون، مغنيزيوم ستيارات، ثنائي أكسيد السيليكون الغرواني، هيدروكسي بروبيل ميثيل السلولوز، غليكول بولي ايثيلين، تالك، ثاني أكسيد التيتانيوم.

لماذا يجب أن تتناول بيغ وين® إكس أر؟

إن بيغ وين® إكس أر دواء مضاد للسكري يُأخذ عن طريق الفم للتحكم بمرض السكري من النمط ٢ (أي السكري غير المعتمد على الإنسولين). يظهر السكري عندما يكون الجسم غير قادر على إستهلاك السكر المتناول، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في تركيز السكر في الدم. يُخفض بيغ وين® إكس أر تركيز السكر في الدم وذلك عن طريق خفض إنتاج السكر في الكبد، والحد من إمتصاص السكر المتناول من الأمعاء وزيادة حساسية أنسجة الجسم للإنسولين. ليس لهذا الدواء أي تأثير على إنتاج الإنسولين ولا يعتبر بيغ وين® إكس أر بديلاً عن الإنسولين. يمكن أن يوصف بيغ وين® إكس أر لوحده أو بالتزامن مع الإنسولين أو مع غيره من الأدوية المضادة للسكري.

ماذا يجب أن تعلم عن بيغ وين® إكس أر؟

إن بيغ وين® إكس أر هو دواء مساعد ولا يحل مكان الحمية الغذائية الجيدة أو التمرين. لا يمكن إعتبار بيغ وين® إكس أر كأحد أشكال الإنسولين التي يتم تناولها عن طريق الفم ولا يمكن إستعماله بدل الإنسولين.

ما هي جرعة بيغ وين® إكس أر المعتمدة؟

للبالغين

تبلغ جرعة بيغ وين® إكس أر في بداية العلاج مضغوطة واحدة من عيار ٥٠٠ ملغ مرة يومياً تؤخذ مع وجبة العشاء. يمكن زيادة الجرعة اليومية بمقدار ٥٠٠ ملغ بشكل أسبوعي للوصول إلى جرعة قصوى تبلغ ٢٠٠٠ ملغ من بيغ وين® إكس أر مرة يومياً تؤخذ مع وجبة العشاء. في حال تبين أن جرعة ٢٠٠٠ ملغ من بيغ وين® إكس أر مرة يومياً غير قادرة على السيطرة على تركيز السكر في الدم قد يقترح الطبيب أن تتناول مضغوطة واحدة من بيغ وين® إكس أر ١٠٠٠ ملغ مرتين يومياً.

وفي حال كنت بحاجة إلى جرعات أعلى قد يقرر الطبيب أن تتناول بيغ وين®.

يستخدم بيغ وين® إكس أر ٧٥٠ وبيغ وين® إكس أر ١٠٠٠ للمرضى الذين يعالجون مع بيغ وين® إكس أر أو بيغ وين®.

يجب أن تعادل جرعة بيغ وين® إكس أر ٧٥٠ أو بيغ وين® إكس أر ١٠٠٠ الجرعة اليومية من بيغ وين® إكس أر أو بيغ وين®. الجرعة القصوى من بيغ وين® إكس أر ٧٥٠ وبيغ وين® إكس أر ١٠٠٠ هي على التوالي ١٥٠٠ ملغ و ٢٠٠٠ ملغ يومياً مع وجبة المساء.

للأولاد

لم يُختبر بيغ وين® إكس أر على الأولاد ما دون السابعة عشر من عمرهم.

للمسنين

يوصى بإستخدام جرعات أصغر عند المسنين والأشخاص الذين يعانون من سوء تغذية بسبب الضعف الكلوي المحتمل الذي قد يصيبهم، الأمر الذي قد يعزز إمكانية التعرض للتأثيرات الجانبية.

كيف يتم تناول بيغ وين® إكس أر؟

إلتزم بإرشادات الطبيب إلتزاماً دقيقاً عند تناول بيغ وين® إكس أر. يجب تناول بيغ وين® إكس أر مع الوجبات لتخفيف إمكانية وقوع غثيان وإسهال خاصة في أسابيع العلاج الأولى. يجب تناول مضغوطة بيغ وين® إكس أر كاملة دون مضغها أو تكسيرها. في بعض الأحيان قد تظهر المكونات غير الفعالة في الخروج على شكل كتلة رطبة ناعمة.

ما العمل عند تفويت موعد إحدى الجرعات؟

تناول الجرعة التي فوتها حالما تدرك أنك نسيتها. في حال تذكرت في وقت قريب من موعد الجرعة التالية، أهمل الجرعة التي فوتها وإستأنف برنامج العلاج المعتاد. لا تتناول جرعتين في الوقت نفسه.

ما العمل عند تناول جرعة مفرطة؟

إن تناول جرعة مفرطة من أي دواء قد يؤدي إلى عواقب خطيرة. في حال شككت بأنك تناولت جرعة مفرطة، إستشر طبيبك فوراً. قد يؤدي أي فرط لجرعة بيغ وين® إكس أر إلى الإصابة بالحماض اللبني (أي إزدياد حمض اللبن في الدم)، وهو من المضاعفات التي تصيب النشاط الإستقلابي (أي النشاط الخاص بالتحويل الغذائي).

هل من تداخل بين بيغ وين® إكس أر وأي طعام أو دواء؟

يمكن تناول بيغ وين® إكس أر مع معظم الأدوية الأخرى؛ لكن يجب أن تستشير طبيبك قبل تناول بيغ وين® إكس أر بالتزامن مع أي من الأدوية التالية: محصرات الكالسيوم، سيميتيدين، أميلورايد، ديجوكسين، إستروجين، فيوروسيميد، توترازين، غليبنكلاميد، إيزونيازيد، موانع الحمل الفموية، مورفين، نيفيديبين، كينيدين، فينيتوين، بروكايناميد، كينين، فانكوميسين، رانيتيدين، ترايمثوبريم، الاستيرويدات مثل البريدنيزون، الهورمونات الخاصة بالغدة الدرقية، ومدرات البول. يجب تلافي تناول كميات مفرطة من المشروبات الكحولية مع بيغ وين® إكس أر لأنها تعزز مفاعيل بيغ وين® إكس أر مما يؤدي إلى إنخفاض مستويات السكر في الدم.

ما هي التأثيرات الجانبية لبيغ وين® إكس أر؟

قد تتضمن التأثيرات الجانبية ما يلي

إسهال، إنزعاج في المعدة، غازات، صداع، عسر هضم، غثيان، وقيء. من الآثار الجانبية النادرة جداً ولكن الخطيرة هي الحماض اللبني. إن الحماض اللبني هو أحد المضاعفات الناتجة عن الإختلال في النشاط الإستقلابي والذي يؤدي إلى تراكم حمض اللبن في الدم مسببا عدة أعراض كالدوار، والضعف، وإنخفاض حرارة الجسد، والشعور بصعوبة في التنفس أو التنفس بسرعة، والنعاس، وتباطؤ أو عدم إنتظام في دقات القلب، وألم عضلي غير معتاد. إن المرضى الذين يعانون من مشكلة كبدية و/أو كلوية، أو من فشل القلب الإحتقاني، أو من مشاكل طبية متعددة، أو الذين يتناولون عدة أدوية قد يكونون أكثر عرضة لهذه المضاعفات.

الإحتياطات الواجب إتخاذها عند تناول بيغ وين® إكس أر

سيقيّم طبيبك حالة كليتيك قبل بدء العلاج ببيغ وين® إكس أر ومرة على الأقل كل عام بعد ذلك لدى المرضى العاديين وبشكل أكثر إنتظاما لدى المسنين. في حال أصبت بمشاكل كلوية خلال فترة العلاج، قد تضطر إلى وقف العلاج. يجب الإمتناع عن تناول بيغ وين® إكس أر في خلال اليومين الذين يسبقان وليليان موعد خضوعك لأي إجراء يستخدم الأشعة السينية مع حقنة ملونة، كذلك قبل الخضوع لعملية جراحية، إلا في حال كانت هذه العملية بسيطة، ويُستأنف العلاج بعد معاودة تناول الطعام والسوائل بشكل طبيعي. يجب تلافي تناول كميات مفرطة من المشروبات الكحولية مع بيغ وين® إكس أر لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بالحماض اللبني كما أن أي خلل في وظيفة الكبد قد يكون سببا للإصابة بالحماض اللبني. لذلك من الضروري أن يتحقق طبيبك بطريقة منتظمة من سلامة وظيفة الكبد. في حال تعرضت لمشاكل في الكبد خلال فترة العلاج، قد تضطر إلى التوقف عن تناول الدواء. لا يسبب بيغ وين® إكس أر أي نقص في سكر الدم، لكن هذا النقص قد يحدث لدى المسنين الذين يعانون من سوء تغذية كما قد يصيب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كلوية، وكبدية، ومشاكل في الغدة الكظرية أو الغدة النخامية. يزداد خطر التعرض إلى نقص في سكر الدم عند تفويت وجبات الطعام، وإستهلاك المشروبات الكحولية، والإفراط في النشاط البدني. عليك إعلام طبيبك في حال فقدت كمية كبيرة من السوائل إثر تعرضك للقيء أو الإسهال، أو لأي مشكلة أخرى، لأن أي إجتفاف يزيد من إمكانية الإصابة بالحماض اللبني.

في أي حالات عليك الإمتناع عن تناول بيغ وين® إكس أر؟

يجب الإمتناع عن تناول بيغ وين® إكس أر إذا كنت مصاباً بخلل في الوظيفة الكلوية أو الكبدية، أو بالحماض الكيتوني، أو إذا كنت تعاني من تفاعلات تحسسية ضد الدواء أو ضد أي من مكوناته، أو في حال كنت تتناول أدوية لمعالجة فشل القلب الإحتقاني.

ماذا يجب أن تفعلي إذا كنت حاملاً أو مرضعة؟

يجب عدم تناول بيغ وين® إكس أر خلال فترة الحمل، لذلك عليك إعلام طبيبك في حال كنت حاملاً أو تخططين للحمل خلال فترة العلاج ببيغ وين® إكس أر. إنه من غير المعلوم إذا كان بيغ وين® إكس أر يفرز في حليب الأم لذلك عليك إستشارة طبيبك بشأن تعليق العلاج أو وقف الرضاعة خلال فترة العلاج ببيغ وين® إكس أر.

كيف يُحفظ بيغ وين® إكس أر؟

يُحفظ بيغ وين® إكس أر في مكان لا تتعدى الحرارة فيه ٢٥ درجة مئوية.
يُحفظ في العبوة الأصلية بحالة سليمة.
تاريخ المراجعة: حزيران ٢٠١١
تم تصنيعه عبر
بنتا ش.م.ل. ـ ضبيه، لبنان

ZENTIVA
A SANOFI COMPANY
لـ BPI

هذا دواء:

ـ الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
ـ إتبع وصفة الطبيب بدقة، وإرشادات الإستعمال، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
ـ إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في الأدوية، فوائدها ومخاطرها.
ـ لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
ـ لا تكرر نفس الوصفة دون إستشارة طبيبك.
ـ إحفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مؤتمر وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلة العرب