

تناول بيغ وين® إكس آر بالتزامن مع أي من الأدوية التالية: محصرات الكالسيوم، سيميتيدين، أميلوريه، ديجوكسين، إستروجين، فينوثروين، فينوبروفين، تورازين، غليبنكلاميد، إيزونيازيد، موانع الحمل الفعالية، ميتفورمين هيدروكلوريد.  
- تحتوي كل مضغوطة بيغ وين® إكس آر ٥٠٠ ملبسة بالفيلم ممتدة المفعول على ٥٠٠ ملغ من العامل الفعال ميتفورمين هيدروكلوريد.  
- تحتوي كل مضغوطة بيغ وين® إكس آر ٧٥٠ ملبسة بالفيلم ممتدة المفعول على ٧٥٠ ملغ من العامل الفعال ميتفورمين هيدروكلوريد.  
- تحتوي كل مضغوطة بيغ وين® إكس آر ١٠٠٠ ملبسة بالفيلم ممتدة المفعول على ١٠٠٠ ملغ من العامل الفعال ميتفورمين هيدروكلوريد.

المواد غير الفعالة: كربوكسي ميثيل سلولوز الصوديوم، بوفيدون، مغنيزيوم ستيرات، ثنائي أكسيد التيتانيوم، هيدروكسي بروبييل ميثيل السلولوز، غليكول بولي إيثيلين، تالك، ثاني أكسيد التيتانيوم.

لماذا يجب أن تتناول بيغ وين® إكس آر؟  
إن بيغ وين® إكس آر يحد من مضاد للسكري يأخذ عن طريق الفم للتحكم بمرض السكري من النمط ٢ (أي السكري غير المعتمد على الأنسولين). يظهر السكري عندما يكون الجسم غير قادر على استهلاك السكر المتناول. الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في تركيز السكر في الدم. يُخفّض بيغ وين® إكس آر تركيز السكر في الدم وذلك عن طريق خفض إنتاج السكر في الكبد، والحد من إمتصاص السكر المتناول من الأمعاء وزيادة حساسية أنسجة الجسم للإنسولين. ليس لهذا الدواء أي تأثير على إنتاج الأنسولين ولا يعتبر بيغ وين® إكس آر بديلاً عن الأنسولين. يمكن أن يوصف بيغ وين® إكس آر لوحده أو بالتزامن مع الأنسولين أو مع غيره من الأدوية المضادة للسكري.

لماذا يجب أن تعلم عن بيغ وين® إكس آر؟  
إن بيغ وين® إكس آر هو دواء مساعد ولا يحل مكان الحماية الغذائية الجيدة أو التمرين. لا يمكن استعمال بيغ وين® إكس آر كأحد أشكال الأنسولين التي يتم تناولها عن طريق الفم ولا يمكن إستعمالها بدل الأنسولين.

ما هي جرعة بيغ وين® إكس آر المعتمدة؟  
للبالغين  
تبلغ جرعة بيغ وين® إكس آر في بداية العلاج مضغوطة واحدة من عيار ٥٠٠ ملغ مرة يومياً تؤخذ مع وجبة العشاء. يمكن زيادة الجرعة اليومية بمقدار ٥٠٠ ملغ بشكل أسبوعي للوصول إلى جرعة قصوى تبلغ ٢٠٠٠ ملغ من بيغ وين® إكس آر مرة يومياً تؤخذ مع وجبة العشاء. في حال تبين أن جرعة ٢٠٠٠ ملغ من بيغ وين® إكس آر مرة يومياً غير قادرة على السيطرة على تركيز السكر في الدم قد يقترح الطبيب أن تتناول مضغوطة واحدة من بيغ وين® إكس آر ١٠٠٠ ملغ مرتين يومياً.  
وفي حال كنت بحاجة إلى جرعات أعلى قد يقترح الطبيب أن تتناول بيغ وين® إكس آر باستخدام بيغ وين® إكس آر ٧٥٠ وبيغ وين® إكس آر ١٠٠٠ للمرضى الذين يعالجون مع بيغ وين® إكس آر أو بيغ وين® إكس آر ٧٥٠ أو بيغ وين® إكس آر ١٠٠٠ الجرعة اليومية من بيغ وين® إكس آر أو بيغ وين® إكس آر ٧٥٠ وبيغ وين® إكس آر ١٠٠٠ ملغ وبيغ وين® إكس آر ١٥٠٠ ملغ على التوالي ١٥٠٠ ملغ و ٢٠٠٠ ملغ يومياً مع وجبة المساء.

في أي حالات عليك الإمتناع عن تناول بيغ وين® إكس آر؟  
يجب الإمتناع عن تناول بيغ وين® إكس آر إذا كنت مصاباً بحلل في الوظيفة الكلوية أو الكبدية، أو بالحمض الكيتوني، أو إذا كنت تعاني من تفاعلات تحسسية ضد الدواء أو ضد أي من مكوناته، أو في حال كنت تتناول أدوية لمعالجة فشل القلب الاحتقاني.

لماذا يجب أن تفعل أي إذا كنت حاملاً أو مرضعاً؟  
يجب عدم تناول بيغ وين® إكس آر خلال فترة الحمل، لذلك عليك إعلام طبيبك في حال كنت حاملاً أو تخططين للحمل خلال فترة العلاج ببيغ وين® إكس آر. إنّه من غير المعروف إذا كان بيغ وين® إكس آر يفرز في حليب الأم لذلك عليك إستشارة طبيبك بشأن تعليق العلاج أو وقف الرضاعة خلال فترة العلاج ببيغ وين® إكس آر.

كيف يحفظ بيغ وين® إكس آر؟  
يحفظ بيغ وين® إكس آر في مكان لا تتعدى الحرارة فيه ٢٥ درجة مئوية.  
يحفظ في العبوة الأصلية بحالة سليمة.  
تاريخ المراجعة: حزيران ٢٠١١  
قد تصنع عبر  
بن تاش. ج. - ضبيه، لبنان

ما العمل عند تقويف موعد إحدى الجرعات؟  
تناول الجرعة التي فوتها حالما تدرك أنك نسيتها. في حال تذكرت في وقت قريب من موعد الجرعة التالية، أعمل الجرعة التي فوتها وإستأنف برنامج العلاج المعتاد. لا تتناول جرعتين في الوقت نفسه.

ما العمل عند تناول جرعة مفرطة؟  
إن تناول جرعة مفرطة من أي دواء قد يؤدي إلى عواقب خطيرة. في حال شككت بأنك تناولت جرعة مفرطة، إستشر طبيبك فوراً. قد يؤدي أي فرط لجرعة بيغ وين® إكس آر إلى الإصابة بالحمض اللبني (أي إزدياد حمض اللبن في الدم)، وهو من المضاعفات التي تصيب النشاط الإستقلابي (أي النشاط الخاص بالتحول الغذائي).

هل من تداخل بين بيغ وين® إكس آر وأي طعام أو دواء؟  
يمكن تناول بيغ وين® إكس آر مع معظم الأدوية الأخرى؛ لكن يجب أن تستشير طبيبك قبل

هذا دواء:  
- الدواء مستحضر يؤثر على صحته، وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.  
- إتبع وصفة الطبيب بدقة، وإرشادات الإستعمال، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.  
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في الأدوية، فوادها ومخاطرها.  
- لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.  
- لا تكرر نفس الوصفة دون إستشارة طبيبك.  
- إحفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مؤتمر وزراء الصحة العرب  
 واتحاد الصيدالة العرب